


ENCODAT

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco

2016-2017

REPORTE DE
DROGAS



Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas

Primera edición 2017

D.R© Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)
Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370
<http://www.inprf.gob.mx>

Editor: Secretaría de Salud
Tiraje: 2000 ejemplares
Reservados todos los derechos
ISBN: En trámite

Impreso en México / Printed in México

Diseño editorial: Aurora Paredes Mendoza, Alejandra Ojeda Pérez, Daniel Domínguez Resendiz
Diseño de portada: Personal de la Unidad de Encuestas y Análisis de Datos del INPRFM

Citación para el presente documento:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. **Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de Drogas.** Villatoro-Velázquez JA., Resendiz-Escobar, E., Mujica-Salazar, A., Bretón-Cirett, M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., Medina-Mora ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M. y Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.

Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.insp.mx

Directorio
Secretaría de Salud

Dr. José Narro Robles
Secretario de Salud

Dr. José Meljem Moctezuma
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Marcela Guillermina Velasco González
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos
**Comisionado Nacional de los Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad**

Dr. Ernesto Héctor Monroy Yurrieta
**Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación
y Participación Social**

Mtro. Gustavo Nicolás Kubli Albertini
Titular de la Unidad de Análisis Económico

Lic. Julio Sánchez y Tépoz
Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. Onofre Muñoz Hernández
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud/Seguro Popular

Dr. Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones

Lic. Enrique Balp Díaz
Director General de Comunicación Social

Directorio
Comisión Nacional contra las Adicciones

Dr. Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones

Dra. Nora Leticia Frías Melgoza
Directora General de Atención y Tratamiento

Mtra. María José Martínez Ruiz
Directora General Eventual

Lic. José Israel Velázquez Holguín
Director General Eventual

Lic. José Bajos Linares
Director General Eventual

Lic. Martha Margarita Valadez Tamez
**Directora General Adjunta de Políticas y
Programas contra las Adicciones**

Directorio
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Dra. Maria Elena Medina Mora-Icaza
Directora General

Dra. Claudia Becerra Palars
Directora de Servicios Clínicos

Lic. Ana Maria De la Parra Coria
Directora de Administración

Mtra. Guillermina Natera Rey
Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales

Dr. Francisco Julio Pellicer Graham
Director en Neurociencias

Dr. Héctor Sentíes Castellá
Director de Enseñanza

Dr. Jorge Julio González Olvera
Subdirección de Investigaciones Clínicas

Directorio
Instituto Nacional de Salud Pública

Dr. Juan Rivera Dommarco
Director General

Dr. Eduardo César Lazcano Ponce
Director Adjunto del Centro de Investigación en Salud Poblacional

Dr. René Leyva Flores
Encargado de la Dirección Adjunta del Centro de Investigación en Sistemas de Salud

Dr. Simón Barquera Cervera
Director Adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud

Dra. Celia Mercedes Alpuche Aranda
Directora Adjunta del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas

Dr. Pedro Saturno Hernández
Director Adjunto del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas

Dra. Hortensia Reyes Morales
Directora Adjunta del Centro de Información para Decisiones en Salud Pública

Dr. Ildefonso Fernández Salas
Director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública

Dra. Laura Magaña Valladares
Secretaria Académica



CRÉDITOS

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT) es un esfuerzo coordinado por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y del Instituto Nacional de Salud Pública, Instituciones que tuvieron a su cargo el diseño conceptual, la elaboración de los cuestionarios del hogar e individual, la capacitación de los encuestadores, el trabajo de campo, la supervisión del trabajo de campo así como el análisis e interpretación de los resultados que se presentan en este libro.

La preparación y el trabajo de campo de la Encuesta se realizaron con financiamiento de la Secretaría de Salud.

Los análisis de la información fueron financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América así como la impresión de los libros. Las opiniones, hallazgos y conclusiones aquí mencionadas son de los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



Coordinación General

Jorge Ameth Villatoro Velázquez
Ma. Elena Medina-Mora Icaza
Mauricio Hernández Ávila
Juan Pablo Gutiérrez
Aurora Franco Núñez
Luz Myriam Reynales Shigematsu
Martín Romero Martínez
María José Martínez Ruiz
Martín Mosqueda Ventura

Diseño Conceptual

Jorge A. Villatoro Velázquez
Clara Fleiz Bautista
Ma. Elena Medina-Mora Icaza
Diana Anahí Fregoso Ito
*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz*

Juan Pablo Gutiérrez
Luz Myriam Reynales Shigematsu
Martín Romero Martínez
Aurora Franco Núñez
Laura R. Mendoza Alvarado
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño Logístico

Aurora Franco Núñez
Juan Pablo Gutiérrez
Edgar Antonio Martínez
Gustavo Romero
Isabel Olvera
Manuel Martínez
Melchisedec Maldonado
Veronica A. Jasso
Susana Segoviano
Rosalba Torres
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño y Control Muestral

Martín Romero Martínez
Aurora Franco Núñez
América Andrea Sandoval Zárate
Juan Manuel Zurita Luna
Instituto Nacional de Salud Pública

Capacitación de Personal de Campo

Drogas y Alcohol

Clara Fleiz Bautista
Ailema Roxana Mujica Salazar
Diana Anahi Fregoso Ito
Esbehidy Resendiz Escobar
Itzia Sayuri Soto Hernández
Michelle Bretón Cirett
Vianey Cañas Martínez
Jessica Rubí Merino Martínez
Jorge A. Villatoro Velázquez
*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz*

Tabaco

Luz Myriam Reynales Shigematsu
Luis Zavala Arciniega
Wayra Citlali Paz Ballesteros
Evelyn Rocío Jiménez Mendoza
Ailen Reyna Velázquez Viamonte
Cecilia Guzmán Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez Andrade
Zyanya Norman González
Moisés Ortiz Vargas
María Guadalupe Flores Escartin
Instituto Nacional de Salud Pública

Cuestionario de Hogar

Laura R. Mendoza Alvarado
Claudia S. Romo Rodríguez
Instituto Nacional de Salud Pública

Operativa

Aurora Franco Núñez
Laura R. Mendoza Alvarado
Instituto Nacional de Salud Pública

Prevención del Delito de Alto Impacto

Capitán Raúl Pazos Hernández
Secretaría de Seguridad Pública del DF



Levantamiento de Campo

Aurora Franco Núñez
Juan Pablo Gutiérrez
Edgar Antonio Martínez
Gustavo Romero
Isabel Olvera
Manuel Martínez
Melchisedec Maldonado
Veronica A. Jasso
Susana Segoviano
Rosalba Torres

Instituto Nacional de Salud Pública

Desarrollo de Sistemas y Bases de Datos

Fernando Zapata Hernández
Adán Armando Barrios Hernández
Esaú Jafet Palafox Chávez
Lester Carballo Pérez

Instituto Nacional de Salud Pública

Supervisión de Trabajo de Campo

Ailema Roxana Mujica Salazar
Esbehidy Resendiz Escobar
Itzia Sayuri Soto Hernández
Michelle Bretón Cirett
Vianey Cañas Martínez
Diana Anahi Fregoso Ito
Jessica Rubí Merino Martínez

*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz*

Luis Zavala Arciniega

Juan Carlos García Buendía
Ailen Reyna Velázquez Viamonte
Miguel Ángel Rodríguez Andrade
Instituto Nacional de Salud Pública

Análisis Estadístico

Drogas y Alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez
Diana Anahi Fregoso Ito
Esbehidy Resendiz Escobar
Ailema Roxana Mujica Salazar
Itzia Sayuri Soto Hernández
Michelle Bretón Cirett
Vianey Cañas Martínez
Jessica Rubí Merino Martínez

*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz*

Tabaco

Luz Myriam Reynales Shigematsu
Miguel Ángel Rodríguez Andrade
Zyanya Norman González
Valeria Serrano Cote
Luis Zavala Arciniega
Wayra Citlali Paz Ballesteros
Instituto Nacional de Salud Pública

Elaboración de los Libros

Drogas y Alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez
Esbehidy Resendiz Escobar
Ailema Roxana Mujica Salazar
Itzia Sayuri Soto Hernández
Michelle Bretón Cirett
Vianey Cañas Martínez
Ma. Elena Medina-Mora Icaza

*Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz*

Tabaco

Luz Myriam Reynales Shigematsu
Luis Zavala Arciniega
Wayra Citlali Paz Ballesteros
Daniela Sarahi Gutiérrez Torres
Juan Carlos García Buendía
Moisés Ortiz Vargas
María Guadalupe Flores Escartin
Instituto Nacional de Salud Pública



Informe Metodológico

Martín Romero Martínez

Aurora Franco Núñez

Laura Mendoza Alvarado

Juan Pablo Gutiérrez

Instituto Nacional de Salud Pública

Coordinación Logística de la Elaboración de los Reportes

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Comité Externo de la ENCODAT 2016-2017

Dr. Roy Campos

Presidente de Consulta Mitofsky

Dr. Sergio Aguilar-Gaxiola

Universidad de California, Davis

Dr. Arturo Revuelta Herrera

Director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud

Guus Zwitter, MSc

Coordinador Ejecutivo

Programa de Política de Drogas

Centro de Investigación y Docencia Económicas – Región Centro

Asesor para la Clasificación de Sustancias Psicoactivas

Dr. Mario Gómez Espinosa

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

AGRADECIMIENTOS

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016, es el producto del esfuerzo coordinado entre varias instituciones y profesionales del ámbito de las adicciones, a todos quienes participaron nuestro reconocimiento.

El apoyo que nos dieron los estados a través de los Servicios Estatales de Salud y las Comisiones contra las Adicciones de las entidades federativas, resultó muy valioso para poder llevar a buen puerto este estudio.

La Dirección General de Epidemiología llevó a cabo la dictaminación del estudio e hizo recomendaciones importantes para su instrumentación, a través del Dr. Arturo Revuelta Herrera, Dr. Mauricio Ubilla y del Mtro. Mario Cortés. A ellos un especial reconocimiento por su esmero y apoyo para este estudio.

El Comité Técnico Externo, conformado por el Dr. Roy Campos, Presidente de Consulta Mitofsky, el Dr. Sergio Aguilar Gaxiola, Profesor de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Davis y el Mtro. Guus Zwitter, Coordinador Ejecutivo del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Región Centro, jugó un importante papel y les agradecemos sus valiosas recomendaciones para mejorar aspectos relevantes del estudio.

La labor de campo en estos estudios es sin duda un gran reto cada vez más difícil y requiere de un gran trabajo por parte de los encuestadores, cartógrafos, responsables de cómputo, supervisores y coordinadores, quienes realizaron un extraordinario esfuerzo aún en condiciones muy difíciles de trabajo, sea por inseguridad, por cuestiones de salud o incluso administrativas. A ellos sin duda nuestro mayor reconocimiento por su dedicación y esfuerzo para sacar adelante este estudio.

Agradecemos el gran apoyo recibido cuando iniciamos este proyecto al Mtro. Raúl Martín del Campo, al Dr. Víctor Guiza, a la Lic. Patricia Reyes del Olmo, al Lic. Oliver Galeana y al Lic. Héctor Martínez.

Un agradecimiento especial al personal administrativo de las instituciones involucradas cuya labor facilitó el que este proyecto saliera adelante en tiempo y forma.

A la Mtra. Norma Curiel, cuyo apoyo con el grupo de la línea de CONADIC (01800-911-2000) fue invaluable para atender y canalizar a la población que solicitó ayuda durante todo el operativo de campo, mil gracias a todos ustedes por esta labor tan importante.

Al equipo que apoyó en el desarrollo del componente genético que se midió por primera vez en este estudio, al Dr. Humberto Nicolini, a la Dra. Alma Genis y a la Dra. Beatriz Camarena.



Externamos también un agradecimiento especial a la Embajada de los Estados Unidos en México, quien a través de sus oficinas de INL, aportó financiamiento adicional para hacer posibles estas publicaciones y otros productos asociados a la ENCODAT 2016-2017 a través del número de proyecto SINLEC17CA2011 de la Iniciativa Mérida.

Finalmente y de manera muy especial, a la población que se visitó en sus hogares para llevar a cabo el estudio. Su apoyo con sus respuestas, su disposición a atender a los encuestadores, su ofrecimiento del espacio, del agua o de un refrigerio, son alicientes importantes para la labor que hemos desarrollado. Gracias por su apoyo.

CONTENIDO

Presentación	i
Introducción	iii
DROGAS	
1. Panorama Epidemiológico del Consumo de Drogas	19
2. Metodología del Estudio	29
3. Resultados Principales	45
Prevalencias y tendencias del consumo de drogas	47
Población Total	
Población de 12 a 17 años	
Población de 18 a 34 años	
Población de 35 a 65 años	
Tendencias en la edad de inicio del consumo de drogas	55
Tendencias regionales del consumo de drogas (Encuestas 2011-2016)	56
Población Total	
Población de 12 a 17 años	
Población de 18 a 65 años	
Tendencias y variaciones estatales del consumo de drogas (Encuestas 2008-2016)	65
Dificultades relacionadas al consumo de drogas	73
Tratamiento y necesidades de atención	75
Factores relacionados con el consumo de drogas	78
Percepción de riesgo y tolerancia social	
Exposición al consumo de drogas	
Exposición a la prevención	
Resumen de Resultados	83
4. Conclusiones y Sugerencias	87
5. Referencias	93
6. Glosario	97
Anexo A: Desglose por Estado de la Tasa de Respuesta	
Anexo B: Análisis de las Encuestas 2011, Tradicional 2016 y ENCODAT 2016-2017	
Anexo 1: Tendencias de Drogas	
Anexo 2: Tendencias de Drogas por Estado	
Anexo 3: Tendencias de Drogas por Regiones	

Anexo 4: Intervalos de Confianza de Drogas
Anexo 5: Intervalos de Confianza de Drogas por Estado
Anexo 6: Cuadros de Tratamiento de Drogas
Anexo 7: Tendencias de Exposición a la Prevención y Conducta Antisocial
Anexo 8: Tendencias de Exposición a la Prevención y Conducta Antisocial por Región
Anexo 9: Intervalos de Confianza de Exposición a la Prevención y Conducta Antisocial
Anexo 10: Intervalos de Confianza de Exposición a la Prevención y Conducta Antisocial por Estado
Anexo 11: Cuadros de Percepción de Riesgo y Tolerancia Social
Anexo 12: Cuadros de Percepción de Riesgo y Tolerancia Social por Estado
Anexo 13: Intervalos de Confianza de Percepción de Riesgo y Tolerancia Social
Anexo 14: Mapas del Consumo de Drogas



PRESENTACIÓN

El problema mundial de las drogas representa uno de los mayores desafíos para todos los gobiernos del orbe; hoy, la realidad internacional nos impele a ver más allá de lo aparente, a escudriñar el trasfondo de las cosas que se nos presentan como si no lo tuviesen y averiguar lo que hay detrás del consumo de sustancias, sean éstas legales o ilegales, como la frecuencia con que son consumidas, las proporciones de hombres y mujeres que las utilizan con fines de intoxicación, así como las entidades federativas con mayores índices de uso, abuso y dependencia.

En el concierto de las naciones, se difumina cada vez más la distinción entre países productores, de tránsito y consumidores, para dar paso a la concepción globalizada de que las drogas, desde su producción, manufactura, distribución y consumo, representan una seria amenaza para la salud pública y la gobernabilidad de los países.

El consumo de drogas es muy variable, tanto en términos de la magnitud del uso, como del tipo de sustancia y de los grupos etarios que las utilizan; esta diversidad da lugar a varias incógnitas como el hecho de si existe un sólo problema de drogas o son distintos problemas que ameritan políticas diferentes para su abordaje adecuado.

Por consiguiente, las autoridades sanitarias impulsan acciones que les permitan conocer de manera precisa las tendencias y otras características propias del problema en sus territorios, con el afán de diseñar mejor sus políticas, planes y programas. En consecuencia, uno de los principales retos consiste en prevenir los primeros contactos con las sustancias psicoactivas y retrasar la edad de inicio, adoptando un enfoque centrado en las personas y la salud pública, reconociendo que el consumo y los trastornos asociados, son complejos y de naturaleza crónica, que deben ser prevenidos y tratados con intervenciones basadas en evidencia científica y pleno respeto a los derechos humanos.

El Gobierno de la República, al tener presentes estos conceptos, ha delineado una estrategia complementaria conformada por acciones para controlar la oferta pero también para reducir la demanda de drogas, con base en un abanico de intervenciones que abarca desde la prevención en grupos con alta vulnerabilidad, pasando por tareas de detección temprana, referencia oportuna, tratamiento y rehabilitación, hasta esfuerzos en materia de capacitación, normatividad e investigación científica. Ésta es fundamental para conocer la dinámica nacional y local del consumo de drogas (legales e ilegales) y el presente estudio da fe de ello, ya que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, es continuación de las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en hogares en 1988, 1993, 1998, 2002, 2008 y 2011, para conocer la realidad del uso, abuso y dependencia a sustancias con potencial adictivo en el país, y replantear las líneas de acción para su atención integral impulsadas hasta ahora.



Un pilar del trabajo gubernamental lo constituye el federalismo articulado, con base en el cual las políticas públicas se concretan en los estados y municipios gracias a la participación de los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de los sectores social y privado. Es así que los programas en materia de salud y atención a las adicciones, forman parte de una gran alianza en beneficio de las y los mexicanos. Con la participación ciudadana creamos mejores condiciones de gobernabilidad para proteger las fortalezas de México ante la amenaza de las drogas: la salud de nuestras mujeres y hombres que día con día forjan un futuro mejor para esta gran nación.

Dr. Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional contra las Adicciones

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz ha llevado a cabo Encuestas Epidemiológicas y de Consumo de Sustancias en hogares, escuelas y poblaciones especiales desde inicios de la década de los 1970's, estas encuestas se han complementado con estudios llevados a cabo con otras metodologías. El Instituto ha sido también parte de los esfuerzos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, que ha financiado las Encuestas Nacionales de Hogares, de unificar indicadores en los estudios llevados a cabo en instituciones de investigación, académicas y de tratamiento. La integración de la información de diferentes fuentes, permite conocer el fenómeno en sus diferentes dimensiones.

La información sobre la extensión, tendencias y consecuencias del uso de drogas bajo diferentes patrones de consumo es una base fundamental para la política pública. Las encuestas de Hogares permiten conocer el consumo en población que vive en hogares normales, excluye aquella que no tiene lugar fijo de residencia, aquella que en el momento del estudio se encuentra internada en instituciones de salud o de procuración de justicia. Se trata de la metodología que tiene la más amplia cobertura. Sus resultados deben de completarse con la proveniente de otras fuentes de información.

Las Encuestas Nacionales de Consumo de Drogas ENAs 1988, 1993, 1998, 2002, 2008, 2011 y ahora la ENCODAT de 2016, permiten conocer las prevalencias del consumo en la población de 12 a 65 años, nos proporciona información sobre tendencias, antecedentes y determinantes del problema. Las primeras encuestas se hicieron solamente en población urbana, a partir de 2002 incluyen también a la población rural, las encuestas de 2008 y ahora la de 2016, incluyen información por estado. Todas estas encuestas han mantenido estables los indicadores y la metodología a fin de poder hacer una evaluación de las tendencias. El Instituto Nacional de Psiquiatría RFM ha sido responsable del marco conceptual, de la elaboración y validación del cuestionario y de análisis de las secciones de drogas y alcohol. El responsable de campo de la encuesta de 1988 fue la Secretaría de Salud, la encuesta de 1998 fue levantada por Berumen y asociados, la de 2002 por INEGI y en las de 2008, 2011 y esta de 2016, el Instituto Nacional de Salud Pública tuvo a su cargo el trabajo de campo.

La ENCODAT probó nuevas metodologías que buscan dar más privacidad a las personas a fin de evaluar su potencial de aumentar la calidad de la información pero mantuvo una muestra con el método tradicional a fin de poder reportar tendencias.

El documento presenta información recabada en 55,907 hogares a lo largo del país, con un tamaño de muestra de 1,600 individuos por estado y con una tasa de no respuesta de 26%. Presenta información de la población que no usa ni ha usado drogas y del consumo bajo diferentes patrones de consumo, desde el uso experimental hasta el consumo problemático y la dependencia de diferentes drogas. Se incluye información tanto de las de uso médico con potencial psicoactivo usadas fuera de prescripción (ansiolíticos, estimulantes anfetamínicos, drogas narcóticas) y las de sustancias ilegales (marihuana, cocaína y su forma fumada crack, alucinógenos, metanfetaminas, heroína) y de inhalables, sus variaciones por grupos de población, y en cada estado del país y a nivel nacional.



La encuesta sigue un enfoque de Salud Pública, enfoque que ha sido adoptado por la comunidad internacional reunida en 2016 durante la Asamblea General de Naciones Unidas en su Sesión Especial de Drogas (UNGASS, 2016) en la que se reconoció que como parte de una aproximación integrada y balanceada para enfrentar el problema, el énfasis debería ponerse en los individuos, en las comunidades y en las sociedades con la visión de promover y proteger la salud, la seguridad y el *bienestar* desde una perspectiva de *Salud Pública*. Conocer el problema desde esta perspectiva es la base para cumplir con el compromiso de atender los problemas de salud que se generan con el mal uso de sustancias.


También sirve de punto de partida para atender los compromisos con el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, en el que la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias fueron incluidos como parte de la meta 3: “Garantizar una vida sana y promover el *bienestar* para todos en todas las edades” cuyo indicador se ha definido como la cobertura de tratamiento para los trastornos relacionados con el uso de sustancias, información que se recaba en esta encuesta.

En México, diferentes fuentes de información han señalado la disminución de factores que han protegido a la población de la experimentación, uso continuado y problemas asociados con el consumo y trastornos por abuso de sustancias, como es la percepción de riesgo y la tolerancia social. Se ha señalado también el incremento de consumo especialmente de marihuana, la incorporación de una mayor proporción de mujeres especialmente durante la adolescencia temprana en el consumo entre otras tendencias y modificaciones en los patrones de consumo y problemas. Contar con la información nacional y estatal del problema y sus trayectorias es la base de las políticas que deberán reforzarse e implementarse. Sea muy bienvenido este reporte.

María Elena Medina-Mora



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE DROGAS



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE DROGAS

El consumo de drogas se ha monitoreado desde diversas fuentes (sistemas de información en drogas, encuestas poblacionales, encuestas en grupos específicos, etc.), ya que cada una proporciona información vital, complementaria y específica. Ninguna fuente por sí sola da una visión completa de la problemática.

Dado este contexto, se presenta la problemática del consumo de drogas conforme los resultados de las diversas fuentes señaladas, comenzando por las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA) en hogares.

Panorama Nacional

Encuestas en Hogares

Las Encuestas Nacionales de Adicciones se llevan a cabo de manera periódica con la finalidad de medir la evolución del consumo de sustancias y otras problemáticas de salud mental en población de 12 a 65 años. Los datos recabados en la encuesta realizada en 2011¹, mostraron que en esta población aumentó el uso de drogas ilegales de 4.6% en 2002 a 7.2% en 2011. Por sexo, a pesar de que los hombres presentan mayor consumo de drogas ilegales (de 8% en 2002 pasó a 12.5% en 2011), en las mujeres el consumo aumenta 2.3 veces (de 1% en 2002 a 2.3% en 2011), su crecimiento es mayor con respecto a los hombres. La marihuana fue la droga más consumida (6%), seguida de la cocaína y crack (3.3% y 1% respectivamente). Con respecto al consumo de drogas ilegales en el último año en la población general, la prevalencia reportada en 2011 fue similar a la del 2008 (1.5% y 1.4%, respectivamente). De la misma manera, la marihuana fue la sustancia ilegal de mayor consumo (1.2%), seguida por la cocaína y los estimulantes tipo anfetamínico con porcentajes similares (0.5% y 0.2% respectivamente). Esta situación prevaleció tanto en hombres como en mujeres y en la población urbana.

Al analizar los datos por regiones en esta población, la prevalencia de drogas ilegales en el último año fue mayor en la región Norte del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) en comparación con la región Sur (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco) (2.3% y 1.1% respectivamente). Por tipo de sustancia, se encontró que el consumo de marihuana y cocaína en el último año presentó prevalencias altas en las regiones Noroccidental (2.3% en marihuana y 1 % en cocaína) y Nororiental (1.9% en marihuana y 1.1% en cocaína); en tanto que la región Sur presentó la prevalencia más baja en el consumo de marihuana (0.5%) y la Ciudad de México en el consumo de cocaína (0.1%).

En la población de 12 a 17 años, el consumo de cualquier droga ilegal alguna vez en la vida aumentó de 1.3% en 2002 a 2.9% en 2011. En este grupo de edad, la marihuana fue la droga más consumida (2.4%), seguida de los inhalables y la cocaína (0.9% y 0.7% respectivamente). Al observar los datos por regiones, la Nororiental (Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) es la que presenta las prevalencias más altas para marihuana (5.1%), cocaína (2.8%) y estimulantes tipo anfetamínico (1.6%).

Encuestas en Estudiantes

La encuesta nacional más reciente en este ámbito es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 (ENCODE)², en donde se reportó una prevalencia de consumo alguna vez en la vida de cualquier droga de 18.6% en los estudiantes hombres de secundaria y bachillerato y de 15.9% para las estudiantes mujeres, de manera que la prevalencia total de consumo fue de 17.2%.

Los estados con las prevalencias de consumo alguna vez de cualquier droga significativamente mayores al promedio nacional (17.2%) son Ciudad de México (25%); Quintana Roo (22%); Estado de México (21.1%), Jalisco (20.1%) y Chihuahua (19.8%). En el caso del consumo en el último año (12.2%), los porcentajes más elevados se presentaron en los mismos estados excepto el estado de Jalisco (Ciudad de México 17.8%, Estado de México 15.6%, Quintana Roo 15% y Chihuahua 14.3%).

Por su parte, el 5.8% de los estudiantes reportó haber consumido drogas médicas fuera de prescripción, este porcentaje es mayor en las mujeres (6.5%) que en los hombres (5.1%). En el último mes, el porcentaje de consumo de drogas médicas fue de 2%, 1.8% en hombres y 2.1% en mujeres. Por nivel de estudios, el 4.7% de los estudiantes de secundaria y el 7.5% de bachillerato reportaron consumir este tipo de sustancias alguna vez en la vida.

Con respecto al consumo de drogas ilegales, el 14.5% de los estudiantes mencionó haberlas consumido alguna vez en la vida, 16.6% son hombres y 12.5% mujeres. La prevalencia de consumo en último mes fue de 5.6% (hombres 6.7% y mujeres 4.5%). Por dominio de estudio, el consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida de secundaria (10.1%) a bachillerato (21.8%) creció 2.1 veces.

La sustancia de mayor consumo es la marihuana (10.6%; 12.9% en los hombres y 8.4% en las mujeres), seguida de los inhalables (5.8%; 5.9% hombres y 5.8% mujeres) y los tranquilizantes (3.7%; 3.2% hombres y 4.3% en las mujeres); en los hombres, el consumo de cocaína (4.2%) fue mayor que el de los tranquilizantes. Las drogas como el crack y la heroína mantuvieron consumos bajos que van del 1.3% en secundaria hasta 2.2% en bachillerato para crack y del 0.8% en bachillerato al 0.9% en secundaria para heroína. Por nivel educativo, el consumo de marihuana se triplicó de secundaria a bachillerato (6.1% a 18.1%); este patrón es similar para el consumo de otras drogas, en particular la cocaína, donde el consumo creció más de 2 veces (2.3% en secundaria y 4.9% en bachillerato).

Por estado, el consumo de marihuana se encontró por arriba del nacional (10.6%) en la Ciudad de México (18.2%), Quintana Roo (14.6%) y en el Estado de México (13.8%). Para el consumo de cocaína, la Ciudad de México (5.2%) y el estado de Quintana Roo (4.7%) muestran los más altos porcentajes en relación al promedio nacional (3.3%).

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA 2016)³

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, realiza una medición del consumo de drogas en distintas instituciones. Los datos disponibles de su reporte más reciente se mencionan a continuación.



Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales

Durante el 2016 se registraron un total de 60 582 personas que acudieron a 1 125 centros de tratamiento en 281 ciudades de las 32 entidades federativas del país. La media de edad de las personas que acudieron a estos centros de tratamiento fue de 31.08 años; principalmente de sexo masculino (89.6%).

Con respecto a la escolaridad de quienes acudieron a estos centros, el 65.1% tiene una escolaridad básica, el 23.4% media superior y el 7.4% licenciatura o posgrado.

En 2016, el 47.3% de los pacientes que acudió a tratamiento lo hizo voluntariamente, y el 44.1% fue llevado por amigos o familiares.

Respecto a las drogas de inicio, después del alcohol (45.8%) y el tabaco (28.7%), la mariguana (14.8%), los inhalables (4.6%) y la cocaína (2.6%) son las drogas con las que iniciaron su consumo.

Las drogas de impacto que se reportan, después del alcohol (39.3%) son el cristal (22.9%), la mariguana (14.3%), la cocaína (9.4%), los inhalables (5.5%), la heroína (3.4%) y el tabaco (2.6%).

En la zona Norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa), el cristal fue la principal droga de impacto (49.2%) seguido del alcohol (15.4%) y la mariguana (11.7%).

Por grupos de edad, en el de menos de 14 años y en el de 15 a 19 años la mariguana es la principal droga de impacto (36.1% y 32.8% respectivamente). Para los inhalables como droga de impacto, disminuye conforme aumenta la edad. Esto es opuesto para heroína, cocaína y cristal. Sin embargo, en el grupo de 35 años y más, la principal droga de impacto es el alcohol (64.9%).

Aunque el alcohol es la mayor droga de impacto entre la población sin importar su escolaridad, cabe mencionar que a mayor nivel de estudios, la cocaína tiene un porcentaje mayor como droga de impacto (11.8% en técnicos, 12% bachillerato, 13% licenciatura y 10.6% posgrado).

El 5.9% reportó consumo de drogas inyectadas, la mayoría fueron hombres (90.7%).

Consejos Tutelares para Menores

Durante el 2016 se tuvo un registro de 2 124 menores, con una media de edad de 16.3 años y en su mayoría fueron hombres (92.7%). Se encontró que el 91.9% pertenece al grupo de 15 y más años de edad, el 8.1% se encuentra entre los 10 y los 14 años. Asimismo, el 77.9% tiene escolaridad de nivel básico y el 31% indicó tener actividad laboral inestable. Se identificó al tabaco como la principal droga de inicio (25%) seguida por el alcohol (24.2%) y la mariguana (19.9%). El promedio de la edad de inicio de consumo de sustancias fue de 13.6 años.



El 28.1% de los menores cometió un delito bajo el efecto de alguna sustancia, de estos el 94.1% son del sexo masculino. Las sustancias empleadas al cometer algún delito con mayor frecuencia fueron alcohol con 34.8%, seguida de marihuana 31.5% e inhalables con 15.1%.

Servicios de Urgencias Hospitalarias

Durante 2016 se reportaron 13 405 eventos, el 57.1% de ellos fueron mujeres. La media de edad fue de 37.5 años, y el 48.6% son mayores de 35 años de edad. La estratificación de la población por grupo de edad y sexo mostró que en los grupos de edad de 15 a 29 años, se registraron ligeramente más mujeres que hombres. En cuanto al nivel de escolaridad, 55.1% tenía primaria o secundaria y 9.9% no contaba con estudios. El 35.2% se dedicaba a labores del hogar, 29% tenía alguna actividad laboral estable y 13.5% era estudiante. El 3.9% de los pacientes que se presentó al servicio de urgencias se encontraba bajo el efecto de alguna droga. En el 67.8% de los casos, la sustancia consumida fue el alcohol, seguida por la marihuana con 9.7% y cocaína 6%, en el resto de las drogas ilegales se obtuvieron porcentajes por debajo del 3.3%.

Unidades de Especialidades Médicas – Centro de Atención Primaria en Adicciones

En 2016, un total de 53 mil 588 personas acudieron a las UNEME-CAPA a solicitar atención por dificultades relacionadas con sustancias psicoactivas, de los cuales, 19 mil 880 (37.1 %) lo hicieron debido al consumo de alcohol (droga de mayor impacto) y de estos, 62.5% fueron hombres y 37.3% mujeres.

El segundo lugar como droga de impacto lo ocupó la marihuana, con un total de 17 mil 808 personas atendidas (33.2%); de estos, los hombres representaron el 80.3% de consumidores y las mujeres el 19.7%.

El tabaco ocupó el tercer lugar con un 11.9%; siendo los varones nuevamente quienes presentaron el mayor consumo, con un 59.2%, ante un 40.7%, por parte de las mujeres; se observa una menor brecha en el consumo de esta sustancia entre hombres y mujeres.

Las metanfetaminas (7.9%), inhalables (4.6%), cocaína (2.6%) y el crack (1%), se ubicaron a continuación como drogas de impacto; finalmente, otras sustancias como los tranquilizantes, la heroína, anfetaminas, pasta base, alucinógenos, antidepresivos y otros, tienen una representación menor al 1%.

Cabe resaltar que la mayoría de las sustancias mencionadas, han mostrado porcentajes similares en los últimos años: por ejemplo el alcohol, en el 2014 presentó el 36.8%, aumentando ligeramente en el 2015 (37.7%) y mostrando una disminución no significativa en 2016 (37.1%).

De igual manera, la marihuana ha mantenido niveles muy parecidos: en 2014 (34.0%); 2015 (33.3%) y en 2016 (33.2%); por su parte el tabaco, en 2014 presentó una prevalencia total del 12%; en el 2015 del 12.4% y para 2016 fue 11.9%.



Las metanfetaminas son las únicas sustancias que presentaron cambios notables al incrementar de 4.7% a 7.9% entre los años 2014 y 2016.

Tomando en cuenta la demanda de servicios por grupos de edad, los adolescentes de 12 a 17 años representan el más importante, con un 48.2%, que corresponde prácticamente a la mitad de usuarios que recibieron tratamiento en las unidades en el año 2016. Los adultos jóvenes de 18 a 29 años, representaron el segundo grupo de atención, con un 31.3%; y el tercero, los adultos de 35 a 49 años (10.3%).

Centros de Integración Juvenil (CIJ)^{4,5}

Durante el segundo semestre del año 2016, los Centros de Integración Juvenil, tuvieron 12 096 registros de usuarios de sustancias psicoactivas que reportaron el consumo de al menos una droga ilícita y que acudieron a consulta.

La gran mayoría de los que acudieron a tratamiento son hombres (82.5%), la edad promedio de inicio del consumo de drogas ilícitas fue 16 años. Del total de casos, el 16.5% tiene escolaridad de secundaria y el 8.4% de estudios técnicos o bachillerato, y el 52.3% es consumidor funcional; es decir, los usuarios mantienen algún tipo de actividad productiva como estudiar, trabajar, o ambas.

Por otra parte, el consumo de marihuana alguna vez en la vida (87.2%) es mayor al de alcohol (86.8%) y tabaco (86%) en los pacientes que solicitan tratamiento en las unidades de atención institucional de los Centros de Integración Juvenil.

Las principales sustancias referidas como drogas de impacto fueron la marihuana (41.4%) y las metanfetaminas (16.1%).

Panorama Internacional

A nivel internacional, se presentan informes periódicos respecto al panorama epidemiológico del consumo de drogas, llevados a cabo por instituciones como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) o la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Estos informes presentan datos de consumo de drogas en población general. Asimismo los Observatorios Internacionales proporcionan información enfocada tanto a población general como a estudiantes.

Informe Mundial sobre las Drogas 2017 UNODC⁶

Se estima que alrededor de 250 millones de personas entre 15 y 64 años de edad, habían utilizado alguna droga ilícita al menos una vez en el año 2015. Cerca de 29.5 millones de esos consumidores padecen trastornos provocados por el uso de drogas.

La droga de consumo más frecuente en el mundo es la marihuana, con una prevalencia del 3.8% en el último año (alrededor de 183 millones de personas), seguida de las anfetaminas y estimulantes tipo anfetamínico (35 millones de usuarios en el último año); en tanto que el consumo de opioides

llega a 35 millones de usuarios. El reporte indica que alrededor de 12 millones de personas consumen drogas por inyección.

En regiones de América del Norte y del Sur se ha incrementado el consumo de marihuana, mientras que en partes de Europa ha disminuido o se ha estabilizado; asimismo, el uso de anfetaminas y en especial las metanfetaminas está aumentando en regiones de América del Norte, Oceanía y gran parte de Asia, y también se observa un aumento en el consumo de heroína en partes de Europa central y occidental.

El consumo de drogas es cada vez más difuso porque muchas personas que consumen drogas, sea de manera ocasional o habitual, tienden a utilizar más de una sustancia ya sea de manera simultánea o sucesivamente.

La proporción de personas que se someten a tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de cannabis sigue siendo alta en todo el mundo. En promedio, el 39% llega a tratamiento por consumo de marihuana y 33% por opioides.

Observatorio Interamericano de Drogas 2015⁷

Los datos de este informe indicaron que el consumo de marihuana en población general en Estados Unidos y Canadá superó el 40% en el consumo alguna vez en la vida, lo que ubica a estos países muy por encima de países sudamericanos como Chile y Uruguay, que tienen prevalencias alrededor del 20%. Entre los países con prevalencias más bajas de consumo se encuentran México (1.2%), Bolivia (1.3%), Ecuador (0.7%) y Paraguay (0.5%). El consumo de marihuana se presenta más frecuentemente entre la población adolescente y adulta joven; en la mayoría de los países, en el grupo de 18 a 34 años de edad se encuentra la mayor prevalencia de consumo. Las tendencias indican que en Estados Unidos el consumo de marihuana se había mantenido estable hasta el año 2009, observándose un ligero aumento en años posteriores. En los países de América del Sur se observa un incremento del consumo de esta sustancia.

En el caso de los inhalables en población general, el consumo en el último año se ubica entre el 0% y el 2.6%, donde Estados Unidos, Belice, Brasil, Suriname, Bolivia y Barbados tienen las prevalencias más altas (0.6%, 1%, 1.2%, 2.6%, 0.3% y 0.8%, respectivamente). En Belice, Perú, Suriname y Barbados el porcentaje es mayor en mujeres que en hombres. En cuanto al consumo de cocaína, los hombres tienen porcentajes mayores a las mujeres en la mayoría de los países; es en Belice, Paraguay y Ecuador donde no hay diferencias de este consumo en ambos sexos. El uso de “éxtasis” en población general es más elevado en Estados Unidos (6.8%) y Canadá (5.3%) que en países como Uruguay (1.5%), Colombia y Barbados (7%), Venezuela (0.6%), Belice (0.5%) y Chile (0.4%). En todos los países, a excepción de Paraguay, el consumo es mayor en hombres que en mujeres.

En población escolar, el consumo en el último año, superó el 20% en los países de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile y Estados Unidos mientras que en países como El Salvador, Honduras, Panamá, Bolivia y Brasil entre otros, la prevalencia fue menor al 5%. En la región de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) se observan los mayores índices de consumo de esta sustancia, superando en 8 puntos porcentuales el promedio del Continente (16.5%).

En el Continente se encontró gran variabilidad en las prevalencias de consumo de inhalables en el último año (entre 0.5% y 11%). Honduras, Perú y República Dominicana tienen prevalencias inferiores a 1.5%, mientras que los países como Granada, Barbados, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granaditas y Santa Lucía tienen prevalencia superior al 8% en población estudiantil. Así mismo la prevalencia del uso de cocaína en el último año se situó por arriba del 2.5% en Chile, Argentina y Colombia, seguidos por Canadá, Granada, Uruguay y Brasil con prevalencias mayores al 2%, mientras que los consumos más bajos correspondieron a Venezuela y Surinam. Los hombres son quienes presentan porcentajes más altos de consumo de esta sustancia. El promedio continental del consumo de cocaína fue de 1.8%, y la región de Sudamérica rebasó este promedio con un 2.2%. Entre los estudiantes no se observa un panorama claro en el consumo éxtasis, sin embargo predomina una estabilización en el uso de esta sustancia, con dos países con una clara tendencia al aumento: Chile y Uruguay.

Otros Estudios

En cuanto a otros estudios internacionales llevados a cabo en Iberoamérica, la Encuesta Nacional de Salud y Consumo de Drogas 2015⁸ (NSDUH por sus siglas en inglés), aplicada en hogares de EUA a personas mayores de 12 años de edad, identificó que en el año 2015, 27.1 millones de personas (10.1%) había consumido alguna droga ilícita al menos una vez en el último mes. Entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad el consumo actual de drogas fue de 8.8%, de 22.3% en adultos de 18 a 25 años y de 8.2% en personas mayores de 26 años.

En resumen, las encuestas de adicciones muestran el aumento que se presenta entre la población general, con un mayor crecimiento en mujeres. Asimismo, en los estudios llevados en población escolar, la marihuana es la sustancia que muestra el mayor incremento en su consumo, aún en los estudios anteriores al 2009. El consumo problemático de marihuana se ve reflejado más en los varones y tiende a aumentar con la edad (7.9% de 14 años, 18.2% de 18 años).

También los datos del SISVEA, han dado cuenta de la posición que ocupan la marihuana e inhalables como droga de inicio entre las personas que acuden a tratamiento y de la marihuana como la principal droga de consumo después del alcohol: el 38.8% consume la droga de inicio hasta tres o más veces al día, lo cual es consistente con otros sistemas de información como el de CIJ.

Internacionalmente, el Informe Mundial sobre las Drogas, encontró que la marihuana sigue siendo la droga más consumida en el mundo, seguida de las anfetaminas y un repunte en el uso de heroína. El informe del OID, igualmente indica un aumento en el consumo de marihuana en sus países miembros y apuntó al éxtasis como una de las sustancias con mayor consumo entre jóvenes. Ambos estudios ubicaron a Estados Unidos o a la región que lo comprende entre los mayores consumidores de marihuana.

Es este contexto global el que permite tener una visión más amplia sobre el consumo de sustancias, en particular en nuestro país, y en el que se inserta la realización del presente estudio con la intención de dar un panorama más claro y específico del consumo de drogas en la población mexicana.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO





Introducción

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) la realización de la “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017” (ENCODAT 2016-2017). Su objetivo general fue estimar a nivel de entidad federativa y nacional las prevalencias del consumo de tabaco, alcohol y drogas tanto médicas como no médicas, así como evaluar las tendencias de su consumo, en la población adolescente con edad entre 12 y 17 años y en la población adulta con edad entre 18 y 65 años. Además, la encuesta se diseñó para conocer los factores asociados al consumo de estas sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el consumo de las mismas.

Objetivos

Los objetivos específicos que se plantearon para la ENCODAT 2016-2017 son:

- Estimar la prevalencia del consumo de drogas tanto médicas como no médicas, alcohol y tabaco a nivel de entidad federativa y nacional.
- Evaluar las tendencias en el consumo de drogas, alcohol y tabaco, mediante la comparación de los resultados de la ENCODAT 2016-2017 con las encuestas nacionales de adicciones previas.
- Identificar los grupos de población con mayor riesgo a presentar problemas debido al consumo de drogas (médicas y no médicas), alcohol y tabaco.

Metodología

La ENCODAT 2016-2017 es una encuesta de hogares diseñada para hacer inferencias a nivel nacional y para las 32 entidades federativas del país. En la ENCODAT 2016-2017 se encuentran representadas poblaciones rurales, urbanas y metropolitanas, poblaciones que son descritas a detalle en el Tabla 1. En la ENCODAT 2016-2017, al igual que en la ENA 2011 y 2008, fueron excluidas las localidades donde más de la mitad de la población de 5 años y más hablaba sólo alguna lengua indígena. La adopción de este criterio se fundamentó en que el tema de las adicciones puede ser sensible o delicado para los entrevistados, motivo por el que no se consideró conveniente el uso de intérpretes o informantes sustitutos para la obtención de la información. En cada hogar seleccionado, siempre que la composición del mismo lo permitiera, se seleccionó a un adulto de 18 a 65 años y a un adolescente de 12 a 17 años de edad. La selección se llevó a cabo mediante muestreo aleatorio simple en cada uno de los dos grupos de edad.

Los resultados obtenidos de la ENCODAT 2016-2017 permiten:

- Estimar para cada entidad federativa la prevalencia del consumo de drogas (médicas y no médicas), en la población de 12 a 65 años.
- Identificar las entidades federativas donde hay mayor consumo de drogas.
- Evaluar la relación entre los factores de riesgo ambientales, interpersonales, familiares y personales con la experimentación, uso habitual y uso problemático de drogas, alcohol o tabaco.
- Desarrollar y evaluar modelos de predicción del consumo de drogas, alcohol y tabaco, con objeto de incidir en la creación e implementación de programas de prevención.
- Proveer información a los sectores de Salud y Educación que ayude a desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso habitual y el uso problemático de alcohol y tabaco.
- Desarrollar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias.
- Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y salud mental.

Unidades de Análisis

Las unidades de análisis definidas para ENCODAT 2016-2017 son las siguientes:

- Hogar, conjunto de personas relacionadas por algún parentesco o no, que habitualmente duermen en una vivienda¹ bajo el mismo techo, beneficiándose de un ingreso común, aportado por uno o más de los miembros del hogar.
- Adolescentes, integrantes de los hogares con edad entre los 12 a 17 años.
- Adultos, integrantes de los hogares con edad entre los 18 y 65 años.

Estratificación

Debido a que las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en 1998 y 2002 señalaron la existencia de asociaciones estadísticas entre el consumo (alcohol, tabaco, drogas) con el tamaño de localidad, la población objetivo de la ENCODAT 2016-2017 se estratificó como se describe a continuación:

Tabla 1. Estratificación de localidades según urbanidad

Estrato	Descripción de acuerdo a los resultados del Censo 2010
I. Ciudad o área metropolitana	• Capitales de los estados. • Localidades con más de 100 mil habitantes. • Localidades con 2 500 o más habitantes de los municipios que formaban las áreas metropolitanas en el 2000.
II. Complemento urbano	• Localidades no incluidas en los estratos rural y metropolitano.
III. Rural	• Localidades con menos de 2 500 habitantes.

Tamaño de la muestra

La ENCODAT 2016-2017 tuvo como propósito evaluar las tendencias de las prevalencias de consumo, por ello, se buscó que las estimaciones de la ENCODAT 2016-2017 tuvieran precisiones similares a las estimaciones regionales de la ENA 2011 y estatales de la ENA 2008. El tamaño de muestra de entrevistas completas individuales por entidad federativa se determinó con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot (1 - p) \cdot deff}{r^2 \cdot p}$$

En donde:

- n Tamaño de muestra en individuos con entrevista completa.
- p Prevalencia de consumo alguna vez en la vida, $p=71\%$ para alcohol, $p=48\%$ para tabaco y $p=7\%$ para drogas ilegales; estos valores se estimaron de la ENA 2011.

¹Por razones de tipo operativo no se incluyeron viviendas colectivas como: instalaciones militares, cárceles, conventos, hoteles y asilos.

- $z_{\alpha/2}$ Cuantil 97.5%, $(1 - \alpha/2)$ %, de la distribución normal con media cero y varianza uno.
- r Error relativo máximo de estimación en el 95% de las realizaciones del procedimiento de muestreo. $r \cdot p$ es la semi-amplitud del intervalo de confianza al 95%.
- $Deff$ Efecto de diseño: Se interpreta como el número de unidades colectadas por la ENCODAT 2016-2017 que son equivalentes, para propósitos de estimación, a una unidad colectada mediante un muestreo aleatorio simple. El $deff$ asumido fue de 2.18 para las encuestas estatales; el valor 2.18 se eligió porque resultó ser mayor a los efectos de diseño observados en la ENA 2011 para la estimación del consumo alguna vez en la vida de alcohol ($deff=2.0$) y drogas ilegales ($deff=1.9$); el $deff$ para consumo alguna vez en la vida de tabaco fue 2.3. Además, $deff=2.18$ fue usado en la ENA-2008 para las encuestas estatales.
- TR Tasa de respuesta esperada (70%); se eligió 70% porque en la ENA 2011 se obtuvo una tasa de respuesta total del 72%.
- h Promedio de personas seleccionadas por vivienda (1.20), valor que se estimó de la ENA 2011.

El fenómeno del consumo es diferente para cada sustancia (alcohol, tabaco y drogas), por ello, se eligieron diferentes prevalencias (p) para cada sustancia; luego, para cada sustancia se seleccionaron las semi-amplitudes de los intervalos de confianza ($r \cdot p$) y se calculó el tamaño de muestra (Tabla 2). Las semi-amplitudes ($r \cdot p$) se seleccionaron mediante un análisis exploratorio; aquí solo se presenta el resultado final.

Tabla 2. Tamaño de muestra, en entrevistas completas, por estado para las sustancias alcohol, tabaco y drogas.

Sustancia	Prevalencia alguna vez en la vida	Semi-amplitud relativa (r) del intervalo de confianza	Semi-amplitud del intervalo de confianza ($r \cdot p$)	Entrevistas completas de personas 12 a 65 años
Alcohol	71%	4.6%	3.26%	1 617
Tabaco	48%	7.5%	3.60%	1 613
Drogas	7%	26.0%	1.82%	1 646

A partir de la Tabla 2 se eligió un tamaño de muestra de 1 600 individuos como un tamaño de muestra que resultaba apropiado para estimar las prevalencias de alcohol, tabaco y drogas ilegales. Una vez que se determinó $n=1\ 600$ individuos, se dedujo que el número de viviendas por estado que se deberían visitar serían $1\ 600 / (1.2 \cdot 0.7) = 1\ 905$ viviendas por estado. En consecuencia, a nivel nacional se planeó obtener 51 200 cuestionarios individuales completos al visitar 60 952 viviendas. Finalmente, con el fin de constatar que la precisión de la ENCODAT 2016-2017 es comparable a la precisión de las encuestas ENA 2008 y la ENA 2011, en la Tabla 3 se compara el número esperado de entrevistas completas.

Adicionalmente, la Tabla 3 muestra que el número esperado de individuos de la ENCODAT 2016-2017 es mayor o igual al de la ENA 2008; en contraste, el número de individuos por entidad de la ENCODAT 2016-2017 es menor al número obtenido en las regiones de la ENA 2011, pero el incremento en la semi-amplitud de los intervalos es modesto por el siguiente argumento. De modo aproximado, la amplitud de los intervalos de confianza de la ENCODAT 2016-2017 es multiplicada por el factor 1.05 ($\sqrt{437/400}$) para adolescentes y 1.09 ($\sqrt{1426/1200}$) para adultos; por ejemplo, un intervalo de $\pm 5\%$ para adultos de la ENA 2011 pasa a ser de $\pm 5.45\%$. En consecuencia, los tabulados obtenidos en la ENA 2008 y ENA 2011 tienen precisiones similares a los tabulados de la ENCODAT 2016-2017.

Tabla 3. Promedio de entrevistas completas por entidad.

Encuesta*	Promedio de entrevistas completas en personas entre 12 a 17 años	Promedio de entrevistas completas en personas entre 18 a 65 años
ENA 2008 El dominio fue el estado, se excluyeron los estados con sobre-muestra: Estado de México y Quintana Roo	406	1 107
ENA 2011 El dominio fue la región, se excluyó a la región con sobre-muestra: Norte Centro	437	1 426
ENCODAT 2016-2017 El dominio es el estado, ningún dominio tiene sobre-muestra	400	1 200

*Los valores de las encuestas ENA 2008 y ENA 2011 son valores observados; los valores de ENCODAT 2016-2017 son estimados.

Nota sobre la estimación de las prevalencias

La precisión de las estimaciones es expresada mediante intervalos, (a, b), con un nivel de confianza² del 95%. Es importante tomar en cuenta la precisión de las estimaciones de la ENCODAT 2016-2017 en el análisis, porque la amplitud de los intervalos (a, b) puede ser de poca utilidad práctica para algunos lectores; por ejemplo, si el intervalo de confianza es (1%, 6%) y si el usuario toma decisiones diferentes en los escenarios donde la prevalencia de interés es 1% o 6%. En general, se obtienen intervalos de poca utilidad práctica cuando se estiman prevalencias muy pequeñas o cuando se analizan sub-poblaciones donde el tamaño de muestra es reducido; en el caso particular de la ENCODAT 2016-2017, se conmina al lector para que cuando tenga prevalencias estatales menores a 2% revise con atención el intervalo de confianza.

² Intervalo de Confianza al 95%: Intervalo aleatorio (a,b) que cubrirá a la cantidad poblacional de interés (parámetro) en un 95% de las veces que se repita el procedimiento de muestreo; esto es, los intervalos de confianza tienen una tasa de error planeada.

Esquema de Selección

El procedimiento de muestreo de la ENCODAT 2016-2017 es probabilístico, poli-etápico y estratificado. El universo de selección para las unidades primarias de muestreo (UPM) lo conforma el agregado de las AGEB's (Áreas Geo-estadísticas Básicas). El marco de muestreo en la primera etapa es el listado de AGEB (Áreas Geo-estadísticas Básicas) construido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En las áreas rurales se usaron las AGEB del conteo 2005 sólo para formar conglomerados de localidades rurales, pero con información del Censo de Población y Vivienda de 2010; en contraste, en las áreas urbanas se usaron las AGEB y manzanas del Censo 2010. En la primera etapa de muestreo, las AGEB se estratificaron de acuerdo a dos variables: la entidad federativa y la condición de urbanidad descrita en el Tabla 1. En consecuencia, las AGEB del país se dividieron en 96 estratos. Una vez definidos los estratos, el tamaño de muestra por estado ($n=1\ 905$ viviendas) se asignó a los estratos de urbanidad de modo proporcional a su número de habitantes.

Posteriormente, las viviendas se seleccionaron como se describe a continuación.

Estratos urbano y metropolitano

- En la primera etapa se seleccionaron como unidades primarias m_i AGEB con probabilidad proporcional a su tamaño³.
- En la segunda etapa, para cada AGEB seleccionada, se eligieron 6 manzanas con probabilidad proporcional a su tamaño.
- Posteriormente, en las manzanas seleccionadas se formaron K áreas con menos de 80 viviendas, $K = \text{Entero} (\text{Viviendas_localidad}/80) + 1$; luego, se seleccionó una área al azar y en ella se realizó una selección de 6 viviendas utilizando un muestreo sistemático con arranque aleatorio. La selección de viviendas se realizó en campo a partir de un croquis y listado de viviendas del área elaborados por el equipo de campo.

Estrato rural

- En la primera etapa, se seleccionaron como unidades primarias m_i AGEB con probabilidad proporcional su tamaño.
- Posteriormente, se seleccionaron 3 localidades con probabilidad proporcional a su tamaño.
- En la tercera etapa, dado que no existen mapas de manzanas disponibles para las localidades rurales, se formaron K pseudo-manzanas en campo, las cuales estuvieron integradas por áreas de menos de 50 viviendas, $K = \text{Entero} (\text{Viviendas_localidad}/50) + 1$. Luego, se seleccionó una pseudo-manzana con muestreo aleatorio simple por cada localidad, y en ella se generaron conglomerados de aproximadamente 12 viviendas, para finalmente, seleccionar con muestreo aleatorio simple un conglomerado.

³ El número de habitantes es la medida de tamaño usada para la selección de AGEB, localidades y manzanas.

Conviene mencionar que el equipo de campo (Cartógrafos) que hizo la selección de viviendas fue un equipo ajeno al equipo de entrevistadores. Finalmente, una vez seleccionada una vivienda y siempre que la composición del hogar lo permitió, se seleccionó mediante el uso de muestreo aleatorio simple a un adolescente con edad entre 12 a 17 años y a un adulto con edad entre 18 y 65 años. La selección del adolescente y del adulto se realizó mediante una rutina informática que se ejecutaba automáticamente una vez concluido el cuestionario de hogar.

Muestra réplica

Al iniciar la encuesta se generó una muestra réplica de la ENCODAT 2016-2017; esto es, el programa de cómputo usado para seleccionar la muestra se ejecutó dos veces, la primera vez para seleccionar una muestra llamada muestra-ENCODAT 2016-2017 y la segunda vez para seleccionar una muestra llamada muestra-ENCODAT 2016-2017-réplica. El propósito de generar la muestra réplica fue tener un conjunto de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) seleccionadas probabilísticamente que pudieran ser añadidas a la muestra original cuando no fuera posible acceder a alguna UPM de la muestra-ENCODAT 2016-2017, lo cual ocurrió debido a razones de inseguridad o por la negativa de grupos poblacionales para permitir realizar los listados de viviendas.

Cuestionarios para el registro de la información

El cuestionario ENCODAT 2016-2017 tiene como base los cuestionarios de la ENA 2011 y ENA 2008, y está diseñado para estudiar con profundidad el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Las preguntas que estiman las prevalencias de consumo de alcohol y drogas son las mismas y tienen el mismo orden que en el cuestionario ENA 2011. Las preguntas de la sección de tabaco que estiman prevalencias son las mismas, pero en un orden diferente; el cambio de orden tuvo como propósito poder estimar prevalencias de consumo adicionales a las estimadas en la ENA 2011. El cuestionario ENCODAT 2016 se aplicó mediante ACASI (entrevistas auto-administradas por computadoras) a una sub-muestra de personas que han asistido alguna vez a la escuela, la fracción de cuestionarios ACASI asignados fueron diferentes para cada sección: 30% para adolescentes en la sección de tabaco, 15% para adultos en la sección de tabaco, 85% de adolescentes en la sección de alcohol, 60% de adultos en la sección de alcohol y 100% para la sección de drogas. Cuando a un entrevistado el programa de cómputo le asignaba un cuestionario ACASI y el entrevistado indicaba que prefería la entrevista cara a cara, la entrevista se realizaba cara a cara.

Cuestionario de hogar

El informante adecuado para el cuestionario del hogar fue el jefe de hogar, ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más sin impedimentos para poder responder y que conociera las características de la vivienda y sus residentes habituales. El cuestionario de hogar incluyó información referente a las características de la vivienda y sus residentes habituales, e integró el algoritmo de selección de individuos en el hogar a partir del listado de integrantes. Los temas del cuestionario de hogar se pueden clasificar en tres rubros principales:

- Datos de identificación y de control. Se registró información referente a la ubicación de cada vivienda seleccionada: entidad, municipio, localidad, AGEB, manzana, número de vivienda, domicilio y el registro de hasta cuatro visitas del entrevistador.
- Características de la vivienda: total de cuartos, disponibilidad de cocina exclusiva y número de focos.
- Características de los miembros del hogar. Se registró el número de miembros del hogar, y para cada uno se preguntó la siguiente información: nombre, edad, sexo, parentesco y verificación de residencia.

Cuestionario individual

El informante adecuado fue el individuo seleccionado aleatoriamente. Se aplicó un cuestionario individual por informante seleccionado, esto es, una persona entre 12 y 17 años o entre 18 y 65 años de edad cumplidos al momento de la visita. El cuestionario individual recabó información sobre los siguientes temas, de los cuales, los señalados con "Ω" fueron aplicados mediante ACASI.

- Datos Socio-demográficos (DS)
- Tabaco (TB)^{4 Ω}
- Exposición a Drogas (ED)
- Tolerancia Social y Percepción de Riesgo (TS)
- Consumo de Drogas Médicas (DM)^Ω
- Consumo de Drogas Ilegales (DI)^Ω
- Inyección de Drogas (ID)^Ω
- Dificultades Relacionadas al Consumo de Drogas (DP)^{5 Ω}
- Dependencia a Drogas (DD)^Ω
- Alcohol (AL)^Ω
- Dificultades Relacionadas al Consumo de Alcohol (DR)^{6 Ω}
- Pre-coqueo (PR)^{7 Ω};
- Dependencia a Alcohol (CD)^{8 Ω}
- Tratamiento General (TG)^Ω
- Tratamiento con Profesionales (TP)^Ω
- Prevención hacia el Consumo (PC)^Ω
- Malestar Emocional (ME)
- Igualdad de Género (IG)⁹;
- Intento Suicida (IS)^Ω
- Violencia de Pareja (VP)^Ω
- Embarazo (EM)

⁴ Solo la parte de diagnóstico y clasificación de fumador se aplicó en ACASI

⁵ Esta sección se aplicó a quienes consumieron alguna droga médica o ilegal en los últimos 12 meses

⁶ Esta sección se aplicó a quienes consumieron alcohol en los últimos 12 meses

⁷ Esta sección se aplicó a la población de 12 a 29 años con consumo de 4 o 5 copas en una sola ocasión y/o 12 copas en un mismo periodo de 12 meses

⁸ Esta sección se aplicó a la población con consumo de 4 o 5 copas en una sola ocasión y/o 12 copas en un mismo periodo de 12 meses

⁹ Esta sección se aplicó al 30% de la población



- Daño a Otros (DO)⁹
- Conducta Antisocial (CA)
- Percepción de las Drogas (PD)
- Conocimiento sobre SIDA (CS)
- Migración Internacional (MI)
- Ludopatía (LU)
- Uso de Internet (UI)⁹
- Genética (GE)¹⁰

Cuestionarios ENA Tradicional

El cuestionario ENA Tradicional consta de un subconjunto de preguntas del cuestionario individual de la ENA 2011. El cuestionario Tradicional permite estimar todas las prevalencias de consumo estimadas en la ENA 2011 con el mismo algoritmo y preguntas que se ocuparon en la ENA 2011. La muestra del cuestionario ENA Tradicional se seleccionó en las mismas AGEb de la muestra de ENCODAT 2016-2017; los cuestionarios ENA Tradicional se aplicaron en hogares seleccionados mediante un muestreo sistemático con fracción de muestreo $f=28,000/2,400 = 11.66$; esto es, de modo aproximado, cualquier entrevistador aplicó 10.5 cuestionarios ENCODAT 2016-2017 y enseguida un cuestionario ENA Tradicional. De esta manera, los cuestionarios ENA Tradicional se distribuyeron de modo proporcional entre todas las AGEb y entre todos los entrevistadores de la ENCODAT 2016-2017. El número esperado de cuestionarios completos ENA Tradicional fue de 4,800 a nivel nacional, a partir de la visita a 5,714 viviendas, las cuales fueron adicionales a las 60,952 (32×1905) viviendas seleccionadas donde se aplicaría el cuestionario ENCODAT 2016-2017. La muestra del cuestionario ENA Tradicional se aplicó con el propósito de tener estimaciones nacionales de prevalencias de consumo (en 2016-2017) comparables entre el cuestionario ENA Tradicional y la ENA 2011. Las estimaciones de la muestra ENA Tradicional y la muestra ENCODAT 2016-2017 variaron. Dichas variaciones pueden ser atribuidas a la aleatoriedad de las muestras, las diferencias en los cuestionarios o el modo de aplicación de los cuestionarios; pero el resultado general es que las estimaciones de ambos cuestionarios (ENCODAT 2016-2017, ENA Tradicional) apoyan conclusiones con consecuencias prácticas iguales respecto a las políticas de salud pública. En el anexo B se hace una breve comparación de las estimaciones obtenidas por las muestras ENCODAT 2016-2017 y ENA Tradicional.

Programación de los cuestionarios

Para la aplicación de la ENCODAT 2016-2017, se desarrollaron aplicaciones informáticas para los cuestionarios hogar e individual. Cada una de las aplicaciones se programó para: a) seguir los pases que definen el flujo de los cuestionarios y b) validar las respuestas de los entrevistados con respecto a criterios especificados por los investigadores que desarrollaron los cuestionarios. Además, las aplicaciones informáticas se programaron para asegurar que la información se almacenara de forma continua (para evitar que ante fallas de energía se perdiera la información recolectada hasta ese momento), y amigables para el usuario. Las aplicaciones informáticas incorporaron la selección de individuos en el cuestionario de hogar, y utilidades para registro de supervisión, generación de

¹⁰ Esta sección se aplicó a una sub-muestra, la mitad, de las unidades primarias de muestro

comprobantes de la realización de las entrevistas, y compresión de la información para su envío un servidor de almacenamiento. Los archivos de datos se protegieron con contraseñas seguras para evitar su alteración o lectura durante el tránsito en la red. Las aplicaciones informáticas de los cuestionarios tienen como base un autómata de estados finitos desarrollado por el INSP; esto es, las preguntas, respuestas y flujo de los cuestionarios se codifican en tablas de datos que sirven como "entrada" a un programa (autómata) que de modo automático despliega las preguntas, captura las respuestas y guía el flujo de la entrevista.

Sistema de Seguimiento

El sistema de seguimiento se programó como una herramienta para monitorear el avance operativo y la calidad de la información recolectada. El sistema de seguimiento se alimenta día a día con los cuestionarios almacenados por las aplicaciones informáticas; en consecuencia, el sistema de seguimiento permitió generar día a día reportes sobre el avance del trabajo de campo, así como generar reportes con estimaciones preliminares de parámetros de interés.

Logística del trabajo de campo

La ENCODAT 2016-2017 estableció el siguiente procedimiento para su ejecución en campo. El equipo de campo denominado *Cartógrafos* hizo una primera visita a las manzanas y localidades seleccionadas en oficina, durante la visita se elaboraron los croquis y listados de viviendas en las manzanas seleccionadas y se efectuó la selección probabilista de viviendas; además, se identificaron áreas potencialmente riesgosas. Posteriormente, el equipo de campo denominado *Entrevistadores* aplicó el cuestionario de hogar en las viviendas seleccionadas, y al finalizar el cuestionario de hogar, la aplicación informática seleccionó a un adulto y/o un adolescente cuando en el hogar había adultos o adolescentes seleccionables. Finalmente, el equipo de entrevistadores procedió a la aplicación del cuestionario individual a los residentes del hogar seleccionados; adicionalmente, los supervisores, que formaban parte del equipo *Entrevistadores*, verificaron los motivos de la no respuesta.

El personal que participó en el operativo de campo de la ENCODAT 2016-2017 se organizó en función de 8 rutas con duración aproximada de 5 meses. Cada ruta de trabajo incluyó de modo general 1 persona encargada de la coordinación, 2 apoyos de cómputo, 7 supervisores y 4 entrevistadores por supervisor. Teniendo una participación total de 220 Entrevistadores, 55 Supervisores, 24 Cartógrafos, 16 Apoyos de Computo y 8 Coordinadores. En total 323 personas.

Levantamiento de la ENCODAT 2016-2017

La capacitación del personal del equipo de campo se llevó a cabo en la Ciudad de México del 16 al 30 de mayo de 2016 con un día de prueba de campo y recapitación. Se contó con la participación de todos los coordinadores, supervisores, entrevistadores y el personal de apoyo en informática. En virtud de que el número total de personal a capacitar fue de 323 fue necesario dividir al personal en dos grupo denominados A y B. En la primera semana el grupo A recibió entrenamiento en temas que son aplicables a todas las encuestas, por ejemplo, lectura de croquis, técnicas de la entrevista y manejo de computadoras. Por su parte, en la primera semana el grupo B recibió capacitación en temas específicos de la ENCODAT 2016-2017, como el diagrama de flujo del cuestionario y los

objetivos de las preguntas incluidas en el cuestionario. En la segunda semana, las actividades de los grupos A y B se intercambiaron. El equipo de *Cartografía* se capacitó del 2 al 13 de mayo de 2016.

La capacitación referente a la logística del trabajo de campo, aspectos éticos de la encuesta, Tabaquismo y el cuestionario de hogar, estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en tanto que los temas sobre el consumo de alcohol y drogas fueron impartidos por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) proporcionó la capacitación de la sección de Genética. Adicionalmente, derivado del clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país y con la finalidad de proteger al personal operativo, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quien participó con la impartición de un taller sobre la identificación de situaciones de riesgo y prevención del delito de alto impacto. El operativo de la ENCODAT 2015-2017 se desarrolló entre el 1 de junio al 30 de octubre de 2016. Para cada vivienda seleccionada se programaron hasta 4 visitas en horarios y días diferentes e incluyendo fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes.

Supervisión del operativo

Los coordinadores de ruta y los supervisores fueron los encargados de supervisar directamente las entrevistas y de verificar la correcta ubicación de las viviendas. El trabajo de supervisión consideró dos fases:

Planeación y Organización. En esta etapa el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes entre sí para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador que tuvo a su cargo.

Supervisión en Campo. Durante el periodo de realización de entrevistas, el supervisor informó a los entrevistadores sobre las dudas o problemas surgidos durante el desarrollo de las actividades. Adicionalmente, el supervisor verificó que los individuos y hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente 1 de cada 5 entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó el 100% de los códigos de no respuesta.

Como complemento al trabajo de los supervisores, se formaron dos equipos de supervisión ajenos a la estructura operativa de la encuesta, un equipo dirigido y conformado por investigadores del INPRFM y otro equipo dirigido y conformado por investigadores del INSP. Los equipos mencionados monitorearon regularmente las actividades del trabajo de campo en las entidades federativas; también, a partir de análisis preliminares de los cuestionarios colectados, se propusieron acciones destinadas a mejorar el desarrollo de la encuesta.

Consideraciones Éticas

El protocolo de investigación de la encuesta fue evaluado y aprobado por las Comisiones de Investigación y Ética tanto del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz como del Instituto Nacional de Salud Pública. A todos los participantes les fue leída una carta de consentimiento informado y se recabó información sólo de quienes aceptaron participar. En el caso



de los menores de edad, se solicitó a los padres o tutores su autorización para que sus hijo(as) fueran invitados (as) a participar en la encuesta, cuando accedieron, firmaron una carta de consentimiento y posteriormente se buscó el asentimiento del menor. Durante la lectura de las cartas de consentimiento y asentimiento se hizo énfasis en los objetivos de la encuesta, el tipo de información que se buscaba recolectar, el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.

Tasa de Respuesta

La no respuesta ocurre cuando resulta imposible conocer algún atributo de interés “Y” en un hogar seleccionado o en una persona seleccionada para la encuesta. En la ENCODAT 2016-2017 se calcularon tres tasas de respuesta: *colectiva*, *de hogar* e *individual*. La *no respuesta colectiva* describe el no acceso a áreas seleccionadas: localidades, AGEB o manzanas seleccionadas. Los motivos de no acceso son básicamente dos: inseguridad o desacuerdo de grupos de habitantes para participar en la encuesta. La *no respuesta de hogar* describe las razones por las que no fue posible obtener respuesta para el cuestionario de hogar, los motivos más frecuente de la no respuesta de hogar son el rechazo o la ausencia de personas. La *no respuesta individual* describe los motivos por los que las personas seleccionadas no participan en la encuesta. La tasa de respuesta global se definió como producto de las tres tasas de respuesta (*colectiva*, *hogares*, *individuos*). A continuación, se presentan las tasas de respuesta mencionadas.

La tasa de respuesta *colectiva* fue del 95.28% (66 582/69 879) en la muestra original de manzanas y localidades ENCODAT 2016-2017 y del 95.17% (70 756/74 347) en la muestra total de manzanas y localidades, esto es, la muestra que resultó de añadir las AGEB necesarias para compensar la no respuesta colectiva. La tasa de respuesta colectiva se calcula con respecto a viviendas asignadas a localidades y manzanas. Se aclara que la diferencia en el total de viviendas referido en la Tabla 4 y el total de hogares visitados se debe a dos razones: Cuando se identificó una vivienda deshabitada, se añadió a la muestra la vivienda contigua a la derecha y por la adición de viviendas de la muestra réplica en lugares o localidades donde no fue posible acceder a las viviendas seleccionadas.

Tabla 4. Resultado de las visitas del equipo de cartógrafos a las viviendas asignadas

Resultado	Muestra Original de localidades y manzanas		Muestra Total de localidades y manzanas	
	Frecuencia	%	Frecuencia	%
Visitadas	66 582	95%	70 756	95%
Inseguridad y narcotráfico	832	1%	915	1%
No acceso y localidades lejanas	1 106	2%	1 223	2%
No viviendas (reclusorios)*	166	0%	180	0%
Zona residencial	1 359	2%	1 453	2%
Total	70 045	100%	74 527	100%

* =Omitida del cálculo de la no respuesta

La tasa de respuesta en hogares se calculó como el cociente entre el número de entrevistas de hogar completas y el total de hogares que era posible visitar; esto es, se eliminaron del cálculo las viviendas

temporales y deshabitadas. En la Tabla 5 se presentan las tasas de respuesta de hogares: a) 88.35% (52 488/59 381) en hogares donde se aplicó el cuestionario ENCODAT 2016-2017 y pertenecen a localidades/manzanas de la muestra original de AGEb/localidades, b) 88.34% (55 907/63 285) en hogares donde se aplicó el cuestionario ENCODAT y c) 88.44% (61 250/69 251) en hogares donde se aplicó el cuestionario ENCODAT o el cuestionario ENA Tradicional.

La tasa de respuesta en individuos se calculó como el cociente entre el número de entrevistas de individuo completas y el total de individuos que era posible entrevistar; se eliminaron del cálculo los individuos que al momento de la entrevista reportaron tener una edad menor a 12 años o mayor a 65 años. La Tabla 6 presenta las tasas de respuesta de individuos: a) 87.03% (53 313/61 219) en individuos donde se aplicó el cuestionario ENCODAT 2016-2017 y pertenecen a localidades/manzanas de la muestra original de AGEb/localidades, b) 87.12% (56 877/65 243) en individuos donde se aplicó el cuestionario ENCODAT y c) 87.49% (62 684/71 602) en individuos donde se aplicó el cuestionario ENCODAT o el cuestionario ENA Tradicional. Resumiendo, puede considerarse que la tasa de respuesta global fue de 73.64% ($0.8749 \times 0.9517 \times 0.8844$).

Tabla 5. Resultado de las entrevistas de hogar

Resultado	Original ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016- 2017 y ENA Tradicional	
	N	%	N	%	N	%
Entrevista completa	52 468	85	55 907	85	61 250	85
Entrevista incompleta	19	0	20	0	21	0
Informante inadecuado	89	0	95	0	100	0
Entrevista aplazada	5	0	6	0	6	0
Informantes ausentes	3 067	5	3 306	5	3 594	5
Entrevista negativa	3 327	5	3 529	5	3 818	5
Vivienda deshabitada	1 100	2	1 176	2	1 258	2
Vivienda temporal	1 026	2	1 086	2	1 199	2
Vivienda no localizada	5	0	5	0	6	0
Otro	401	1	417	1	456	1
Total	61 507	100	65 547	100	71 708	100

Finalmente, en el anexo A se presentan las tasas de respuesta estatales para los hogares e individuos donde se aplicaron los cuestionarios ENCODAT 2016-2017, así como las tasas de respuesta estatales colectivas.




Tabla 6. Resultado de las entrevistas individuales

Resultado	Original ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017		Total ENCODAT 2016-2017 y ENA Tradicional	
	N	%	N	%	N	%
Entrevista completa	53,313	87	56,877	87	62,684	87
Entrevistado fuera de rango*	39	0	42	0	45	0
Entrevista incompleta	65	0	71	0	72	0
Informante inadecuado	403	1	432	1	467	1
Entrevista aplazada	6	0	8	0	8	0
Ocupantes ausentes	3,290	5	3,504	5	3,704	5
Negativa a dar información	2,035	3	2,149	3	2,281	3
Otro	155	0	162	0	172	0
Cancelada por calidad	1,952	3	2,040	3	2,214	3
Total	61 258	100	65 285	100	71 647	100

* = Omitida del cálculo de la no respuesta



RESULTADOS PRINCIPALES



RESULTADOS PRINCIPALES

En esta sección se describen los resultados principales de drogas. Se presentan prevalencias sobre algunos factores relacionados con el consumo, tales como la exposición a la prevención y al consumo de drogas, percepción de riesgo y tolerancia social, así como las prevalencias y tendencias de consumo a nivel estatal y regional; además se presentan las tendencias de edad de inicio del consumo de drogas y porcentajes de dificultades relacionadas al consumo, tratamiento y necesidades de atención.

Prevalencias y tendencias del consumo de drogas

a) Población Total

En la población total, el consumo de cualquier droga, de drogas ilegales y de marihuana alguna vez en la vida ha aumentado significativamente entre el 2011 y el 2016, al pasar de 7.8%, 7.2% y 6% a 10.3%, 9.9% y 8.6% (respectivamente).

El consumo de las demás drogas se mantuvo estable. Esta situación se repite en ambos sexos, pues en hombres aumentó el consumo de cualquier droga de 13% a 16.2%, drogas ilegales de 12.5% a 15.8% y marihuana de 10.6% a 14%. En mujeres incrementa cerca de 2 veces el consumo de marihuana (de 1.6% en 2011 a 3.7% en 2016), y de drogas ilegales (de 2.3% a 4.3%) y en cualquier droga aumenta de 3% a 4.8% (Cuadro 1A).

Con respecto a las prevalencias de consumo de drogas en el último año, siguen el mismo patrón que las prevalencias de alguna vez; el consumo de cualquier droga incrementó de 1.8% a 2.9%, el de drogas ilegales pasó de 1.5% a 2.7% y el consumo de marihuana de 1.2% a 2.1% en la población total. En hombres aumentó el consumo de cualquier droga en el último año (3% en 2011 a 4.6% en 2016), de drogas ilegales (de 2.6% a 4.4%) y marihuana (de 2.2% a 3.5%); en las mujeres el crecimiento fue mayor, al triplicarse el consumo en la prevalencia de marihuana en el último año (de 0.3% a 0.9%) y de drogas ilegales (0.4% a 1.1%) y al duplicarse el consumo de cualquier droga de 0.7% a 1.3% (Cuadro 1B).

En cuanto a la dependencia a drogas en el último año, es reportada por el 0.6% de la población, (1.1% en hombres y 0.2% mujeres) y aunque existe una gran diferencia en los porcentajes entre ambos sexos, esta es más evidente en hombres (2%) y mujeres (0.3%) entre 18 y 34 años (Gráfica 1).



Cuadro 1A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 12 a 65 años

	2002	2008		2011		2016
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	3.5	4.2	6.0	5.367-6.570	8.6*	8.184-9.114
Cocaína	1.2	2.4	3.3	2.828-3.680	3.5	3.231-3.819
Crack	0.1	0.6	1.0	0.736-1.294	0.9	0.736-0.991
Alucinógenos	0.3	0.4	0.7	0.451-0.945	0.7	0.542-0.825
Inhalables	0.5	0.7	0.9	0.656-1.170	1.1	0.942-1.287
Heroína	0.1	0.1	0.2	0.055-0.394	0.2	0.097-0.244
Metanfetaminas	0.1	0.5	0.8	0.551-1.085	0.9	0.731-1.013
Drogas Ilegales	4.1	5.2	7.2	6.568-7.864	9.9*	9.372-10.391
Cualquier Droga	5.0	5.7	7.8	7.168-8.495	10.3*	9.788-10.813
Hombres						
Mariguana	6.9	7.2	10.6	9.499-11.692	14.0*	13.130-14.804
Cocaína	2.2	4.1	5.9	5.111-6.774	6.2	5.624-6.727
Crack	0.2	1.0	2.0	1.390-2.521	1.5	1.295-1.793
Alucinógenos	0.5	0.6	1.1	0.671-1.589	1.0	0.756-1.228
Inhalables	0.9	1.3	1.5	1.040-2.053	1.7	1.399-2.021
Heroína	0.2	0.3	0.4	0.100-0.800	0.3	0.189-0.494
Metanfetaminas	0.1	0.8	1.3	0.781-1.726	1.4	1.154-1.595
Drogas Ilegales	8.0	8.8	12.5	11.308-13.720	15.8*	14.938-16.757
Cualquier Droga	8.6	9.1	13.0	11.793-14.215	16.2*	15.240-17.062
Mujeres						
Mariguana	0.7	1.4	1.6	1.217-2.051	3.7*	3.276-4.091
Cocaína	0.4	0.7	0.7	0.489-0.981	1.1	0.856-1.244
Crack	***	0.2	0.1	0.025-0.244	0.2	0.145-0.312
Alucinógenos	0.1	0.1	0.3	0.072-0.515	0.4	0.232-0.559
Inhalables	0.1	0.2	0.3	0.168-0.472	0.6	0.394-0.722
Heroína	***	***	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.2	0.4	0.124-0.697	0.4	0.243-0.562
Drogas Ilegales	1.0	1.9	2.3	1.760-2.747	4.3*	3.869-4.753
Cualquier Droga	2.1	2.6	3.0	2.459-3.513	4.8*	4.382-5.293

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**Cuadro 1B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 12 a 65 años**

	2002 %	2008 %	%	2011 IC 95%	%	2016 IC 95%
Total						
Mariguana	0.6	1.0	1.2	0.957-1.461	2.1*	1.911-2.362
Cocaína	0.3	0.4	0.5	0.351-0.643	0.8	0.632-0.971
Crack	***	0.1	0.1	0.033-0.193	0.2	0.112-0.240
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.010-0.146	0.2	0.086-0.233
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.049-0.194	0.2	0.178-0.318
Heroína	***	***	***	---	***	0.006-0.049
Metanfetaminas	***	0.1	0.2	0.068-0.233	0.2	0.178-0.309
Drogas Ilegales	0.8	1.4	1.5	1.229-1.782	2.7*	2.417-2.947
Cualquier droga	1.3	1.6	1.8	1.529-2.120	2.9*	2.670-3.216
Hombres						
Mariguana	1.2	1.7	2.2	1.717-2.657	3.5*	3.032-3.871
Cocaína	0.7	0.8	0.9	0.636-1.211	1.4	1.055-1.729
Crack	***	0.2	0.2	0.055-0.379	0.3	0.165-0.406
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.005-0.275	0.2	0.132-0.296
Inhalables	0.2	0.2	0.2	0.066-0.336	0.4	0.263-0.523
Heroína	***	0.1	***	---	0.1	0.008-0.098
Metanfetaminas	0.1	0.2	0.2	0.103-0.346	0.4	0.271-0.510
Drogas Ilegales	1.7	2.3	2.6	2.126-3.147	4.4*	3.897-4.906
Cualquier droga	2.2	2.5	3.0	2.435-3.516	4.6*	4.139-5.160
Mujeres						
Mariguana	0.1	0.4	0.3	0.084-0.502	0.9*	0.710-1.107
Cocaína	***	0.1	0.1	0.027-0.169	0.2	0.157-0.342
Crack	--	***	***	---	0.1	0.024-0.124
Alucinógenos	***	***	***	---	0.1	---
Inhalables	***	***	***	---	0.1	0.054-0.173
Heroína	--	***	--	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.1	0.1	---	0.1	0.044-0.169
Drogas Ilegales	0.1	0.5	0.4	0.200-0.692	1.1*	0.867-1.286
Cualquier droga	0.5	0.8	0.7	0.470-1.023	1.3*	1.113-1.585

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.


Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Gráfica 1. Dependencia a Drogas en la Población de 12 a 65 años



***Porcentaje menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

b) Población de 12 a 17 años

En adolescentes, el consumo alguna vez aumentó entre 2011 y 2016 de 3.3% a 6.4% para cualquier droga, de 2.9% a 6.2% en drogas ilegales y de 2.4% a 5.3% en marihuana. Cocaína se mantiene estable.

También se observa que en los hombres las prevalencias de alguna vez tienen cambios significativos (de 3.9% a 6.6% en drogas ilegales, de 4% a 6.6% en cualquier droga y de 3.5% a 5.8% para marihuana).

En las mujeres aumentó de 2.6% a 6.1% el consumo de cualquier droga alguna vez, de 1.9% a 5.8% el de drogas ilegales y de 1.3% a 4.8% el de marihuana (Cuadro 2).

El consumo en el último año en la población total aumentó casi el doble: cualquier droga de 1.6% en 2011 a 3.1% en 2016, de drogas ilegales, de 1.5% a 2.9% y de marihuana de 1.3% a 2.6%. Sólo en el caso de las mujeres se presentaron incrementos en la prevalencia del último año: cualquier droga de 1.1% a 2.7%, drogas ilegales de 0.9% a 2.3% y marihuana de 0.6% a 2.1% (Cuadro 2).

**Cuadro 2: Tendencias del consumo de drogas.
Población de 12 a 17 años**

Alguna Vez	2002 %	2008 %	%	2011 IC 95%	%	2016 IC 95%
Total						
Mariguana	1.1	2.0	2.4	1.719-3.082	5.3*	4.562-6.068
Cocaína	0.2	0.8	0.7	0.396-1.066	1.1	0.805-1.345
Drogas ilegales	1.3	2.6	2.9	2.208-3.672	6.2*	5.211-7.191
Cualquier droga	1.6	2.9	3.3	2.546-4.110	6.4*	5.365-7.352
Hombres						
Mariguana	2.1	2.9	3.5	2.272-4.665	5.8*	4.965-6.681
Cocaína	0.4	1.2	0.8	0.305-1.212	1.0	0.733-1.284
Drogas ilegales	2.3	3.5	3.9	2.688-5.161	6.6*	5.507-7.633
Cualquier droga	2.4	3.7	4.0	2.796-5.286	6.6*	5.567-7.697
Mujeres						
Mariguana	0.2	1.2	1.3	0.658-1.950	4.8*	3.659-5.931
Cocaína	0.1	0.4	0.7	0.223-1.181	1.1	0.676-1.610
Drogas ilegales	0.3	1.6	1.9	1.130-2.728	5.8*	4.380-7.266
Cualquier droga	0.7	2.1	2.6	1.604-3.586	6.1*	4.632-7.527
Último Año						
Total						
Mariguana	0.5	1.2	1.3	0.816-1.835	2.6*	2.194-3.011
Cocaína	0.2	0.4	0.4	0.160-0.641	0.6	0.381-0.800
Drogas ilegales	0.7	1.5	1.5	1.001-2.081	2.9*	2.469-3.308
Cualquier droga	0.8	1.7	1.6	1.093-2.188	3.1*	2.619-3.483
Hombres						
Mariguana	0.9	1.7	2.0	1.111-2.927	3.1	2.492-3.696
Cocaína	0.3	0.6	0.4	0.097-0.667	0.6	0.396-0.840
Drogas ilegales	1.3	2.1	2.2	1.233-3.072	3.4	2.810-4.046
Cualquier droga	1.4	2.1	2.2	1.233-3.072	3.4	2.822-4.058
Mujeres						
Mariguana	0.1	0.6	0.6	0.176-1.050	2.1*	1.526-2.674
Cocaína	0.1	0.2	0.4	0.053-0.787	0.6	0.202-0.922
Drogas ilegales	0.2	0.9	0.9	0.376-1.451	2.3*	1.750-2.923
Cualquier droga	0.3	1.3	1.1	0.545-1.683	2.7*	2.030-3.278

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

c) Población de 18 a 34 años

En este grupo de edad, incrementaron las prevalencias alguna vez con respecto a 2011 en cualquier droga (11.3% a 15%), drogas ilegales (10.6% a 14.5%) y mariguana (8.7% a 12.8%). En los hombres aumentó de 18.5% a 22.8% para cualquier droga, de 17.8% a 22.6% en drogas ilegales y de 15% a 20% en mariguana.

En el caso de las mujeres, se tiene el mismo patrón de aumento (de 4.6% a 7.6% cualquier droga, de 3.9% a 7% drogas ilegales y de 2.8% a 6.1% mariguana) (Cuadro 3A).

Cuadro 3A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 18 a 34 años

	2002 %	2008 %	%	2011 IC 95%	%	2016 IC 95%
Total						
Mariguana	4.6	5.5	8.7	7.541-9.906	12.8*	11.891-13.684
Cocaína	2.4	3.6	5.2	4.278-6.085	5.2	4.542-5.801
Crack	0.2	1.0	1.9	1.197-2.521	1.4	1.086-1.645
Alucinógenos	0.4	0.5	1.3	0.718-1.894	1.2	0.828-1.480
Inhalables	0.8	1.0	1.3	0.736-1.885	1.6	1.248-1.977
Heroína	0.2	0.2	0.3	---	0.3	0.131-0.434
Metanfetaminas	0.1	0.8	1.5	0.876-2.141	1.5	1.219-1.826
Cualquier droga ilegal	5.7	7.1	10.6	9.364-11.898	14.5*	13.541-15.493
Cualquier droga	6.5	7.5	11.3	10.018-12.582	15.0*	14.007-15.964
Hombres						
Mariguana	9.3	9.5	15.0	12.858-17.152	20.0*	18.381-21.597
Cocaína	4.4	6.3	9.4	7.638-11.221	8.9	7.697-10.083
Crack	0.5	1.7	3.5	2.186-4.874	2.4	1.877-2.974
Alucinógenos	0.7	0.8	2.0	0.923-3.085	1.6	1.048-2.127
Inhalables	1.7	1.8	2.3	1.136-3.449	2.6	1.918-3.253
Heroína	0.4	0.4	0.6	---	0.6	0.256-0.880
Metanfetaminas	0.2	1.3	2.3	1.162-3.405	2.5	2.004-3.009
Cualquier droga ilegal	11.0	11.8	17.8	15.474-20.121	22.6*	20.824-24.299
Cualquier droga	11.5	12.1	18.5	16.112-20.794	22.8*	21.102-24.581
Mujeres						
Mariguana	1.1	1.9	2.8	1.895-3.802	6.1*	5.182-6.934
Cocaína	0.9	1.2	1.2	0.693-1.726	1.7	1.283-2.112
Crack	***	0.4	0.3	0.028-0.563	0.4	0.203-0.549
Alucinógenos	0.1	0.2	0.7	0.106-1.200	0.7	0.367-1.131
Inhalables	0.1	0.2	0.4	0.117-0.666	0.7	0.397-1.010
Heroína	0.1	***	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.3	0.8	0.120-1.448	0.6	0.318-0.889
Cualquier droga ilegal	1.7	2.8	3.9	2.790-5.068	7.0*	6.082-7.915
Cualquier droga	2.8	3.3	4.6	3.428-5.794	7.6*	6.696-8.591

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.
Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Para los porcentajes de último año, nuevamente se presentan incrementos significativos: cualquier droga pasó de 2.8% a 5%, el consumo de drogas ilegales se duplicó (de 2.3% a 4.6%) y mariguana de 1.9% a 3.5% (Cuadro 3B).

En hombres, cualquier droga incrementó de 4.7% a 8.2%, drogas ilegales de 4.1% a 7.8% y mariguana de 3.4% a 5.9%. En el caso de mujeres únicamente fue significativo el aumento en drogas ilegales (de 0.6% a 1.6%) (Cuadro 3B).

**Cuadro 3B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 18 a 34 años**

	2002 %	2008 %	%	2011 IC 95%	%	2016 IC 95%
Total						
Mariguana	1.0	1.4	1.9	1.295-2.423	3.5*	3.027-4.033
Cocaína	0.6	0.7	0.8	0.476-1.106	1.5	1.065-1.862
Crack	***	0.2	0.2	0.041-0.423	0.3	0.135-0.413
Alucinógenos	***	0.1	0.2	---	0.3	0.130-0.482
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.018-0.270	0.3	0.182-0.486
Heroína	***	***	***	---	***	---
Metanfetaminas	0.1	0.2	0.2	0.064-0.313	0.4	0.285-0.586
Drogas ilegales	1.4	2.0	2.3	1.681-2.907	4.6*	3.992-5.205
Cualquier droga	1.9	2.2	2.8	2.164-3.479	5.0*	4.347-5.582
Hombres						
Mariguana	2.2	2.4	3.4	2.344-4.411	5.9*	4.973-6.847
Cocaína	1.3	1.3	1.6	0.949-2.241	2.6	1.836-3.434
Crack	0.1	0.4	0.4	0.051-0.825	0.5	0.205-0.765
Alucinógenos	***	0.1	0.3	---	0.4	0.197-0.561
Inhalables	0.1	0.2	0.2	0.009-0.425	0.6	0.319-0.921
Heroína	0.1	0.1	***	---	0.1	---
Metanfetaminas	0.1	0.3	0.4	0.123-0.637	0.7	0.453-1.023
Drogas ilegales	3.0	3.3	4.1	3.011-5.279	7.8*	6.644-8.957
Cualquier droga	3.6	3.4	4.7	3.472-5.865	8.2*	7.022-9.352
Mujeres						
Mariguana	0.2	0.5	0.4	---	1.3	0.874-1.738
Cocaína	***	0.2	***	---	0.4	0.190-0.547
Crack	--	0.1	***	---	0.1	0.015-0.139
Alucinógenos	***	***	--	---	0.2	---
Inhalables	--	***	0.1	---	0.1	---
Heroína	--	--	--	---	***	---
Metanfetaminas	--	0.1	***	---	0.2	0.034-0.274
Drogas ilegales	0.2	0.8	0.6	0.045-1.081	1.6*	1.146-2.066
Cualquier droga	0.7	1.0	1.1	0.497-1.690	2.0	1.443-2.464

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

d) Población de 35 a 65 años

En general se mantuvo estable el consumo de sustancias para alguna vez en este grupo de edad; únicamente la prevalencia de mariguana se incrementó significativamente de 4.8% a 6.1%. Es importante mencionar que aunque no se encontraron aumentos estadísticamente significativos en el consumo con respecto a 2011, sí hay diferencias importantes entre el consumo de hombres y mujeres (Cuadro 4A).

**Cuadro 4A: Tendencias del consumo de drogas alguna vez.
Población de 35 a 65 años**

	2002 %	2008 %	%	2011 IC 95%	%	2016 IC 95%
Total						
Mariguana	3.5	3.8	4.8	4.141-5.509	6.1*	5.534-6.722
Cocaína	0.6	1.8	2.5	1.983-2.945	3.0	2.622-3.294
Crack	***	0.3	0.6	0.372-0.811	0.6	0.456-0.722
Alucinógenos	0.2	0.3	0.4	0.184-0.546	0.4	0.270-0.509
Inhalables	0.2	0.5	0.5	0.314-0.765	0.6	0.408-0.736
Heroína	***	0.1	0.2	0.082-0.360	0.1	0.021-0.216
Metanfetaminas	***	0.3	0.4	0.181-0.600	0.4	0.278-0.477
Cualquier droga ilegal	4.0	4.5	5.7	4.988-6.496	7.0	6.426-7.648
Cualquier droga	5.3	5.2	6.4	5.614-7.179	7.5	6.891-8.132
Hombres						
Mariguana	7.1	6.9	9.4	8.045-10.820	11.7	10.494-12.870
Cocaína	1.3	3.3	4.8	3.864-5.806	5.8	5.085-6.446
Crack	***	0.6	1.2	0.768-1.682	1.2	0.916-1.475
Alucinógenos	0.5	0.5	0.8	0.370-1.131	0.7	0.463-0.907
Inhalables	0.5	1.0	1.1	0.604-1.497	1.1	0.769-1.429
Heroína	***	0.2	0.5	0.174-0.758	0.3	0.044-0.457
Metanfetaminas	0.1	0.5	0.7	0.321-1.037	0.7	0.518-0.898
Cualquier droga ilegal	8.2	8.2	11.1	9.617-12.666	13.4	12.160-14.601
Cualquier droga	9.2	8.6	11.6	10.080-13.183	13.8	12.581-15.034
Mujeres						
Mariguana	0.5	1.0	0.7	0.322-0.989	1.1	0.869-1.385
Cocaína	0.1	0.4	0.3	0.109-0.527	0.4	0.277-0.583
Crack	--	***	***	---	***	0.016-0.070
Alucinógenos	***	0.1	***	---	0.1	0.015-0.232
Inhalables	***	0.1	0.1	---	0.1	0.003-0.193
Heroína	--	***	--	---	--	---
Metanfetaminas	--	0.1	0.1	---	0.1	0.023-0.138
Cualquier droga ilegal	0.6	1.2	0.9	0.469-1.242	1.3	1.055-1.596
Cualquier droga	2.0	2.1	1.7	1.148-2.171	1.8	1.517-2.169

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Respecto a las prevalencias en el último año no se encontraron incrementos significativos en esta población. La prevalencia de consumo total fue del 1%, con 1.8% para los hombres y 0.3% para las mujeres (Cuadro 4B).

**Cuadro 4B: Tendencias del consumo de drogas en el último año.
Población de 35 a 65 años**

	2002 %	2008 %	%	2011 IC 95%	%	2016 IC 95%
Total						
Mariguana	0.2	0.6	0.6	0.352-0.779	0.7	0.510-0.831
Cocaína	0.2	0.2	0.3	0.132-0.398	0.3	0.168-0.378
Crack	--	***	0.1	---	0.1	0.011-0.090
Alucinógenos	***	***	***	---	***	---
Inhalables	0.1	0.1	***	---	***	0.013-0.073
Heroína	--	0.1	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	***	0.1	---	0.1	0.034-0.101
Drogas ilegales	0.3	0.8	0.8	0.507-1.025	0.8	0.666-1.004
Cualquier droga	0.9	1.0	1.0	0.693-1.267	1.0	0.847-1.225
Hombres						
Mariguana	0.5	1.1	1.1	0.702-1.583	1.3	0.966-1.612
Cocaína	0.4	0.4	0.5	0.249-0.793	0.5	0.326-0.765
Crack	--	0.1	0.1	---	0.1	0.019-0.184
Alucinógenos	***	0.1	***	---	***	---
Inhalables	0.2	0.1	***	---	0.1	0.028-0.154
Heroína	--	0.1	***	---	***	---
Metanfetaminas	***	0.1	0.1	---	0.1	0.072-0.213
Drogas ilegales	0.7	1.4	1.4	0.953-1.900	1.6	1.268-1.952
Cualquier droga	1.4	1.7	1.7	1.206-2.262	1.8	1.461-2.189
Mujeres						
Mariguana	***	0.1	***	---	0.1	0.021-0.207
Cocaína	***	***	***	---	***	0.003-0.052
Crack	--	***	--	---	***	---
Alucinógenos	--	***	--	---	--	---
Inhalables	--	0.1	--	---	--	---
Heroína	--	--	--	---	--	---
Metanfetaminas	--	***	0.1	---	--	---
Drogas ilegales	***	0.1	0.2	---	0.1	0.041-0.233
Cualquier droga	0.5	0.4	0.3	0.029-0.566	0.3	0.187-0.465

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.


***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Tendencias en la edad de inicio del consumo de drogas

Con respecto a la edad de inicio del consumo de drogas (Gráfica 2), se observan disminuciones a lo largo de los años (20.6 años en 2002, 18.7 en 2008, 18.8 en 2011 y 17.8 años en 2016). Por sexo también se observa este patrón, en los hombres pasó de 19.8 años en 2002 a 17.7 años en 2016 y en las mujeres de 23.6 años a 18.2 años. Adicionalmente se observa que la edad de inicio de los y las consumidores (as) es prácticamente la misma.

Gráfica 2. Tendencias de la media de edad de inicio del Consumo de Drogas en la Población de 12 a 65 años



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008, 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Tendencias regionales del consumo de drogas (Encuestas 2011-2016)

a) Población Total

Debido a que la ENA 2011 sólo tiene una representación regional y nacional, las tendencias que en esta sección se presentan son regionales. De manera que el consumo de cualquier droga alguna vez aumentó significativamente con respecto a 2011 en la población total en las regiones Occidental (de 10.3% a 14.4%), Norcentral (de 8.4 a 11.5%), Sur (de 5.3% a 9.6%) y Centro (de 6.6% a 9.4%).

El consumo de drogas ilegales se incrementó al pasar de 9.2% a 13.7% en la región Occidental, de 7.3% a 10.9% en la región Norcentral, de 5% a 9.3% en la región Sur y de 6.2% a 9.1% en el Centro.

En el caso de los hombres, sólo se observa aumento significativo en la región Sur, tanto para cualquier droga (de 9.3% a 15.7%), como para drogas ilegales (de 9.1% a 15.6%), mientras que en las mujeres el consumo de cualquier droga incrementó significativamente en las regiones Occidental (de 3.8% a 8%), Noroccidental (de 1.9% a 4.4%), Centro Sur (de 1.9% a 3.9%) y Sur (de 1.5% a 3.9%), y el consumo de drogas ilegales presentó aumento en la regiones Norcentral (1.9% a 4.8%), Noroccidental (1.5% a 4.1%), Occidental (2.4% a 7.2%), Centro Sur (1.3% a 3.2%) y Sur (1% a 3.4%) (Cuadro 5A).

Por su parte, el consumo de cualquier droga en el último año en la población total ha aumentado de 2% a 4.5% en la región Occidental, de 2% a 3.8% en la región Norcentral, y de 0.8% a 2.2% en el Sur, mientras que el consumo de drogas ilegales en el último año aumentó significativamente de 1.5% a 4.1% en el Occidente, de 1.6% a 3.3% en la región Norcentral, de 1.2% a 2.4% en el Centro y de 0.6% a 2% en el Sur.



El consumo de cualquier droga en el último año aumentó significativamente en los hombres de las regiones Occidental (de 3.2% a 6.8%) y Sur (de 1% a 3.5%), y el consumo de drogas ilegales en el último año incrementó en las regiones Occidental (de 2.7% a 6.6%), Centro (de 1.7% a 4%) y Sur (de 0.9% a 3.4%). En las mujeres no hubo cambios significativos en las prevalencias de cualquier droga o drogas ilegales en las regiones, pero sí en el porcentaje nacional con respecto a 2011, tanto en cualquier droga (de 0.7% a 1.3%) como en drogas ilegales (de 0.4% a 1.1%) (Cuadro 5B).

**Cuadro 5A: Tendencias regionales del consumo de drogas alguna vez.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total								
Norcentral	8.4	6.970-9.875	7.3	5.933-8.748	11.5*	10.293-12.750	10.9*	9.698-12.139
Noroccidental	9.2	7.810-10.683	9.0	7.529-10.423	11.5	10.400-12.503	11.2	10.121-12.208
Nororiental	9.6	8.036-11.071	8.9	7.412-10.413	10.2	8.926-11.464	9.7	8.458-10.935
Occidental	10.3	8.240-12.326	9.2	7.233-11.231	14.4*	12.328-16.437	13.7*	11.655-15.752
Centro	6.6	5.092-8.186	6.2	4.697-7.709	9.4*	8.302-10.501	9.1*	7.981-10.194
Ciudad de México	8.8	6.885-10.733	7.9	6.117-9.709	10.6	8.355-12.906	10.3	8.021-12.543
Centro Sur	7.5	6.027-8.985	6.8	5.345-8.348	8.5	7.556-9.533	8.1	7.101-9.008
Sur	5.3	3.798-6.829	5.0	3.501-6.454	9.6*	8.585-10.682	9.3*	8.296-10.353
Nacional	7.8	7.177-8.485	7.2	6.577-7.855	10.3*	9.788-10.813	9.9*	9.372-10.391
Hombres								
Norcentral	13.6	11.013-16.089	13.0	10.428-15.545	17.8	15.575-20.039	17.2	14.971-19.443
Noroccidental	16.5	13.757-19.204	16.3	13.606-19.080	18.5	16.644-20.276	18.2	16.388-19.985
Nororiental	15.5	12.533-18.476	15.0	12.055-18.003	15.5	13.315-17.648	15.2	13.071-17.407
Occidental	17.2	13.713-20.607	16.5	13.038-19.954	21.2	17.675-24.686	20.6	17.077-24.087
Centro	10.6	7.722-13.454	10.1	7.216-12.948	14.7	12.687-16.731	14.4	12.410-16.455
Ciudad de México	12.6	9.471-15.735	11.9	8.851-15.009	17.5	13.499-21.543	17.3	13.315-21.298
Centro Sur	13.6	10.632-16.660	13.0	9.998-16.031	13.6	11.770-15.411	13.4	11.554-15.189
Sur	9.3	6.398-12.116	9.1	6.252-11.991	15.7*	13.874-17.538	15.6*	13.720-17.383
Nacional	13.0	11.792-14.216	12.5	11.302-13.726	16.2*	15.240-17.062	15.8*	14.938-16.757
Mujeres								
Norcentral	3.5	2.296-4.701	1.9	0.943-2.894	5.4	4.270-6.620	4.8*	3.747-5.934
Noroccidental	1.9	1.038-2.837	1.5	0.752-2.314	4.4*	3.500-5.335	4.1*	3.216-5.017
Nororiental	3.8	2.118-5.419	3.0	1.372-4.562	5.1	3.914-6.321	4.4	3.283-5.464
Occidental	3.8	2.108-5.470	2.4	0.965-3.779	8.0*	5.710-10.229	7.2*	4.958-9.472
Centro	3.0	1.666-4.375	2.6	1.331-3.969	4.6	3.659-5.488	4.2	3.329-5.120
Ciudad de México	5.4	3.285-7.434	4.3	2.420-6.103	4.3	2.678-5.972	3.9	2.251-5.460
Centro Sur	1.9	1.108-2.763	1.3	0.559-1.943	3.9*	3.116-4.773	3.2*	2.495-3.920
Sur	1.5	0.608-2.470	1.0	0.182-1.841	3.9*	3.069-4.719	3.4*	2.644-4.234
Nacional	3.0	2.438-3.535	2.3	1.740-2.767	4.8*	4.382-5.293	4.3*	3.869-4.753

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

**Cuadro 5B: Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total								
Norcentral	2.0	1.321-2.773	1.6	0.926-2.320	3.8*	3.042-4.461	3.3*	2.629-4.013
Noroccidental	2.9	2.055-3.773	2.8	1.945-3.660	3.6	2.984-4.259	3.5	2.846-4.108
Nororiental	3.1	1.966-4.275	2.4	1.348-3.474	2.7	2.011-3.345	2.4	1.722-2.989
Occidental	2.0	1.365-2.627	1.5	0.921-2.014	4.5*	3.111-5.827	4.1*	2.807-5.491
Centro	1.5	0.837-2.131	1.2	0.591-1.784	2.6	2.047-3.080	2.4*	1.913-2.920
Ciudad de México	2.1	1.186-2.976	1.7	0.874-2.575	2.9	1.710-4.107	2.7	1.561-3.929
Centro Sur	1.5	0.717-2.200	1.3	0.604-2.069	2.6	2.072-3.132	2.1	1.669-2.608
Sur	0.8	0.311-1.194	0.6	0.145-0.963	2.2*	1.736-2.631	2.0*	1.536-2.412
Nacional	1.8	1.529-2.120	1.5	1.229-1.782	2.9*	2.670-3.216	2.7*	2.417-2.947
Hombres								
Norcentral	3.2	1.765-4.610	3.0	1.588-4.340	5.7	4.431-6.946	5.3	4.043-6.516
Noroccidental	5.3	3.557-7.034	5.3	3.557-7.034	6.2	4.978-7.334	6.0	4.812-7.135
Nororiental	5.3	3.132-7.520	4.5	2.424-6.630	3.7	2.502-4.884	3.4	2.267-4.607
Occidental	3.2	2.018-4.316	2.7	1.619-3.811	6.8*	4.340-9.315	6.6*	4.095-9.058
Centro	2.1	1.000-3.223	1.7	0.684-2.670	4.1	3.111-5.119	4.0*	3.015-5.016
Ciudad de México	3.3	1.694-4.923	2.6	1.141-4.115	4.9	2.623-7.208	4.7	2.448-6.997
Centro Sur	2.7	1.270-4.228	2.7	1.270-4.228	4.1	3.106-5.054	3.5	2.593-4.413
Sur	1.0	0.224-1.767	0.9	0.102-1.603	3.5*	2.703-4.360	3.4*	2.569-4.218
Nacional	3.0	2.435-3.516	2.6	2.126-3.147	4.6*	4.139-5.160	4.4*	3.897-4.906
Mujeres								
Norcentral	1.0	0.403-1.501	0.3	---	1.9	1.152-2.607	1.4	0.770-2.086
Noroccidental	0.5	0.031-0.984	0.3	---	1.1	0.646-1.509	1.0	0.548-1.393
Nororiental	1.0	0.119-1.835	0.4	---	1.7	1.007-2.400	1.3	0.713-1.919
Occidental	0.9	0.238-1.541	0.3	---	2.2	0.962-3.525	1.9	0.619-3.098
Centro	0.9	0.170-1.650	0.7	0.031-1.448	1.2	0.726-1.577	1.0	0.619-1.303
Ciudad de México	1.0	0.030-1.902	0.9	---	1.1	0.289-1.856	0.9	0.194-1.676
Centro Sur	0.3	---	0.1	---	1.3	0.761-1.749	0.9	0.497-1.292
Sur	0.5	0.064-0.976	0.3	---	0.9	0.530-1.289	0.6	0.290-0.974
Nacional	0.7	0.470-1.023	0.4	0.200-0.692	1.3*	1.113-1.585	1.1*	0.867-1.286

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Así también, el consumo alguna vez de marihuana mostró incrementos significativos con respecto a 2011 en las regiones Occidental (de 6.8% a 11.3%), Noroccidental (de 7.4% a 10.2%), Norcentral (de 5.9% a 9.4%), Sur (de 4.6% a 8.3%) y Centro (5.2% a 8.1%) en la población total.

En hombres, sólo se presentó un incremento significativo en la región Sur, al pasar de 8.4% a 14%, mientras que en las mujeres se registraron incrementos de 1.9% a 6.3% en la región Occidental, de 1.1% a 4.2% en la región Norcentral, de 1% a 3.6% en la Noroccidental, de 1% a 2.8% en la región Sur y de 1% a 2.6% en la Centro Sur.

El consumo de cocaína no mostró diferencias significativas con respecto a 2011; sin embargo, es importante resaltar que la región Norcentral (4.8%) tuvo una prevalencia mayor a la nacional (3.5%) en la población total (Cuadro 6A).

**Cuadro 6A: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína alguna vez.
Población de 12 a 65 años**

	2011				2016			
	Marihuana		Cocaína		Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total								
Norcentral	5.9	4.807-7.022	3.8	2.825-4.843	9.4*	8.209-10.499	4.8	3.895-5.740
Noroccidental	7.4	6.040-8.778	4.9	3.671-6.142	10.2*	9.206-11.204	4.5	3.754-5.197
Nororiental	7.4	5.793-9.050	4.7	3.481-5.884	8.5	7.310-9.641	3.1	2.427-3.773
Occidental	6.8	5.461-8.203	4.0	2.859-5.110	11.3*	9.627-13.005	5.9	4.408-7.414
Centro	5.2	3.766-6.655	2.4	1.398-3.318	8.1*	7.097-9.130	2.6	2.062-3.145
Ciudad de México	6.7	5.118-8.374	2.6	1.716-3.507	9.1	6.983-11.302	3.0	1.916-4.166
Centro Sur	5.7	4.120-7.210	3.5	2.334-4.568	6.9	6.014-7.849	3.2	2.653-3.779
Sur	4.6	3.244-6.032	2.2	1.287-3.207	8.3*	7.295-9.228	3.4	2.835-4.003
Nacional	6.0	5.367-6.570	3.3	2.828-3.680	8.6*	8.184-9.114	3.5	3.231-3.819
Hombres								
Norcentral	10.9	8.717-13.037	6.5	4.613-8.468	14.7	12.598-16.835	8.0	6.281-9.772
Noroccidental	13.8	11.099-16.490	9.2	6.788-11.656	16.7	14.998-18.478	7.7	6.344-8.964
Nororiental	12.9	9.463-16.258	8.3	5.954-10.615	13.4	11.330-15.385	5.2	3.946-6.363
Occidental	12.1	9.765-14.358	7.5	5.366-9.658	16.6	13.973-19.294	10.3	7.492-13.042
Centro	8.9	6.305-11.437	4.2	2.338-6.155	13.1	11.188-14.971	4.7	3.637-5.746
Ciudad de México	10.8	7.988-13.686	4.0	2.423-5.553	15.4	11.552-19.348	5.6	3.501-7.685
Centro Sur	10.8	7.860-13.816	6.6	4.435-8.812	11.7	9.861-13.487	5.7	4.613-6.760
Sur	8.4	5.742-11.111	4.3	2.395-6.214	14.0*	12.241-15.801	5.9	4.825-7.061
Nacional	10.6	9.499-11.692	5.9	5.111-6.774	14.0*	13.130-14.804	6.2	5.624-6.727
Mujeres								
Norcentral	1.1	0.533-1.765	1.2	0.361-2.109	4.2*	3.128-5.213	1.7	1.008-2.424
Noroccidental	1.0	0.327-1.590	0.5	0.100-0.995	3.6*	2.794-4.501	1.3	0.834-1.736
Nororiental	2.1	0.849-3.420	1.2	0.136-2.227	3.8	2.727-4.846	1.1	0.523-1.731
Occidental	1.9	0.641-3.146	0.7	0.167-1.139	6.3*	4.093-8.507	1.8	0.700-2.904
Centro	1.9	0.809-2.906	0.6	0.081-1.175	3.6	2.813-4.377	0.7	0.440-0.966
Ciudad de México	3.0	1.459-4.595	1.4	0.349-2.372	3.4	1.830-4.913	0.7	0.088-1.324
Centro Sur	1.0	0.383-1.560	0.6	0.103-1.043	2.6*	1.977-3.241	1.0	0.481-1.448
Sur	1.0	0.275-1.748	0.3	---	2.8*	2.154-3.482	1.0	0.665-1.402
Nacional	1.6	1.217-2.051	0.7	0.489-0.981	3.7*	3.276-4.091	1.1	0.856-1.244

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Para el consumo en el último año, se observaron incrementos significativos en la población total en las regiones Norcentral, de 1% a 2.8%, Occidental, de 1.3% a 2.7% y Sur de 0.5% a 1.5%.

En hombres, este aumento se presentó en las regiones Norcentral (de 1.7% a 4.6%) y Sur (de 0.8% a 2.5%). En las mujeres no hubo incrementos con respecto a 2011, sin embargo en la región Noroccidental el porcentaje de consumo superó el promedio nacional (3.1% y 2.1% respectivamente). En cuanto al consumo de cocaína en el último año, presenta un comportamiento estable en comparación con 2011 (Cuadro 6B).

Cuadro 6B: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína en el último año.
Población de 12 a 65 años

	2011				2016			
	Marihuana		Cocaína		Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total								
Norcentral	1.0	0.495-1.532	0.8	0.207-1.330	2.8*	2.133-3.447	1.0	0.549-1.374
Noroccidental	2.3	1.548-3.005	1.0	0.363-1.686	3.1	2.476-3.642	0.7	0.408-1.021
Nororiental	1.9	1.031-2.839	1.1	0.452-1.751	1.9	1.309-2.395	0.6	0.254-0.982
Occidental	1.3	0.784-1.812	0.5	0.154-0.810	2.7*	1.865-3.621	1.4	0.331-2.531
Centro	1.0	0.450-1.594	0.2	---	2.0	1.507-2.433	0.7	0.459-1.023
Ciudad de México	1.5	0.700-2.380	0.1	---	2.5	1.365-3.692	0.6	---
Centro Sur	0.9	0.228-1.481	0.8	0.262-1.329	1.7	1.233-2.095	0.7	0.449-1.006
Sur	0.5	0.138-0.918	0.2	---	1.5*	1.112-1.894	0.7	0.489-0.979
Nacional	1.2	0.957-1.461	0.5	0.351-0.643	2.1*	1.911-2.362	0.8	0.632-0.971
Hombres								
Norcentral	1.7	0.753-2.744	1.3	0.257-2.429	4.6*	3.381-5.734	1.3	0.688-2.005
Noroccidental	4.3	2.817-5.775	2.0	0.722-3.356	5.3	4.204-6.329	1.2	0.622-1.790
Nororiental	3.8	1.999-5.619	2.2	0.895-3.574	2.9	1.838-3.943	0.7	0.160-1.288
Occidental	2.5	1.471-3.576	0.7	0.144-1.227	3.7	2.415-5.053	2.9	0.678-5.166
Centro	1.7	0.659-2.643	0.2	---	3.2	2.298-4.113	1.3	0.745-1.883
Ciudad de México	2.4	0.911-3.841	0.2	---	4.3	2.055-6.556	1.3	---
Centro Sur	1.8	0.488-3.105	1.6	0.543-2.681	2.8	1.911-3.599	1.2	0.686-1.654
Sur	0.8	0.053-1.545	0.2	---	2.5*	1.809-3.248	1.3	0.826-1.799
Nacional	2.2	1.717-2.657	0.9	0.636-1.211	3.5*	3.032-3.871	1.4	1.055-1.729
Mujeres								
Norcentral	0.3	---	0.2	---	1.1	0.471-1.691	0.6	0.060-1.118
Noroccidental	0.2	---	---	---	0.8	0.456-1.230	0.2	0.033-0.409
Nororiental	0.1	---	---	---	0.9	0.472-1.237	0.5	0.083-0.950
Occidental	0.1	---	0.3	---	1.8	0.570-3.047	***	---
Centro	0.4	---	0.1	---	0.8	0.512-1.182	0.2	0.058-0.382
Ciudad de México	0.8	---	0.1	---	0.9	0.163-1.641	---	---
Centro Sur	---	---	0.1	---	0.7	0.345-0.993	0.3	0.014-0.635
Sur	0.3	---	0.1	---	0.5	0.201-0.866	0.2	0.073-0.304
Nacional	0.3	0.084-0.502	0.1	0.027-0.169	0.9*	0.710-1.107	0.2	0.157-0.342

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

***Porcentaje menor a 0.1

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

b) Población de 12 a 17 años

En la población adolescente, el consumo de cualquier droga alguna vez se ha duplicado con respecto a 2011 en las regiones Norcentral (de 3% a 6.2%) y Centro Sur (de 2.4% a 5.3%), mientras que en la región Centro aumentó casi 3 veces (de 2.8% a 7.8%). En tanto, el consumo en el último año aumentó de manera significativa en las regiones Centro y Centro Sur, al pasar de 1.1% a 3.1% y de 0.5% a 3.1% respectivamente. Por su parte, el consumo alguna vez de drogas ilegales incrementó más del doble en las regiones Norcentral y Centro Sur (2.6% a 6.2% y de 2.2% a 5.2% respectivamente) y tres veces más en la región Centro (de 2.2% a 7.6%), mientras que el consumo en el último año aumenta en la región Norcentral, al pasar de 1.2% a 3.7% (Cuadro 7).

Cuadro 7: Tendencias regionales del consumo de drogas.
Población de 12 a 17 años

Alguna Vez Región	2011				2016			
	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%
Norcentral	3.0	1.477-4.448	2.6	1.172-3.980	6.2*	4.566-7.873	6.2*	4.531-7.818
Noroccidental	4.2	1.804-6.539	4.2	1.804-6.539	5.4	3.958-6.890	5.1	3.717-6.552
Nororiental	6.3	3.151-9.514	5.4	2.355-8.451	5.5	4.000-6.921	5.5	4.000-6.921
Occidental	3.6	1.892-5.388	3.3	1.640-4.987	7.5	5.065-10.017	7.3	4.918-9.740
Centro	2.8	1.132-4.521	2.2	0.726-3.712	7.8*	5.035-10.576	7.6*	4.783-10.327
Ciudad de México	4.9	0.443-9.394	4.9	0.443-9.394	7.2	3.963-10.473	7.2	3.963-10.473
Centro Sur	2.4	1.053-3.803	2.2	0.845-3.515	5.3*	3.857-6.723	5.2*	3.766-6.621
Sur	2.2	0.481-3.863	2.1	0.372-3.739	3.8	2.923-4.743	3.7	2.800-4.596
Nacional	3.3	2.546-4.110	2.9	2.208-3.672	6.4*	5.365-7.352	6.2*	5.211-7.191
Último Año Región	2011				2016			
	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%	Cualquier droga %	IC 95%	Drogas ilegales %	IC 95%
Norcentral	1.5	0.353-2.599	1.2	0.145-2.267	3.7	2.403-4.997	3.7*	2.403-4.997
Noroccidental	2.3	0.536-4.082	2.3	0.536-4.082	3.2	2.160-4.236	3.1	2.081-4.152
Nororiental	4.5	1.623-7.462	4.0	1.202-6.839	3.2	2.053-4.319	3.2	2.053-4.319
Occidental	1.6	0.357-2.846	1.6	0.357-2.846	3.0	2.009-3.993	2.8	1.885-3.805
Centro	1.1	0.071-2.109	1.1	0.071-2.109	3.1*	2.160-4.046	2.9	2.011-3.862
Ciudad de México	2.6	---	2.6	---	3.5	1.278-5.626	3.5	1.278-5.626
Centro Sur	0.5	0.006-0.983	0.4	---	3.1*	1.938-4.264	2.8	1.688-3.853
Sur	1.9	0.231-3.547	1.8	0.123-3.421	2.0	1.368-2.595	1.7	1.169-2.245
Nacional	1.6	1.093-2.188	1.5	1.001-2.081	3.1*	2.619-3.483	2.9*	2.469-3.308

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Cuadro 8: Tendencias regionales del consumo de marihuana.
Población de 12 a 17 años

Alguna Vez Región	2011		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.9	0.745-3.141	5.6*	4.020-7.080
Noroccidental	4.2	1.804-6.539	5.0	3.549-6.369
Nororiental	5.1	2.097-8.126	5.0	3.538-6.406
Occidental	2.3	0.888-3.627	7.1*	4.663-9.471
Centro	2.0	0.521-3.448	6.0*	4.113-7.969
Ciudad de México	2.9	---	6.0	3.200-8.857
Centro Sur	1.3	0.284-2.286	4.4*	3.001-5.721
Sur	2.1	0.372-3.739	3.1	2.215-3.888
Nacional	2.4	1.719-3.082	5.3*	4.562-6.068
Último Año Región	2011		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.8	0.023-1.550	3.2*	2.014-4.368
Noroccidental	2.3	0.536-4.082	3.0	1.988-4.037
Nororiental	3.2	0.784-5.714	2.7	1.605-3.745
Occidental	1.4	0.203-2.559	2.6	1.694-3.569
Centro	1.0	0.013-2.036	2.6	1.733-3.552
Ciudad de México	2.1	---	3.2	1.082-5.361
Centro Sur	0.2	---	2.6	1.528-3.630
Sur	1.6	0.126-3.130	1.4	0.881-1.873
Nacional	1.3	0.816-1.835	2.6*	2.194-3.011

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.



En cuanto al consumo de marihuana alguna vez, son las regiones Occidental (2.3% a 7.1%), Norcentral (1.9% a 5.6%) y Centro Sur (de 1.3% a 4.4%) en donde se encontraron aumentos significativos en relación a 2011, mientras que el consumo de esta sustancia en el último año sólo incrementó en la región Norcentral (de 0.8% a 3.2%) (Cuadro 8).

c) Población de 18 a 65 años

En la población de 18 a 34 años, el consumo de cualquier droga y de drogas ilegales alguna vez ha incrementado significativamente en las regiones Norcentral, Occidental y Sur (cualquier droga: de 12.2% a 17.1%, de 14.2% a 21.8% y de 6% a 13.5% respectivamente; drogas ilegales: de 10.6% a 16.3%, de 13.2% a 21.4% y de 5.8% a 13.2% respectivamente). En la población de 35 a 65 años de edad, el consumo de cualquier droga alguna vez no tuvo variaciones significativas con respecto a 2011; sin embargo, la región Noroccidental (9.9%) muestra una prevalencia de consumo mayor al promedio nacional (7.5%); esta misma situación se observa al considerar el consumo alguna vez de drogas ilegales, que a pesar de mantenerse estable en ambas mediciones, nuevamente en la región Noroccidental el porcentaje de consumo fue mayor al nacional (9.6% y 7% respectivamente) (Cuadro 9).

La prevalencia de consumo en el último año de cualquier droga en la población de 18 a 34 años de edad se triplicó en la región Occidental (pasó de 2.6% a 8.4%), y el consumo de drogas ilegales aumentó 4 veces (de 2% a 8%) en la misma región. En la población de 35 a 65 años, tanto el consumo de cualquier droga como de drogas ilegales en el último año, se mantuvieron estables en ambas mediciones; sin embargo, es importante señalar que en la región Noroccidental el consumo de drogas ilegales fue del doble del promedio nacional (1.6% y 0.8% respectivamente) (Cuadro 9).

En la población de 18 a 34 años, el consumo de marihuana alguna vez aumentó en las regiones Norcentral (de 8.2% a 14.2%), mientras que en la región Sur se duplicó (de 5.3% a 11.5%).

El consumo de cocaína alguna vez no tuvo cambios significativos con respecto a 2011, pero en la región Occidental supera al promedio nacional (9.6% y 5.2% respectivamente). En tanto, en la población de 35 a 65 años de edad, no se observaron cambios significativos en el consumo de ninguna de las dos sustancias; sin embargo, con relación a la prevalencia nacional (6.1% y 3% para marihuana y cocaína), la región Noroccidental (8.3% y 4.4% respectivamente) tuvo una prevalencia significativamente mayor (Cuadro 10A).

**Cuadro 9: Tendencias regionales del consumo de drogas alguna vez.
Población de 18 a 65 años**

Alguna Vez Región	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
18 a 34 años								
Norcentral	12.2	9.716-14.591	10.6	8.159-12.971	17.1*	14.660-19.461	16.3*	13.910-18.713
Noroccidental	11.5	8.965-14.012	11.1	8.520-13.637	15.6	13.519-17.587	15.3	13.284-17.334
Nororiental	13.1	9.660-16.628	12.7	9.256-16.071	15.1	12.663-17.480	14.4	12.013-16.866
Occidental	14.2	10.924-17.571	13.2	10.009-16.474	21.8*	17.654-25.939	21.4*	17.216-25.507
Centro	11.3	8.193-14.479	10.7	7.628-13.863	13.1	11.183-15.026	12.7	10.736-14.580
Ciudad de México	13.4	9.436-17.334	12.9	8.982-16.773	16.7	11.841-21.498	16.5	11.648-21.315
Centro Sur	10.1	7.004-13.133	9.2	6.219-12.262	13.0	10.916-15.005	12.3	10.305-14.217
Sur	6.0	3.877-8.176	5.8	3.668-7.975	13.5*	11.491-15.411	13.2*	11.227-15.133
Nacional	11.3	10.018-12.582	10.6	9.364-11.898	15.0*	14.007-15.964	14.5*	13.541-15.493
35-65 años								
Norcentral	7.2	5.173-9.241	6.3	4.354-8.259	8.5	7.158-9.914	7.8	6.559-9.140
Noroccidental	9.1	7.190-10.948	8.8	6.933-10.719	9.9	8.501-11.302	9.6	8.239-10.913
Nororiental	7.5	4.993-9.938	6.8	4.406-9.160	7.6	6.102-8.999	7.0	5.676-8.312
Occidental	9.2	6.744-11.582	7.8	5.476-10.081	10.0	7.723-12.299	8.9	6.683-11.140
Centro	3.8	2.312-5.222	3.5	2.126-4.966	6.5	5.036-8.044	6.3	4.822-7.829
Ciudad de México	6.3	4.376-8.260	4.9	3.208-6.587	6.8	4.714-8.860	6.2	4.191-8.256
Centro Sur	7.4	5.214-9.532	6.7	4.542-8.835	6.0	4.939-7.086	5.5	4.483-6.598
Sur	6.0	3.512-8.479	5.4	2.970-7.874	8.2	6.835-9.634	7.8	6.437-9.178
Nacional	6.4	5.614-7.179	5.7	4.988-6.496	7.5	6.891-8.132	7.0	6.426-7.648
Último Año								
Región	2011				2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
18 a 34 años								
Norcentral	3.1	1.430-4.796	2.4	0.779-4.048	6.2	4.611-7.792	5.6	4.048-7.162
Noroccidental	4.0	2.314-5.697	3.7	2.064-5.391	5.9	4.509-7.269	5.7	4.297-7.018
Nororiental	4.6	2.105-7.021	3.2	0.959-5.495	4.8	3.229-6.369	4.2	2.684-5.639
Occidental	2.6	1.354-3.859	2.0	0.861-3.085	8.4*	5.218-11.547	8.0*	4.815-11.154
Centro	2.5	1.026-4.056	2.0	0.571-3.330	4.2	3.080-5.298	3.9	2.853-5.007
Ciudad de México	3.8	1.784-5.746	3.4	1.516-5.378	5.0	2.092-7.916	5.0	2.092-7.916
Centro Sur	2.7	0.955-4.350	2.4	0.735-4.060	4.1	2.968-5.277	3.4	2.365-4.515
Sur	0.6	---	0.5	---	3.6	2.627-4.474	3.4	2.489-4.321
Nacional	2.8	2.164-3.479	2.3	1.681-2.907	5.0*	4.347-5.582	4.6*	3.992-5.205
35-65 años								
Norcentral	1.3	0.652-1.989	1.1	0.449-1.715	1.5	0.999-2.081	1.1	0.634-1.554
Noroccidental	2.1	1.085-3.196	2.1	1.085-3.196	1.7	1.178-2.203	1.6	1.103-2.103
Nororiental	1.3	0.345-2.275	1.1	0.165-2.032	0.6	0.319-0.917	0.5	0.208-0.710
Occidental	1.6	0.768-2.375	0.9	0.359-1.505	1.3	0.656-1.958	1.0	0.525-1.467
Centro	0.7	0.063-1.240	0.5	---	0.8	0.384-1.239	0.8	0.353-1.205
Ciudad de México	0.7	0.033-1.300	0.2	---	1.1	0.402-1.856	0.8	0.223-1.367
Centro Sur	0.8	---	0.8	---	1.0	0.592-1.482	0.7	0.373-1.047
Sur	0.4	---	0.1	---	0.8	0.519-1.156	0.6	0.308-0.871
Nacional	1.0	0.693-1.267	0.8	0.507-1.025	1.0	0.847-1.225	0.8	0.666-1.004

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

**Cuadro 10A: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína alguna vez
Población de 18 a 65 años**

Región	2011				2016			
	Mariguana		Cocaína		Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
18-34 años								
Norcentral	8.2	6.083-10.310	5.7	3.621-7.736	14.2*	11.956-16.359	7.1	5.290-8.859
Noroccidental	9.1	6.792-11.476	5.7	3.707-7.682	14.4*	12.412-16.409	6.1	4.661-7.480
Nororiental	10.6	7.166-13.945	6.9	4.454-9.352	12.6	10.283-14.847	4.6	3.205-6.094
Occidental	9.6	6.803-12.358	6.5	4.139-8.934	17.0*	13.499-20.508	9.6	6.247-12.893
Centro	8.9	5.974-11.878	4.7	2.434-6.930	11.4	9.652-13.201	4.0	2.761-5.220
Ciudad de México	11.2	7.636-14.848	5.0	2.822-7.194	15.7	10.984-20.493	3.4	1.395-5.392
Centro Sur	7.6	4.861-10.368	5.2	2.992-7.325	10.7	8.774-12.602	4.5	3.409-5.667
Sur	5.3	3.293-7.399	3.1	1.635-4.541	11.5*	9.724-13.229	4.9	3.770-5.963
Nacional	8.7	7.541-9.906	5.2	4.278-6.085	12.8*	11.891-13.684	5.2	4.542-5.801
35-65 años								
Norcentral	5.4	3.555-7.271	3.4	1.959-4.931	6.5	5.264-7.648	4.1	3.061-5.138
Noroccidental	7.0	5.367-8.689	6.0	4.151-7.836	8.3	7.029-9.512	4.4	3.485-5.276
Nororiental	5.4	3.394-7.445	3.3	1.489-5.187	6.1	4.849-7.336	2.6	1.910-3.224
Occidental	6.0	4.385-7.699	2.7	1.556-3.780	7.6	5.451-9.677	4.6	3.001-6.250
Centro	3.0	1.660-4.388	1.0	0.286-1.762	5.8	4.307-7.313	1.9	1.346-2.448
Ciudad de México	4.3	2.645-5.942	1.4	0.553-2.226	4.8	3.006-6.567	3.2	1.773-4.587
Centro Sur	5.8	3.764-7.809	3.1	1.604-4.544	4.7	3.699-5.688	2.8	1.999-3.595
Sur	5.1	2.821-7.319	2.0	0.411-3.602	7.2	5.879-8.580	2.9	2.000-3.740
Nacional	4.8	4.141-5.509	2.5	1.983-2.945	6.1*	5.534-6.722	3.0	2.622-3.294

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

El consumo de marihuana en el último año en la población de 18 a 34 años, aumentó significativamente en la región Occidental (de 1.6% a 5%), así como en la región Norcentral de 1.4% a 4.9%, mientras que el consumo de cocaína no tuvo cambios significativos en ninguna de las regiones; aunque el porcentaje nacional pasó de 0.8% a 1.5%. En la población de 35 a 65 años no hubo incremento con respecto a 2011 en ninguna de las dos sustancias; sin embargo el consumo de marihuana en la región Noroccidental (1.4%) fue significativamente mayor que la prevalencia a nivel nacional (0.7%) (Cuadro 10B).

**Cuadro10B: Tendencias regionales del consumo de marihuana y cocaína en el último año.
Población de 18 a 65 años**

Región	2011				2016			
	Mariguana		Cocaína		Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
18-34 años								
Norcentral	1.4	0.270-2.531	1.2	---	4.9*	3.370-6.407	1.6	0.671-2.610
Noroccidental	2.9	1.483-4.328	1.4	0.133-2.663	4.8	3.608-6.046	1.2	0.537-1.947
Nororiental	2.8	0.908-4.662	1.6	0.274-2.924	3.2	1.985-4.425	1.2	0.331-2.063
Occidental	1.6	0.600-2.694	0.8	0.071-1.460	5.0*	2.939-7.043	3.1	0.463-5.805
Centro	1.8	0.434-3.150	0.3	---	3.1	2.095-4.040	1.2	0.608-1.791
Ciudad de México	3.1	1.215-5.052	0.1	---	4.6	1.747-7.481	1.1	---
Centro Sur	1.5	0.089-2.878	1.6	0.325-2.873	2.5	1.497-3.416	1.3	0.651-1.889
Sur	0.5	---	--	---	2.6	1.761-3.374	1.4	0.810-1.898
Nacional	1.9	1.295-2.423	0.8	0.476-1.106	3.5*	3.027-4.033	1.5	1.065-1.862
35-65 años								
Norcentral	0.8	0.214-1.301	0.5	---	0.7	0.356-1.088	0.4	0.121-0.678
Noroccidental	1.7	0.692-2.690	1.1	0.223-1.900	1.4	0.965-1.931	0.3	0.083-0.542
Nororiental	0.7	---	0.7	---	0.4	0.129-0.591	0.2	0.017-0.322
Occidental	0.9	0.359-1.505	0.1	---	0.6	0.234-1.036	0.3	0.060-0.548
Centro	0.3	---	--	---	0.7	0.250-1.080	0.3	0.046-0.612
Ciudad de México	0.2	---	0.1	---	0.7	0.162-1.271	0.3	---
Centro Sur	0.6	---	0.3	---	0.6	0.260-0.875	0.2	---
Sur	0.1	---	--	---	0.4	0.198-0.682	0.2	0.042-0.375
Nacional	0.6	0.352-0.779	0.3	0.132-0.398	0.7	0.510-0.831	0.3	0.168-0.378

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína también incluye crack.

*Incremento significativo.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Tendencias y variaciones estatales del consumo de drogas (Encuestas 2008-2016)

Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida incrementó de 5.7% en 2008 a 10.3% en 2016. Por estado, los que presentaron mayor crecimiento proporcional a 2008 son: Jalisco de 5.3% a 16%, Colima de 2.8% a 12.4% y Coahuila de 3.6% a 11.4% (Cuadro 11A). A nivel nacional, Jalisco (16%), Quintana Roo (15.5%), Baja California (13.8%) y Nayarit (13.2%) tienen porcentajes por encima del promedio nacional.

El cuadro 11B muestra que el consumo en el último año de cualquier droga aumentó de 1.6% a 2.9%; el crecimiento proporcional más alto con respecto a 2008 se presentó en los estados de Jalisco (de 1% a 5.2%), Colima (de 0.3% a 3.1%) y San Luis Potosí (de 0.4% a 2.2%).

En 2016, todos los estados mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional (2.9%) excepto Oaxaca (1.5%) y Chiapas (1.1%), cuyos porcentajes de consumo son menores al nacional.



**Cuadro 11A: Incidencia acumulada del uso de cualquier droga.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.3	3.942-6.715	11.8*	9.723-13.932
Baja California	9.6	7.008-12.183	13.8	11.803-15.754
Baja California Sur	8.0	6.217-9.689	11.1	9.099-13.201
Campeche	5.3	3.576-7.059	11.8*	9.328-14.337
Chiapas	2.2	1.040-3.312	5.8*	4.170-7.455
Chihuahua	8.2	6.137-10.167	12.2	10.149-14.174
Ciudad de México	8.5	7.008-9.938	10.6	8.355-12.906
Coahuila	3.6	2.380-4.848	11.4*	9.215-13.499
Colima	2.8	1.764-3.758	12.4*	10.185-14.700
Durango	8.2	6.366-10.093	10.5	8.583-12.396
Estado de México	4.8	3.491-6.078	10.0*	7.936-12.150
Guanajuato	6.9	5.562-8.276	10.0	8.091-11.836
Guerrero	5.2	3.487-6.829	7.8	5.930-9.586
Hidalgo	9.2	6.855-11.544	7.9	6.155-9.710
Jalisco	5.3	3.905-6.746	16.0*	12.831-19.255
Michoacán	5.6	3.794-7.328	9.2*	7.500-10.892
Morelos	4.6	3.298-5.840	7.5	5.556-9.518
Nayarit	7.6	5.324-9.848	13.2*	10.916-15.512
Nuevo León	4.4	3.032-5.782	11.4*	9.002-13.719
Oaxaca	3.5	2.317-4.704	6.9*	5.319-8.572
Puebla	3.6	2.497-4.712	7.9*	5.608-10.126
Querétaro	6.8	5.133-8.400	12.3*	10.105-14.490
Quintana Roo	11.2	9.355-13.046	15.5	12.315-18.719
San Luis Potosí	3.4	2.302-4.430	7.7*	6.112-9.340
Sinaloa	6.6	4.253-8.921	9.4	7.726-11.170
Sonora	5.5	4.015-6.926	10.9*	8.849-12.866
Tabasco	6.4	4.407-8.474	10.8*	8.957-12.544
Tamaulipas	11.1	8.360-13.763	10.3	8.662-11.942
Tlaxcala	3.0	2.002-3.988	7.1*	5.385-8.893
Veracruz	3.3	2.053-4.544	9.2*	7.329-11.142
Yucatán	4.7	3.146-6.324	11.4*	8.814-13.897
Zacatecas	6.4	4.915-7.871	9.9	7.749-11.971
Nacional	5.7	5.360-6.082	10.3*	9.788-10.813

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

**Cuadro 11B: Consumo último año de cualquier droga.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	0.482-2.252	3.7*	2.596-4.876
Baja California	4.3	2.806-5.842	4.5	3.119-5.826
Baja California Sur	2.5	1.187-3.737	3.3	2.161-4.461
Campeche	1.2	---	2.1	1.355-2.935
Chiapas	0.6	0.034-1.113	1.1	0.396-1.863
Chihuahua	3.7	2.542-4.839	3.8	2.686-4.925
Ciudad de México	2.2	1.357-3.011	2.9	1.710-4.107
Coahuila	1.3	0.542-1.968	4.0*	2.723-5.340
Colima	0.3	0.075-0.611	3.1*	1.933-4.170
Durango	2.2	1.166-3.220	3.2	2.104-4.206
Estado de México	0.9	0.523-1.371	2.3*	1.397-3.232
Guanajuato	1.9	1.140-2.711	2.7	1.741-3.661
Guerrero	1.9	0.815-3.080	2.6	1.656-3.477
Hidalgo	4.6	3.073-6.216	2.3	1.453-3.199
Jalisco	1.0	0.381-1.691	5.2*	3.034-7.300
Michoacán	2.4	1.110-3.619	3.8	2.663-4.928
Morelos	0.9	0.296-1.550	2.1	1.130-3.040
Nayarit	2.1	1.026-3.271	3.4	1.773-5.107
Nuevo León	1.8	0.974-2.689	3.1	1.903-4.339
Oaxaca	0.7	0.195-1.228	1.5	0.623-2.380
Puebla	0.7	0.082-1.329	3.2*	1.727-4.619
Querétaro	1.1	0.395-1.803	3.5*	2.319-4.610
Quintana Roo	1.8	1.226-2.394	4.2*	2.921-5.498
San Luis Potosí	0.4	0.074-0.718	2.2*	1.313-3.131
Sinaloa	1.9	0.993-2.840	3.2	2.180-4.277
Sonora	1.8	0.865-2.716	3.1	2.103-4.102
Tabasco	1.5	0.818-2.153	3.1	2.105-4.143
Tamaulipas	3.3	2.105-4.576	2.4	1.441-3.263
Tlaxcala	0.6	---	2.1	1.188-2.942
Veracruz	0.8	0.217-1.366	2.5*	1.505-3.427
Yucatán	1.5	0.553-2.455	1.9	1.028-2.820
Zacatecas	0.9	0.306-1.511	3.0*	1.884-4.062
Nacional	1.6	1.450-1.802	2.9*	2.670-3.216

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo

En 2008, el 5.2% de la población general reportó haber consumido drogas ilegales alguna vez en la vida; este porcentaje aumentó a 9.9% en 2016; en los estados de Colima, Coahuila y Chiapas (de 2.4% a 12.0%, de 3.1% a 10.8% y de 1.7% a 5.8% respectivamente) es donde se observó un mayor aumento proporcional. Asimismo, los estados de Jalisco (15.3%), Quintana Roo (14.9%) y Baja California (13.5%) tienen prevalencias significativamente mayores al promedio nacional (Cuadro 12A).

**Cuadro 12A: Incidencia acumulada del uso de drogas ilegales.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.8	3.420-6.184	11.1*	9.072-13.124
Baja California	9.3	6.791-11.834	13.5	11.538-15.514
Baja California Sur	7.2	5.388-8.939	10.9	8.874-13.000
Campeche	5.0	3.216-6.706	11.5*	8.981-13.972
Chiapas	1.7	0.649-2.720	5.8*	4.134-7.404
Chihuahua	7.5	5.579-9.362	11.7*	9.738-13.725
Ciudad de México	7.8	6.336-9.267	10.3	8.021-12.543
Coahuila	3.1	1.919-4.359	10.8*	8.615-12.924
Colima	2.4	1.436-3.294	12.0*	9.761-14.142
Durango	7.8	5.943-9.675	9.5	7.706-11.305
Estado de México	4.6	3.350-5.875	9.7*	7.597-11.859
Guanajuato	5.7	4.432-7.058	9.6*	7.764-11.476
Guerrero	4.7	3.082-6.279	7.5	5.656-9.293
Hidalgo	8.3	6.084-10.434	7.6	5.848-9.341
Jalisco	5.0	3.580-6.346	15.3*	12.124-18.537
Michoacán	4.3	2.647-5.987	9.0*	7.256-10.644
Morelos	4.1	2.891-5.268	7.5*	5.493-9.449
Nayarit	6.6	4.393-8.745	12.3*	10.053-14.453
Nuevo León	4.1	2.767-5.374	10.6*	8.313-12.894
Oaxaca	3.4	2.198-4.579	6.6*	4.964-8.156
Puebla	3.4	2.336-4.409	7.5*	5.243-9.720
Querétaro	6.7	5.100-8.368	12.1*	9.921-14.262
Quintana Roo	10.1	8.318-11.811	14.9	11.800-17.917
San Luis Potosí	3.0	1.970-4.073	7.5*	5.927-9.146
Sinaloa	6.3	4.057-8.627	9.4	7.657-11.094
Sonora	5.1	3.662-6.482	10.3*	8.349-12.226
Tabasco	5.9	3.926-7.922	10.4*	8.624-12.192
Tamaulipas	10.3	7.733-12.916	10.0	8.319-11.604
Tlaxcala	2.2	1.380-2.969	6.8*	5.071-8.521
Veracruz	2.7	1.560-3.885	8.5*	6.666-10.295
Yucatán	3.9	2.598-5.262	10.8*	8.281-13.296
Zacatecas	6.0	4.615-7.467	9.5	7.433-11.614
Nacional	5.2	4.871-5.565	9.9*	9.372-10.391

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

En cuanto al consumo en el último año, este aumentó de 1.4% a 2.7%; los principales estados que reportan mayor crecimiento proporcional con respecto a 2008 son: Jalisco (de 0.8% a 4.9%), Colima (de 0.2% a 2.9%) y Tlaxcala (de 0.2% a 2%) (Cuadro 12B). El porcentaje de consumo en Baja California (4.4%) se encuentra por encima del promedio nacional, mientras que Oaxaca (1.4%) y Chiapas (1.1%) están por debajo del nacional.

**Cuadro 12B: Consumo último año de drogas ilegales.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.0	0.246-1.779	3.5*	2.406-4.587
Baja California	4.1	2.559-5.593	4.4	3.070-5.774
Baja California Sur	2.5	1.249-3.675	3.3	2.141-4.444
Campeche	1.1	---	1.7	1.036-2.425
Chiapas	0.2	---	1.1	0.340-1.793
Chihuahua	3.3	2.303-4.388	3.4	2.283-4.480
Ciudad de México	1.8	1.063-2.593	2.7	1.561-3.929
Coahuila	1.1	0.445-1.745	3.6*	2.325-4.881
Colima	0.2	0.001-0.321	2.9*	1.821-4.011
Durango	2.0	1.010-3.037	2.7	1.722-3.698
Estado de México	0.9	0.448-1.286	2.1	1.224-2.999
Guanajuato	1.5	0.749-2.188	2.6	1.683-3.561
Guerrero	1.8	0.784-2.849	2.3	1.453-3.176
Hidalgo	4.5	3.003-5.933	2.3	1.396-3.133
Jalisco	0.8	0.161-1.443	4.9*	2.752-6.973
Michoacán	1.8	0.575-2.952	3.4	2.334-4.468
Morelos	0.7	0.101-1.305	2.1	1.130-3.040
Nayarit	1.6	0.573-2.616	2.8	1.382-4.292
Nuevo León	1.8	0.942-2.597	2.8	1.575-3.967
Oaxaca	0.6	0.127-1.052	1.4	0.524-2.224
Puebla	0.7	0.124-1.287	3.0*	1.581-4.433
Querétaro	1.1	0.514-1.684	3.4*	2.203-4.502
Quintana Roo	1.4	0.877-1.836	3.8*	2.520-5.039
San Luis Potosí	0.4	0.071-0.721	2.0*	1.154-2.822
Sinaloa	1.7	0.794-2.536	2.9	1.936-3.944
Sonora	1.5	0.642-2.308	3.0	1.977-3.949
Tabasco	1.5	0.819-2.151	2.9	1.865-3.876
Tamaulipas	3.0	1.814-4.235	2.0	1.249-2.755
Tlaxcala	0.2	0.012-0.452	2.0*	1.088-2.833
Veracruz	0.5	0.079-1.008	1.7	0.927-2.522
Yucatán	1.0	0.328-1.578	1.7	0.825-2.566
Zacatecas	0.9	0.373-1.444	2.6*	1.635-3.634
Nacional	1.4	1.237-1.563	2.7*	2.417-2.947

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo.

En lo que respecta al consumo de marihuana alguna vez en la vida, se observa que se duplicó a nivel nacional, al pasar de 4.2% en 2008 a 8.6% en 2016. En 25 estados se incrementó de manera significativa; sobresalen Colima (de 1.7% a 10.8%), Tlaxcala (de 1.6% a 6.1%) y Chiapas (de 0.8% a 5%), con el mayor crecimiento proporcional (Cuadro 13A). En tanto que en este estudio, el consumo en Quintana Roo, Baja California y Jalisco (con 13.8%, 12.8% y 12.2% respectivamente) supera el promedio nacional.

**Cuadro 13A: Incidencia acumulada de marihuana.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.3	2.193-4.466	9.9*	8.020-11.842
Baja California	7.5	5.152-9.904	12.8*	10.904-14.722
Baja California Sur	6.0	4.419-7.647	9.8*	7.736-11.800
Campeche	4.6	2.886-6.371	9.9*	7.442-12.264
Chiapas	0.8	0.291-1.324	5.0*	3.577-6.472
Chihuahua	6.2	4.596-7.726	10.2*	8.316-12.174
Ciudad de México	6.6	5.271-7.995	9.1	6.983-11.302
Coahuila	2.5	1.423-3.593	9.2*	7.240-11.194
Colima	1.7	0.969-2.492	10.8*	8.678-12.855
Durango	5.8	4.361-7.230	7.8	6.241-9.277
Estado de México	3.9	2.756-5.091	9.0*	6.991-10.919
Guanajuato	3.1	2.115-4.060	8.3*	6.576-10.020
Guerrero	3.4	2.134-4.678	6.0	4.392-7.566
Hidalgo	6.7	4.726-8.766	6.9	5.242-8.625
Jalisco	4.1	2.840-5.267	12.2*	9.614-14.872
Michoacán	3.2	1.692-4.669	8.0*	6.395-9.593
Morelos	3.5	2.394-4.659	6.9*	4.889-8.853
Nayarit	4.8	2.846-6.739	10.9*	8.755-13.082
Nuevo León	3.2	2.122-4.363	9.5*	7.371-11.716
Oaxaca	2.7	1.674-3.764	5.2	3.701-6.623
Puebla	2.8	1.877-3.813	6.3*	4.319-8.209
Querétaro	6.2	4.601-7.847	10.3*	8.328-12.203
Quintana Roo	8.6	7.021-10.248	13.8*	10.772-16.745
San Luis Potosí	2.7	1.744-3.556	6.1*	4.652-7.472
Sinaloa	3.8	2.312-5.324	8.1*	6.430-9.741
Sonora	3.6	2.374-4.918	9.4*	7.636-11.231
Tabasco	5.5	3.696-7.393	8.8	7.054-10.457
Tamaulipas	8.3	6.040-10.566	8.7	7.168-10.208
Tlaxcala	1.6	0.896-2.252	6.1*	4.382-7.755
Veracruz	2.6	1.478-3.680	7.5*	5.758-9.324
Yucatán	3.8	2.484-5.070	10.0*	7.476-12.461
Zacatecas	4.9	3.554-6.297	8.3*	6.298-10.314
Nacional	4.2	3.881-4.496	8.6*	8.184-9.114

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Incremento significativo.

Mientras que el consumo de marihuana en el último año también aumentó significativamente comparado con 2008 (de 1% a 2.1%); los estados de Tlaxcala, Colima y Chiapas fueron los que registraron un mayor crecimiento proporcional al pasar de 0.1% a 1.7%, de 0.2% a 2.3% y de 0.1% a 0.8% respectivamente (Cuadro 13B). El estado de Baja California (3.8%) se ubica por arriba del promedio nacional en 2016.



**Cuadro 13B: Consumo último año de marihuana.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.8	0.140-1.514	3.0*	2.042-4.047
Baja California	3.1	1.828-4.467	3.8	2.608-5.035
Baja California Sur	1.9	0.768-2.976	2.9	1.757-4.012
Campeche	0.7	---	1.2	0.683-1.812
Chiapas	0.1	---	0.8	0.156-1.529
Chihuahua	2.7	1.707-3.718	2.8	1.808-3.876
Ciudad de México	1.7	0.965-2.455	2.5	1.365-3.692
Coahuila	0.7	0.131-1.211	3.2*	1.982-4.488
Colima	0.2	0.001-0.321	2.3*	1.279-3.327
Durango	1.2	0.379-2.052	1.9	1.121-2.700
Estado de México	0.6	0.269-0.946	2.1*	1.202-2.978
Guanajuato	0.5	0.149-0.891	1.9*	1.104-2.789
Guerrero	1.0	0.257-1.814	1.6	0.879-2.296
Hidalgo	3.0	1.896-4.187	1.8	1.000-2.605
Jalisco	0.6	0.062-1.228	2.9*	1.569-4.299
Michoacán	1.0	0.244-1.846	3.0*	1.922-3.987
Morelos	0.4	---	1.9	0.992-2.880
Nayarit	1.4	0.532-2.236	2.3	0.907-3.757
Nuevo León	1.6	0.847-2.325	2.2	1.150-3.179
Oaxaca	0.3	---	1.0	0.349-1.722
Puebla	0.6	0.055-1.207	1.5	0.627-2.441
Querétaro	1.0	0.391-1.542	2.8*	1.688-3.832
Quintana Roo	1.1	0.636-1.491	2.9*	1.749-4.012
San Luis Potosí	0.3	---	1.5	0.801-2.238
Sinaloa	1.0	0.409-1.532	2.5*	1.556-3.414
Sonora	1.2	0.430-1.981	2.8	1.812-3.783
Tabasco	1.2	0.578-1.742	1.9	1.127-2.686
Tamaulipas	2.0	0.898-3.019	1.6	0.940-2.319
Tlaxcala	0.1	---	1.7	0.924-2.516
Veracruz	0.4	0.017-0.876	1.3	0.533-2.011
Yucatán	0.8	0.215-1.420	1.6	0.717-2.421
Zacatecas	0.6	0.116-1.092	2.0*	1.113-2.946
Nacional	1.0	0.888-1.166	2.1*	1.911-2.362

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo.

El consumo de cocaína alguna vez en la vida mostró un aumento significativo de 2.4% en 2008 a 3.5% en 2016% a nivel nacional; en Jalisco, Yucatán y Veracruz, se encontró el mayor crecimiento de este consumo, al pasar de 1.9% a 6.9%, de 0.7% a 3.5%, y de 0.9% a 3.2% respectivamente (Cuadro 14A). Con respecto a 2016, las entidades de Jalisco (6.9%), Chihuahua (6.1%), Quintana Roo (5.8%) y Nayarit (3.9%) reportan porcentajes de consumo superiores al nacional.

**Cuadro 14A: Incidencia acumulada de cocaína.
Población de 12 a 65 años**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.6	1.622-3.554	2.7	1.618-3.735
Baja California	3.9	2.624-5.200	4.6	3.136-5.984
Baja California Sur	3.8	2.228-5.319	4.1	3.172-5.107
Campeche	1.7	0.927-2.379	4.0*	2.438-5.621
Chiapas	1.0	0.116-1.918	1.7	0.903-2.517
Chihuahua	4.8	3.416-6.245	6.1	4.407-7.794
Ciudad de México	3.1	2.136-4.103	3.0	1.916-4.166
Coahuila	1.7	0.891-2.496	3.7	2.377-4.962
Colima	1.5	0.780-2.300	4.9*	3.322-6.471
Durango	4.0	2.453-5.450	4.2	2.878-5.459
Estado de México	1.8	1.186-2.513	2.2	1.225-3.163
Guanajuato	2.1	1.007-3.105	3.4	2.253-4.585
Guerrero	3.4	1.921-4.945	3.4	2.148-4.702
Hidalgo	4.0	2.649-5.344	2.3	1.340-3.300
Jalisco	1.9	1.098-2.711	6.9*	4.572-9.301
Michoacán	2.4	0.970-3.793	3.7	2.518-4.884
Morelos	2.0	1.137-2.812	2.1	0.939-3.306
Nayarit	3.9	2.493-5.337	5.7	3.953-7.391
Nuevo León	1.9	0.923-2.869	3.1	1.980-4.246
Oaxaca	1.4	0.620-2.170	2.6	1.471-3.720
Puebla	0.9	0.373-1.444	3.0*	1.673-4.373
Querétaro	2.3	1.198-3.477	4.0	2.838-5.228
Quintana Roo	6.0	4.584-7.444	5.8	4.258-7.244
San Luis Potosí	0.6	0.192-0.927	2.1*	1.274-2.953
Sinaloa	3.7	2.179-5.286	4.7	3.455-5.871
Sonora	2.9	1.834-4.054	4.3	2.920-5.614
Tabasco	2.2	1.155-3.182	4.8*	3.480-6.213
Tamaulipas	6.0	4.441-7.508	3.8	2.623-5.040
Tlaxcala	0.8	0.323-1.319	1.3	0.648-1.865
Veracruz	0.9	0.172-1.719	3.2*	2.211-4.093
Yucatán	0.7	0.183-1.258	3.5*	1.963-5.083
Zacatecas	3.3	2.233-4.410	4.1	2.647-5.510
Nacional	2.4	2.149-2.585	3.5*	3.231-3.819

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína incluye crack.

*Incremento significativo.

Respecto al consumo de cocaína en el último año, se duplica a nivel nacional de 0.4% en 2008 a 0.8% en 2016. Es importante notar a los estados de Jalisco, Querétaro y Oaxaca, que presentan una tendencia de aumento proporcional de este consumo al pasar de 0.1% a 1.9%, de 0.1% a 1% y de 0.1% a 0.7% respectivamente. Asimismo se observa que, en el estado de Hidalgo el consumo disminuyó significativamente, de 2% a 0.5% (Cuadro 14B). En 2016 no hubo aumentos significativos con respecto al promedio nacional, pero en los estados de Colima (0.3%), San Luis Potosí (0.2%) Tlaxcala (0.2%) y Chiapas (0.2%) el consumo se ubicó por debajo del promedio.

**Cuadro 14B: Consumo en el último año de cocaína.
Población de 12 a 65 años.**

Estado	2008		2016	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.2	---	0.5	0.041-0.981
Baja California	0.6	0.112-1.169	0.6	0.055-1.107
Baja California Sur	0.7	---	0.3	---
Campeche	0.4	---	0.7	0.196-1.169
Chiapas	0.1	---	0.2	---
Chihuahua	1.4	0.622-2.142	1.1	0.376-1.754
Ciudad de México	0.3	---	0.6	---
Coahuila	0.6	0.140-1.008	1.0	0.206-1.704
Colima	--	---	0.3	---
Durango	0.7	0.044-1.455	0.8	0.308-1.209
Estado de México	0.2	0.060-0.345	0.6	0.118-1.015
Guanajuato	0.6	0.104-1.136	0.9	0.327-1.463
Guerrero	1.4	0.423-2.350	1.1	0.423-1.706
Hidalgo	2.0	1.033-2.922	0.5**	0.104-0.944
Jalisco	0.1	---	1.9	0.151-3.651
Michoacán	0.7	---	0.9	0.297-1.531
Morelos	0.3	---	0.3	0.029-0.635
Nayarit	0.5	0.098-0.890	0.7	0.043-1.315
Nuevo León	0.3	0.005-0.571	0.9	0.122-1.592
Oaxaca	0.1	---	0.7	---
Puebla	--	---	1.3	0.356-2.316
Querétaro	0.1	---	1.0	0.418-1.608
Quintana Roo	0.6	0.291-0.931	1.6	0.802-2.402
San Luis Potosí	0.1	---	0.2	0.002-0.423
Sinaloa	1.1	0.370-1.753	0.8	0.271-1.315
Sonora	0.4	---	0.9	0.226-1.559
Tabasco	0.5	0.124-0.853	1.4	0.600-2.185
Tamaulipas	1.4	0.683-2.192	0.6	0.184-0.943
Tlaxcala	0.1	---	0.2	---
Veracruz	0.1	---	0.5	0.125-0.870
Yucatán	0.2	---	0.6	0.057-1.049
Zacatecas	0.2	---	0.9	0.307-1.561
Nacional	0.4	0.356-0.523	0.8*	0.632-0.971

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008 y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Cocaína incluye crack.

Los tres guiones en los IC indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

*Incremento significativo.

**Decremento significativo.

Dificultades relacionadas al consumo de drogas

Esta sección se evaluó con una escala de 0 a 10, donde 0 representa ninguna dificultad y 10 una dificultad muy grave. En general los datos indican cómo en la medida en que la población muestra una mayor problemática o dependencia al consumo de drogas médicas e ilegales, se presenta una mayor dificultad ante ciertas situaciones cotidianas o se tienen más días perdidos.

**Cuadro 15: Dificultades Relacionadas al Consumo de Drogas.
Población de 12 a 65 años**

Dificultades*	Hombres						Mujeres					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	$\bar{X}$	D.E	$\bar{X}$	D.E	$\bar{X}$	D.E	$\bar{X}$	D.E	$\bar{X}$	D.E	$\bar{X}$	D.E
En las tareas domésticas												
Consumidores con Dependencia	3.9	3.2	3.8	2.8	3.6	2.7	2.7	2.4	3.7	3.2	3.3	1.8
Consumidores Regulares	1.9	2.2	1.7	2.1	1.1	1.6	1.4	1.8	2.7	3.9	1.0	2.0
Consumidores Experimentales	1.2	1.8	1.0	1.4	0.7	1.4	0.9	1.2	0.6	1.5	0.4	0.7
En su capacidad para trabajar o estudiar												
Consumidores con Dependencia	3.4	2.9	4.0	3.3	3.4	2.7	3.8	3.6	3.1	2.9	2.7	1.8
Consumidores Regulares	2.2	2.8	2.1	2.6	1.5	2.1	1.5	2.0	1.9	2.3	0.4	0.7
Consumidores Experimentales	1.4	2.3	1.8	3.1	1.0	1.5	1.3	2.1	1.1	2.3	0.6	1.4
Para iniciar o mantener relaciones estrechas												
Consumidores con Dependencia	2.8	2.9	3.6	3.0	3.9	3.1	3.2	3.3	2.4	2.6	0.4	2.0
Consumidores Regulares	2.0	2.4	1.9	2.5	1.2	1.9	1.6	2.5	2.1	2.2	0.8	1.5
Consumidores Experimentales	1.3	2.1	1.7	2.7	1.3	1.8	1.1	2.0	0.8	2.0	1.1	2.9
En su vida social												
Consumidores con Dependencia	3.8	3.4	4.2	3.1	4.2	3.2	3.1	3.2	2.8	3.1	0.4	2.0
Consumidores Regulares	2.3	2.9	2.2	2.8	1.5	2.1	1.4	2.4	1.8	1.8	0.6	1.9
Consumidores Experimentales	1.6	2.5	1.8	2.6	1.5	1.9	1.6	2.2	0.7	2.0	1.0	2.4
Días perdidos en los últimos 12 meses**												
Consumidores con Dependencia	13.1	40.2	38.5	93.2	22.9	67.8	13.6	32.7	23.0	35.7	15.7	7.9
Consumidores Regulares	15.0	62.4	5.5	36.6	1.2	8.8	0.8	1.7	0.4	1.8	6.9	48.3
Consumidores Experimentales	2.2	17.8	8.1	38.8	3.7	15.2	16.1	71.3	0.4	1.7	0.2	0.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

*Media de puntuación de una escala de 0 a 10.

**Media de días perdidos debido al consumo de drogas.



Para la población con dependencia, los datos encontrados en esta sección indican que los hombres de 12 a 17 años mencionan como principal dificultad a las tareas domésticas ($\bar{X} = 3.9$), mientras que en las mujeres son las dificultades en su capacidad de trabajar o estudiar ($\bar{X} = 3.8$).

En la población de 18 a 34 años de edad, los hombres reportan una media de 4.2 en dificultades en su vida social, y las mujeres una media de 3.7 en dificultad al realizar sus tareas domésticas. Estas mismas dificultades se encontraron para hombres y mujeres en la población de 35 a 65 años (hombres: $\bar{X} = 4.2$ en dificultades en su vida social; mujeres: $\bar{X} = 3.3$ en tareas domésticas).

En cuanto al número de días perdidos por su consumo de drogas, los hombres y mujeres de 18 a 34 años fueron quienes más número de días perdidos reportaron (38.5 y 23 días), seguido de hombres y mujeres de 35 a 65 años (22.9 y 15.7 días respectivamente); mientras que los de 12 a 17 años fueron quienes mostraron menos días perdidos (13.1 días hombres y 13.6 días mujeres) (Cuadro 15).

Tratamiento y necesidades de atención

De los consumidores de drogas en el último año, el 8% ha acudido a tratamiento (9.3% hombres y 3.9% mujeres); en tanto, en quienes reportaron dependencia en el último año, el 20.4% ha asistido a tratamiento (22.1% hombres y 12.8% mujeres) (Cuadro 16).

Cuadro 16: Consumidores de drogas que han recibido tratamiento.
Población de 12 a 65 años

	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total	200 110	8.0	111 002	20.4
Hombres	177 003	9.3	98 343	22.1
Mujeres	23 107	3.9	12 659	12.8

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Respecto al tipo de tratamiento, de quienes presentan dependencia en el último año, más de la mitad de los hombres acude a tratamiento residencial o consulta externa (54.2%), seguido de estancia en un anexo (53%) y tratamiento por desintoxicación (51.1%). En las mujeres estos porcentajes se reducen a 31.5% en tratamiento por desintoxicación y 22.9% tanto en tratamiento residencial como en estancia en un anexo (Cuadro 17).

Cerca de una cuarta parte de los consumidores de drogas en los últimos 12 meses (21.4%) y de las personas con dependencia en el último año (24.5%) completaron el tratamiento con algún profesional de la salud; en tanto que casi tres cuartas partes sólo lo hicieron en forma parcial (70.1% de los consumidores en el último año y 72.4% de los consumidores con dependencia en el último año). En los hombres se observa una situación similar, donde el menor porcentaje se encuentra entre quienes completaron el tratamiento (17.6% consumidores último año y 19.8% consumidores con dependencia en el último año); mientras que en la mujeres este patrón se invierte y el menor porcentaje se encuentra entre quienes sólo cubrieron de manera parcial el tratamiento con algún



profesional de la salud (42.6% con consumo en el último año y 9.5% con dependencia en el último año) (Cuadro 18).

**Cuadro 17: Tipo de tratamiento recibido por los consumidores de drogas.
Población de 12 a 65 años**

Tratamiento	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total				
Desintoxicación	93 919	46.9	54 250	48.9
Residencial	81 008	40.5	56 237	50.7
Ambulatorio	45 472	22.7	25 621	23.1
Por internet	23 322	11.7	14 189	12.8
Clínica de metadona	14 233	7.1	12 370	11.1
Anexo	86 242	43.1	55 029	49.6
Hombres				
Desintoxicación	85 447	48.3	50 259	51.1
Residencial	75 146	42.5	53 335	54.2
Ambulatorio	42 506	24.0	23 155	23.5
Por internet	23 322	13.2	14 189	14.4
Clínica de metadona	13 874	7.8	12 174	12.4
Anexo	78 368	44.3	52 130	53.0
Mujeres				
Desintoxicación	8 471	36.7	3 991	31.5
Residencial	5 862	25.4	2 902	22.9
Ambulatorio	2 966	12.8	2 466	19.5
Por internet	--	--	--	--
Clínica de metadona	359	1.6	196	1.5
Anexo	7 874	34.1	2 898	22.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

**Cuadro 18: Tipo de tratamiento recibido por los consumidores de drogas.
Población de 12 a 65 años**

Tratamiento	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total				
Completo con profesionista	21 908	21.4	14 912	24.5
Parcial con profesionista	71 716	70.1	44 015	72.4
Autoayuda	8 707	8.5	1 867	3.1
Otro tipo	--	--	--	--
Hombres				
Completo con profesionista	16 254	17.6	11 230	19.8
Parcial con profesionista	67 518	73.0	43 629	76.9
Autoayuda	8 707	9.4	1 867	3.3
Otro tipo	--	--	--	--
Mujeres				
Completo con profesionista	5 653	57.4	3 682	90.5
Parcial con profesionista	4 198	42.6	386	9.5
Autoayuda	--	--	--	--
Otro tipo	--	--	--	--

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.



**Cuadro 19: Consumidores de drogas que consultaron a algún profesional de la salud.
Población de 12 a 65 años**

Profesional al que acudió	Consumo Último Año		Con Dependencia	
	N	%	N	%
Total				
Psiquiatra	55 096	27.5	38 017	34.2
Médico familiar o general	56 979	28.5	39 312	35.4
Otro médico especialista	31 967	16.0	22 394	20.2
Psicólogo	80 668	40.3	53 373	48.1
Trabajadora Social	50 849	25.4	32 666	29.4
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	47 821	23.9	34 216	30.8
Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	36 249	18.1	24 590	22.2
Consejero espiritual	49 251	24.6	33 411	30.1
Grupo de autoayuda	67 028	33.5	40 638	36.6
Consultó a algún otro especialista	11 222	5.6	11 222	10.1
Hombres				
Psiquiatra	52 038	29.4	37 432	38.1
Médico familiar o general	53 869	30.4	37 571	38.2
Otro médico especialista	31 566	17.8	22 394	22.8
Psicólogo	73 021	41.3	49 692	50.5
Trabajadora Social	45 793	25.9	30 725	31.2
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	45 232	25.6	32 275	32.8
Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	34 308	19.4	22 649	23.0
Consejero espiritual	46 810	26.4	31 471	32.0
Grupo de autoayuda	65 740	37.1	40 252	40.9
Consultó a algún otro especialista	11 222	6.3	11 222	11.4
Mujeres				
Psiquiatra	3 058	13.2	586	4.6
Médico familiar o general	3 110	13.5	1 741	13.8
Otro médico especialista	401	1.7	--	--
Psicólogo	7 647	33.1	3 682	29.1
Trabajadora Social	5 056	21.9	1 941	15.3
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	2 589	11.2	1 941	15.3
Terapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	1 941	8.4	1 941	15.3
Consejero espiritual	2 441	10.6	1 940	15.3
Grupo de autoayuda	1 288	5.6	386	3.0
Consultó a algún otro especialista	--	--	--	--

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.



En general, los consumidores de drogas en el último año acuden a consultar a un psicólogo (40.3%), seguido de grupos de autoayuda (33.5%) y médico familiar o general (28.5%); esto es similar en los hombres (41.3%, 37.1% y 30.4%); en tanto que las mujeres acuden con el psicólogo (33.1%), trabajadores sociales (21.9%) y médicos familiares o generales (13.5%) (Cuadro 19).

Finalmente, al analizar las necesidades de atención por el consumo de drogas para la población total (Cuadro 20), se observa que el 0.6% de los consumidores con dependencia y 9.7% de los consumidores sin dependencia requieren algún tipo de ayuda por el consumo, mientras que en la población de 12 a 17 años, estos porcentajes son 0.6% y 5.8% respectivamente.

Es de suma importancia promover campañas de prevención en los adolescentes que han estado expuestos al consumo (16.5%) y en los que nunca han consumidos drogas (77.1%).

**Cuadro 20: Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas.
Población de 12 a 65 años**

	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	445 798	1.1	99 073	0.2	544 870	0.6
Uso sin dependencia	6 203 419	15.1	2 033 927	4.6	8 237 345	9.7
Exposición a drogas sin consumo	10 599 504	25.7	4 748 302	10.8	15 347 806	18.0
No consumo	23 919 896	58.1	37 212 140	84.4	61 132 036	71.7

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Factores relacionados con el consumo de drogas


a) Percepción de riesgo y tolerancia social

Al analizar la percepción de riesgo de los no consumidores de drogas en la población total, el 71.3% considera muy peligroso el consumo de cocaína, 70.7% el de inhalables y el 39.9% el de mariguana; en tanto que la percepción de riesgo disminuye en los consumidores de drogas (62.8%, 66.9% y 18.7% respectivamente). Cabe resaltar el bajo porcentaje de percepción de riesgo de consumir mariguana en comparación con las demás drogas (cocaína e inhalables), tanto en población consumidora como no consumidora.

Por sexo, los hombres no consumidores reportan porcentajes menores (69.5% cocaína, 35.7% mariguana, 69.0% inhalables) que las mujeres (72.7%, 43.4% y 72.1% respectivamente). Situación que es similar en los consumidores de drogas (Gráfica 3).

En la población de 12 a 17 años, el 69.1% que no ha consumido drogas considera muy peligroso el consumo de cocaína, 67.6% para los inhalables y 50.7% para el consumo de mariguana, mientras que en los consumidores de drogas, la percepción de riesgo disminuye: inhalables (52.6%), cocaína

(51.3%) y mariguana (19.9%). Situación similar presentan hombres y mujeres, ya que la percepción de riesgo es más alta en los no consumidores de drogas y disminuye para los consumidores.




Con respecto a la tolerancia social, en la población de 12 a 17 años que ha consumido drogas se observa una baja tolerancia de la familia hacia el consumo de drogas, (3% hombres y 1.5% mujeres), y es más baja en los no consumidores (0.6% ambos sexos). La tolerancia del mejor amigo(a) ante el consumo es de 27% hombres y 27.4% mujeres en los adolescentes consumidores de drogas y de 11.2% hombres y 9.2% mujeres no consumidores (Gráfica 4).

En la población de 18 a 34 años, el 4.4% de hombres y el 1.6% de mujeres que consumen drogas, consideran que sus familiares son tolerantes ante el consumo, mientras que en los no consumidores es menor el porcentaje (1.4% hombres y 0.8% mujeres). Situación diferente ocurre con el mejor amigo(a), donde la tolerancia hacia el consumo es mayor tanto en los no consumidores (11.2% hombres y 6.4% mujeres) como en los consumidores de drogas (29.2% hombres y 22.3% mujeres) (Gráfica 4).

En los consumidores de drogas de 35 a 65 años se reporta una tolerancia de la familia hacia el consumo de drogas de 3.1% en hombres y 5.1% en mujeres; mientras que en los no consumidores la tolerancia es de 1.3% en hombres y 0.9% en mujeres. En el caso del mejor amigo(a), la tolerancia ante el consumo de drogas es de 17% hombres y 9.8% mujeres en los consumidores y de 8.6% y 3% respectivamente en los no consumidores (Gráfica 4).



Gráfica 4. Tolerancia Social hacia el Consumo de Drogas




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

b) Exposición al consumo de drogas

De la población que ha estado expuesta a drogas, sea que se las hayan ofrecido regaladas o vendidas, el 32.2% ha consumido cualquier droga alguna vez, el 28.4% ha consumido marihuana, el 10.7% cocaína y el 3.6% inhalables; en quienes no han estado expuestos al consumo el 2.4% ha consumido cualquier droga, el 1.5% marihuana, el 0.6% cocaína y el 0.2% inhalables.

Gráfica 5. Exposición al Consumo de Drogas
Población de 12 a 65 años



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Por sexo, se observa que los hombres que han estado expuestos a drogas, el 35% reporta haber consumido cualquier droga, marihuana el 31.2%, cocaína el 12.7% e inhalables el 3.8%. Situación




diferente se presenta entre quienes no han estado expuestos donde el consumo de cualquier droga es de 3.8%, marihuana 2.6%, cocaína 1.2% e inhalables 0.3%. En el caso de las mujeres, de aquellas expuestas a drogas el 25.1% ha consumido cualquier droga, el 21.2% marihuana, 5.7% cocaína y 3.2% inhalables alguna vez; estas cifras disminuyen en las no expuestas, pues apenas el 1.4% ha consumido cualquier droga, 0.7% marihuana, 0.2% cocaína y 0.1% inhalables (Gráfica 5).

c) Exposición a la prevención

De la población total que ha estado expuesta a la prevención antes de consumir drogas, el 5.1% consume cualquier droga; los hombres reportan un porcentaje mayor (8.1%) que el de las mujeres (3.2%). En contraste, quienes no han estado expuestos a prevención, los porcentaje de consumo se duplican (12.3% población total; 18.4% hombres y 5.6% mujeres) (Gráfica 6).

De la población entre 12 y 17 años que ha participado en alguna actividad para prevenir el consumo de drogas, el 3.3% reporta consumo de cualquier droga alguna vez, 3.5% hombres y 3.1% mujeres, porcentaje de consumo que crece 3 veces (10.3% población total, 10.1% hombres y 10.6% mujeres) en el grupo que no ha estado expuesto a programas de prevención (Gráfica 6).



En la población de 18 a 34 años, el 8.1% que ha recibido información sobre prevención del consumo de drogas reporta haber consumido cualquier droga alguna vez; los hombres presentan un porcentaje



de consumo de 13.7% y las mujeres de 4.8% en tanto que el 17.4% de la población sin exposición a prevención ha consumido cualquier droga alguna vez (hombres 25.2%, mujeres 8.9%) (Gráfica 6).

En la población de 35 a 65 años, el 3.2% de quien ha estado expuesto a la prevención presenta consumo de cualquier droga alguna vez; (7.8% de los hombres y 1.3% de las mujeres). Los porcentajes de consumo se duplican en quienes no han participado en programas preventivos tanto en población total (8.4%) y hombres (14.6%), mientras que en mujeres se mantienen estable (2%) (Gráfica 6).

Si bien vemos que hay una relación entre estar expuesta a prevención con prevalencias menores de consumo, es importante analizar a detalle el tipo de prevención y hacer análisis de la calidad de dichas actividades de prevención.

RESUMEN DE RESULTADOS

Prevalencias y tendencias del consumo de drogas

En la población total creció el consumo de cualquier droga, drogas ilegales y mariguana tanto para alguna vez (de 7.8% a 10.3%, de 7.2% a 9.9% y de 6% a 8.6% respectivamente) como para el último año (de 1.8% a 2.9%, 1.5% a 2.7% y de 1.2% a 2.1% respectivamente), mientras que el consumo de crack, alucinógenos, inhalables, heroína y metanfetaminas se mantiene sin cambios estadísticamente significativos.

En hombres incrementaron las mismas sustancias para alguna vez (cualquier droga de 13% a 16.2%, drogas ilegales de 12.5% a 15.8% y mariguana de 10.6% a 14%) y para último año (cualquier droga de 3% a 4.6%, drogas ilegales de 2.6% a 4.4% y mariguana de 2.2% a 3.5%). Sin embargo, es relevante hacer notar que proporcionalmente, el crecimiento es mucho más evidente en las mujeres, pues el consumo de mariguana alguna vez se duplicó (de 1.6% a 3.7%) y el de último año se triplicó (de 0.3% a 0.9%) al igual que el de cualquier droga y drogas ilegales último año (de 0.7% a 1.3% y de 0.4 a 1.1% respectivamente).

Por otro lado, la prevalencia de dependencia a drogas en el último año en la población es de 0.6% (1.1% en hombres y 0.2% en mujeres). Se debe observar que los hombres de 18 a 34 años tienen una prevalencia 6.6 veces mayor que las mujeres de esa misma edad (2% y 0.3% respectivamente).

La media en la edad de inicio del consumo de drogas ha disminuido en el transcurso del tiempo (20.6 años en 2002, 18.7 en 2008, 18.8 en 2011 y 17.8 en 2016).

Tendencias regionales del consumo de drogas (Encuestas 2011-2016)

En las regiones Occidental, Norcentral, Sur y Centro se presentaron los mayores incrementos con respecto a 2011 en el consumo alguna vez de cualquier droga (de 10.3% a 14.4%; de 8.4 a 11.5%; de 5.3% a 9.6% y de 6.6% a 9.4% respectivamente), drogas ilegales (de 9.2% a 13.7%; 7.3% a 10.9%; de 5% a 9.3% y de 6.2% a 9.1%). En el caso del consumo de mariguana alguna vez, nuevamente se encuentran las regiones Occidental (de 6.8% a 11.3%), Norcentral (de 5.9% a 9.4%), Sur (de 4.6% a 8.3%), Centro (de 5.2% a 8.1%) y se agrega la región Noroccidental (de 7.4% a 10.2%) como las que tuvieron los mayores aumentos en el consumo, mientras que en el consumo de cocaína, se mantuvo estable.

En cuanto a la prevalencia de último año de cualquier droga, las regiones Occidental (de 2% a 4.5%), Norcentral (de 2% a 3.8%) y Sur (de 0.8% a 2.2%) presentan los mayores incrementos con respecto a 2011; para drogas ilegales (de 1.5% a 4.1%, de 1.6% a 3.3% y de 0.6% a 2%, respectivamente) y mariguana (de 1.3% a 2.7%; de 1% a 2.8% y de 0.5% a 1.5%), además de la región Centro (de 1.2% a 2.4%) para drogas ilegales.

Tendencias y variaciones estatales del consumo de drogas (Encuestas 2008-2016)

El consumo de cualquier droga en el último año pasó de 1.6% en 2008 a 2.9% en 2016. Los estados que presentaron el mayor crecimiento proporcional fueron: Jalisco (de 1% a 5.2%), Colima (de 0.3% a 3.1%) y San Luis Potosí (de 0.4% a 2.2%). En relación a este estudio, los estados mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional (2.9%) excepto Oaxaca (1.5%) y Chiapas (1.1%), cuyo porcentaje de consumo es menor al nacional (2.9%).

En 2008 el 1.4% de la población reportó consumo drogas ilegales en el último año, para 2016 casi se duplicó a 2.7%. El mayor crecimiento proporcional se presentó en Jalisco, Colima y Tlaxcala.. En tanto que el estado de Baja California (4.4%) presentó una prevalencia por arriba del porcentaje nacional en 2016.

En cuanto al consumo de marihuana en el último año, se duplicó al pasar de 1% a 2.1%. Los estados con mayores incrementos proporcionales fueron Coahuila (0.7% a 3.2%), Jalisco (0.6% a 2.9%) y Colima (0.2% a 2.3%). Mientras que Baja California (3.8%) se ubica por arriba del promedio nacional en 2016 (2.1%).

En cuanto al consumo de cocaína en el último año se duplicó de 0.4% en 2008 a 0.8% en 2016; Jalisco, Querétaro y Oaxaca, que presentan una tendencia de aumento proporcional de este consumo al pasar de 0.1% a 1.9%, de 0.1% a 1% y de 0.1% a 0.7% respectivamente. En 2016 no hubo aumentos significativos con respecto al promedio nacional, pero en los estados de Colima (0.3%), San Luis Potosí (0.2%) Tlaxcala (0.2%) y Chiapas (0.2%) el consumo se ubicó por debajo del promedio.

Dificultades relacionadas al consumo de drogas

Los hombres de 12 a 17 años que reportan dependencia mencionan en primer lugar la dificultad de realizar tareas domésticas ($\bar{X}=3.9$), mientras que las mujeres mencionan dificultades en su capacidad de trabajar o estudiar ($\bar{X}=3.8$); los hombres de 18 a 34 años reportaron dificultades en su vida social ($\bar{X}=4.2$) mientras que en mujeres mencionan dificultades para realizar tareas domésticas ($\bar{X}=3.7$). En aquellos de 35 a 65 años, los hombres mencionaron dificultades en su vida social ($\bar{X}=4.2$) y las mujeres problemas para las tareas domésticas ($\bar{X}=3.3$).

La población de 18 a 34 años con dependencia tuvo el mayor número de días perdidos al año (38.5 días hombres y 23 días mujeres) debido a su consumo de drogas.

Tratamiento y necesidades de atención

De los consumidores de drogas, el 8% ha acudido a tratamiento (9.3% hombres y 3.9% mujeres); en tanto que de los consumidores con dependencia en el último año, la prevalencia es de 20.4% (22.1% hombres y 12.8% mujeres).

El 21.4% de los consumidores de drogas en los últimos 12 meses y 24.5% de las personas con dependencia en el último año completaron el tratamiento con algún profesional de la salud.



En la población de 12 a 17 años, el 0.6% y el 5.8% de los consumidores con dependencia y sin dependencia respectivamente requieren algún tipo de ayuda por su consumo. Por sexo, el 0.7% de hombres y 0.5% de mujeres con dependencia y el 5.9% de hombres y 5.6% de mujeres sin dependencia requieren de ayuda por su consumo de drogas.

Factores relacionados con el consumo de drogas

Los resultados indican una mayor percepción de riesgo en quienes no consumen drogas. Así, de la población total sin consumo de drogas, el 71.3% considera muy peligroso el consumo de cocaína, el 70.7% el de inhalables y el 39.9% el de marihuana; esta percepción de riesgo disminuye en el grupo de consumidores de drogas (62.8%, 66.9% y 18.7% respectivamente).

Algo similar ocurre con la población menor de edad de 12 a 17 años, de manera que el 69.1% de quienes no han consumido drogas considera muy peligroso el consumo de cocaína, 67.6% el consumo de inhalables y 50.7% la marihuana, en los consumidores de drogas, la percepción de riesgo se reduce: cocaína (51.3%), inhalables (52.6%) y marihuana (19.9%).


En general, la tolerancia social de la familia hacia el consumo de drogas es baja, y es un poco más aceptada en los consumidores, situación que es aún más laxa cuando se considera la tolerancia social de los amigos. De esta manera, en adolescentes de 12 a 17 años que han consumido drogas, la tolerancia de la familia hacia el consumo es de 3% en hombres y 1.5% en mujeres, en los no consumidores es de 0.6% tanto en hombres como en mujeres. La tolerancia del mejor amigo(a) es de 27% en hombres y 27.4% en mujeres en el caso de los consumidores y de 11.2% en hombres y 9.2% en mujeres en los no consumidores.

Sin duda la exposición al consumo de drogas es un factor que afecta la decisión de consumir drogas, de manera que de la población expuesta, el 32.2% ha consumido alguna sustancia, el 28.4% marihuana, el 10.7% cocaína y el 3.6% inhalables, cifras que son menores para quienes no se les han ofrecido drogas.

La exposición a algún tipo de prevención ha funcionado, de manera que los consumos de sustancias son menores en esta población cuando se realizó antes de consumirlas. No obstante, es necesaria mayor información sobre el tema y sobre todo, realizar evaluaciones sistemáticas de las intervenciones, con objeto de contar con intervenciones basadas en evidencia. Los datos indican que en los adolescentes de 12 a 17 años que han recibido algún tipo de prevención, el 3.3% reporta consumo de cualquier droga, en comparación con los que no la recibieron que es de 10.3%.



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Los resultados de este estudio nos indican que en México, en la población de 12 a 65 años, el consumo de drogas aún es bajo en comparación con otros países; no obstante, se mantiene un crecimiento sostenido, en particular cuando se analiza el consumo en el último año de cualquier droga, de las drogas ilegales y de la mariguana por separado. El consumo de otras drogas (inhalables, cocaína, alucinógenos y estimulantes tipo anfetamínico) se mantiene estable desde la medición de 2011, aunque el consumo muestra un aumento constante desde 2002, principalmente el de cocaína.

Los principales crecimientos en el consumo se dan en la población de 12 a 17 años, y de 18 a los 34 años. Al analizar los datos según sexo, en la población femenina se observaron menores prevalencias, pero en ellas se tienen los mayores incrementos proporcionales.

Las drogas siguen teniendo un inicio temprano 17.7 años en los hombres y 18.2 en las mujeres, con pocos nuevos casos después de los 35 años. Este estudio muestra una reducción en la edad de inicio en comparación con la medición de 2011, donde en las mujeres la edad de inicio disminuyó de 20.1 años a 18.2; en tanto que para los hombres el cambio fue menor, de 18.5 a 17.7 años. Este cambio, entre otros elementos, indica el crecimiento en la prevalencia del consumo de drogas de las nuevas generaciones, lo cual es un fenómeno que debe monitorearse y reforzar la postergación del inicio a través de programas orientados a tal fin o de nuevas acciones que conduzca a evitar el consumo o a aplazarlo.

La mariguana es la droga que mayor crecimiento ha tenido, tanto en hombres como en mujeres. En este incremento interviene la percepción de riesgo del consumo de mariguana que ha disminuido por debajo del 40%, cuando en otras sustancias como la cocaína o los inhalables alcanza valores mayores al 62%. De manera particular, esta situación se observa en la Ciudad de México donde apenas el 26% percibe como muy peligroso el consumo de esta sustancia.

Sin duda, es un área relevante para trabajar en los programas de prevención ya que diversos estudios han reportado que la percepción de riesgo está altamente relacionada con el consumo⁹.

Otro factor importante es el grupo de amistades, de manera que en aquellos donde se tiene mayor tolerancia ante el consumo, se observan mayores prevalencias de consumo, tanto en hombres como en mujeres.

El ofrecimiento de alguna droga, sea vendida o regalada, es otro factor que involucra no sólo al grupo de pares, sino tiene que ver con el entorno que rodea al individuo y a sus familias. En este ámbito los resultados muestran que uno de cada tres hombres a quienes se les ha ofrecido drogas la llegan a consumir; además esta prevalencia es casi diez veces menor en quienes no han sido expuestos a ella. Los datos son similares para las mujeres.

Esto implica, por la parte normativa y de seguridad, que deben cuidarse los entornos escolares y de recreación familiar por parte de las autoridades encargadas de ello, con objeto de disminuir la disponibilidad de sustancias y su ofrecimiento, y así contar con espacios de convivencia y recreación más seguros.



Por lo que respecta a los cambios en los estados, en muchos de ellos se registra un incremento similar al nacional. Las entidades que actualmente muestran los mayores consumos son Jalisco, Baja California y Quintana Roo en cualquier droga, drogas ilegales y mariguana. Si incluimos a la cocaína en el escenario, se agregan Chihuahua y Nayarit. Este elemento debe ayudar a dirigir acciones específicas de prevención basada en evidencia en estos estados, con objeto de contener y disminuir las tasas de consumo de sus habitantes.

La información de la encuesta nos ha permitido conocer algunas de las áreas de la vida que se ven afectadas en los consumidores, en particular en los dependientes, quienes mencionan verse perjudicados en su vida social, en la realización de tareas domésticas y en su capacidad para trabajar o estudiar. Adicionalmente, este segmento de la población indica que debido a su consumo fueron incapaces de realizar sus actividades habituales o de trabajar un promedio de 30.8 días de un año. De manera particular, los hombres entre 18 y 34 años reportan el mayor número de días de incapacidad con una media de 38.5. Estos datos muestran cómo el consumo de drogas puede imposibilitar al individuo o separarlo de sus actividades cotidianas al afectar sus relaciones personales, sociales o disminuir su capacidad económica.

Por otro lado, observamos en los datos que apenas el 20.4% de la población que presenta dependencia y 8% de los que han consumido drogas en el último año, acude a tratamiento. Sin duda, la necesidad de facilitar el acceso a tratamiento a la población que lo requiere, es una acción imperativa para las personas que trabajamos en esta área. Identificar claramente las barreras de acceso, sean económicas, de distancias, de calidad del servicio o del tiempo que tiene disponible la persona usuaria, es una tarea necesaria para disminuir los obstáculos y abrir caminos para la atención de los problemas que genera el consumo de drogas.

Sin embargo, no son los únicos elementos a considerar. Hay que hacer notar a los consumidores cómo las drogas afectan su salud, sus actividades cotidianas, así como el entorno personal en el que se desenvuelve. Este punto es difícil ya que es necesario resaltar la problemática social, personal y de salud que su consumo puede ocasionarles.

También es relevante trabajar más con la población en general para que perciba el consumo de drogas como un problema de salud y no como un acto delictivo de quien consume drogas, así como disminuir el estigma que se tiene sobre el consumo, en particular hacia las mujeres consumidoras. ¿Por qué las mujeres? Los datos indican que son ellas quienes menos asisten a tratamiento. Además, las que llegan a asistir van principalmente a terapias individuales y no a grupales como ocurre con los hombres y esto quizá se deba al estigma y hostigamiento que se presenta hacia ellas. Ello puede facilitar que no se concluya el tratamiento y posiblemente a no buscar otras opciones, derivado de la experiencia vivida.



La planeación y otorgamiento de servicios en adicciones y en salud mental debe tomar en cuenta estos puntos. Adicionalmente debe considerarse el facilitar el acceso al servicio e incluso llevarlo a la comunidad; realizar acciones relevantes para disminuir el estigma hacia el consumidor de drogas y cambiar la visión hacia el consumo para verlo como un problema de salud pública y, por supuesto, facilitar que las mujeres se mantengan en los tratamientos disponibles, realizando las acciones necesarias para proteger su integridad y ofrecerles el mejor servicio posible.

En este contexto de los resultados de la ENCODAT 2016-2017, surge la necesidad de desarrollar políticas claras de prevención basadas en evidencia, que permitan el desarrollo de nuevos programas, así como la adaptación y aplicación de los que han demostrado ser exitosos. Es de suma importancia que involucren el trabajo con los niños, sus familias y sus cuidadores con objeto de iniciar la prevención y reforzar sus habilidades socioemocionales en las edades más tempranas.

Algunos de estos programas deben retomar entre sus metas el incrementar la percepción de riesgo de consumir estas sustancias e integrar la necesidad de contar con escenarios y espacios públicos seguros para el sano desarrollo de nuestras nuevas generaciones.


Sin duda el trabajo dirigido a disminuir el estigma hacia las y los consumidores, es un reto impostergable, así como el desarrollar nuevos espacios para los que necesiten atención especializada y que la puedan encontrar conforme a sus necesidades específicas de consumo y de condición de género. Esos son algunos de los retos importantes en los que hay que poner manos a la obra cuanto antes.





REFERENCIAS

1. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012. Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx
2. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas. Villatoro-Velázquez JA, Oliva Robles, N., Fregoso Ito, D., Bustos Gamiño, M., Mujica Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., Nani Alvarado, R., y Medina-Mora ME. México DF, México: INPRFM; 2015 ISBN: 978-607-460-502-0.
3. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología (2016). Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) Informe 2016.
4. Velázquez, M; Gutiérrez, A. (2017). Consumo de drogas en pacientes de primer ingreso a tratamiento a Centros de Integración Juvenil Julio-Diciembre, 2016. Informe de Investigación 17-01a. Centros de Integración Juvenil. Dirección de Investigación y Enseñanza. Subdirección de Investigación. Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.
5. Gutiérrez, A. (2017). Tendencias de las principales drogas de mayor impacto reportadas por usuarios de drogas ilícitas en el año previo a la solicitud de tratamiento en Centros de Integración Juvenil Primer semestre 2005-Segundo semestre 2016. Informe de investigación 17-01g. Centros de Integración Juvenil. Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas.
6. United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017 (United Nations publication, Sales No. E.14.XI.7).
7. Organización de los Estados Americanos OEA, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2015). Informe sobre uso de drogas en las Américas 2015.
8. Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (2016). Behavioral health trends in the United States: Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. SMA 15-4927, NSDUH Series H-50).
9. Villatoro, J., Bustos, M., Fregoso, D., Fleiz, C., Gutiérrez, ML., Amador, N., Medina-Mora, ME. (2017). Contextual factors associated with marijuana use in school population. *Salud Mental* 40(3), 93-101.



GLOSARIO

Consumo de cualquier droga: Se refiere al uso de una o más sustancias médicas fuera de prescripción o por más tiempo del indicado por el médico (como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes) o ilegales (tales como marihuana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc).

Drogas ilegales: En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, crack o piedra, alucinógenos, inhalables, heroína, metanfetaminas y otras drogas como ketamina, GHB, etc.

Drogas médicas: En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como opiáceos, tranquilizantes, sedantes y barbitúricos y anfetaminas o estimulantes. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad a la indicada por el médico.

Consumo experimental: Se caracteriza porque el individuo refiere el consumo de una o más sustancias de una a cinco veces máximo a lo largo de su vida.

Consumo regular: Se caracteriza porque el individuo refiere el consumo de una o más sustancias en más de cinco ocasiones a lo largo de su vida.

Cualquier droga regalada o comprada: Se refiere al ofrecimiento de cualquier droga, sea regalada o para su compra, independientemente de que se consuma o no.

Dependencia a drogas^{1,2}: Es el conjunto de manifestaciones físicas, cognitivas y del comportamiento, que incluyen la presencia de distintos síntomas tales como: tolerancia, abstinencia, uso por más tiempo o mayor cantidad, deseo persistente o incapacidad de control, empleo de mucho tiempo para conseguir drogas o recuperarse de sus efectos, reducción de actividades sociales, laborales o recreativas, así como el uso continuado a pesar de tener conciencia de sus evidentes consecuencias perjudiciales. En este estudio se consideró como dependientes a los individuos que presentaron tres o más de estos síntomas dentro de los 12 meses previos a la entrevista de acuerdo a los criterios de la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta (CIDI por sus siglas en inglés). Los síntomas de dependencia se preguntaron para cada una de las drogas consumidas por el usuario.

Dificultades relacionadas al consumo de drogas³: Se evaluó con la Escala de Discapacidad de Sheehan y el número de días productivos perdidos. Esta escala es un instrumento de auto reporte que evalúa la discapacidad en diferentes áreas (laboral, vida social y familiar). Las sub-escalas se promedian y se obtiene así una puntuación total que va de 0, sin deterioro en el funcionamiento, hasta 10, que indica un funcionamiento totalmente deteriorado. También se preguntó sobre el

¹American Psychiatric Association (APA). (2002). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson.

² World Health Organization. (2001). Composite International Diagnostic Interview (CIDI) Version 2.1. Ginebra, Suiza: WHO.

³ Sheehan DV. (1983). The Anxiety Disease. New York, Scribner's.



número de días en que fue totalmente incapaz de trabajar debido a un trastorno presente en los últimos 12 meses.

Exposición a drogas: Es la oportunidad que tiene una persona de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

Exposición a la prevención: Se refiere a la población que ha recibido alguna plática o ha participado en algún programa de prevención antes de haber consumido drogas.

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas: Esta variable permite conocer las necesidades en cada grupo de la población, en términos de prevención, prevención especializada o remisión a tratamiento. Se consideran cuatro valores, donde el de mayor problema es la dependencia a las drogas en los últimos 12 meses, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.


Percepción de riesgo de consumir drogas: Grado de peligrosidad que se le atribuye a las consecuencias negativas de consumir drogas ilegales o médicas.

Prevalencia de consumo: Índices que consideran a la población que reportó haber consumido por lo menos una droga ilegal o médica. Se consideran tres temporalidades: alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses (o anual) y en los últimos 30 días (o mes).

Tolerancia social al consumo de drogas: Se refiere a la aceptación o rechazo hacia el consumo de drogas ilegales o médicas por parte de la familia, los amigos, la pareja o el entorno social.

Tratamiento completo con profesionalista. Se refiere al tratamiento que ha terminado o continúa recibiendo un usuario de drogas por parte de alguno de los siguientes profesionales de la salud: psiquiatra, médico familiar o de cabecera, algún otro médico (cardiólogo, ginecólogo, etc.), psicólogo, trabajadora social en un centro de tratamiento, enfermera, terapeuta u otro profesional de la salud en un centro de salud. Para cumplir este criterio es necesario haber asistido a 7 o más sesiones, cada una con una duración de 16 minutos o más para la consulta con el psiquiatra y el médico familiar o de cabecera y de 31 minutos o más con el resto de los profesionales.

Tratamiento parcial con profesionalista. Se refiere al tratamiento recibido por parte de algún profesional de la salud, pero el consumidor no necesariamente sigue en tratamiento o no lo completó conforme al número de sesiones indicadas o la duración de las mismas.



ANEXO A: DESGLOSE POR ESTADO DE LA TASA DE RESPUESTA



ANEXO A: DESGLOSE POR ESTADO DE LA TASA DE RESPUESTA DE LA ENCODAT 2016-2017

Tasas de respuesta colectiva por estado. Incluye viviendas donde se aplicó el cuestionario *Tradicional* (ENA-2011)

	Muestra original			Muestra Total		
	Viviendas seleccionadas en la muestra original de Unidades Primarias de Muestreo.			Viviendas seleccionadas en la muestra original y en la muestra réplica		
	Visitadas	No visitadas	Tasa Respuesta	Visitadas	No Visitadas	Tasa Respuesta
01 Aguascalientes	2 030	159	93	2 221	199	92
02 Baja California	2 146	32	99	2 229	32	99
03 Baja California Sur	2 057	8	100	2 127	8	100
04 Campeche	2 144	45	98	2 180	45	98
05 Coahuila de Zaragoza	2 081	108	95	2 184	108	95
06 Colima	2 164	9	100	2 176	9	100
07 Chiapas	2 076	140	94	2 239	140	94
08 Chihuahua	1 922	322	86	2 185	393	85
09 Ciudad de México	2 093	93	96	2 313	118	95
10 Durango	1 955	193	91	2 151	226	90
11 Guanajuato	2 088	107	95	2 186	107	95
12 Guerrero	2 017	184	92	2 238	184	92
13 Hidalgo	2 163	27	99	2 225	27	99
14 Jalisco	2 028	162	93	2 342	162	94
15 México	2 140	50	98	2 196	50	98
16 Michoacán de Ocampo	2 009	181	92	2 231	181	92
17 Morelos	2 140	42	98	2 196	81	96
18 Nayarit	2 046	125	94	2 190	139	94
19 Nuevo León	1 935	254	88	2 194	266	89
20 Oaxaca	2 089	103	95	2 165	120	95
21 Puebla	2 059	131	94	2 171	137	94
22 Querétaro	2 063	126	94	2 191	126	95
23 Quintana Roo	2 024	164	93	2 325	168	93
24 San Luis Potosí	2 129	50	98	2 222	50	98
25 Sinaloa	2 113	64	97	2 197	97	96
26 Sonora	2 181	8	100	2 216	8	100
27 Tabasco	2 033	149	93	2 157	149	94
28 Tamaulipas	2 157	33	98	2 203	33	99
29 Tlaxcala	2 187	1	100	2 187	1	100
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	2 071	88	96	2 213	88	96
31 Yucatán	2 053	139	94	2 317	139	94
32 Zacatecas	2 189	--	100	2 189	--	100
Nacional	66 582	3 297	95	70 756	3 591	95

Tasas de respuesta de hogar por estado

Entidad	Completas	No viviendas	No conseguidas	Total	Tasa Respuesta
01 Aguascalientes	1 707	48	293	2 048	85
02 Baja California	1 807	62	199	2 068	90
03 Baja California Sur	1 768	52	169	1 989	91
04 Campeche	1 717	69	242	2 028	88
05 Coahuila de Zaragoza	1 652	88	289	2 029	85
06 Colima	1 679	40	270	1 989	86
07 Chiapas	1 712	42	215	1 969	89
08 Chihuahua	1 741	106	205	2 052	89
09 Ciudad de México	1 760	86	346	2 192	84
10 Durango	1 747	60	192	1 999	90
11 Guanajuato	1 758	43	212	2 013	89
12 Guerrero	1 847	75	143	2 065	93
13 Hidalgo	1 828	66	140	2 034	93
14 Jalisco	1 724	50	426	2 200	80
15 México	1 661	110	331	2 102	83
16 Michoacán de Ocampo	1 821	65	137	2 023	93
17 Morelos	1 762	143	204	2 109	90
18 Nayarit	1 777	43	178	1 998	91
19 Nuevo León	1 598	116	409	2 123	80
20 Oaxaca	1 705	27	198	1 930	90
21 Puebla	1 718	82	208	2 008	89
22 Querétaro	1 731	47	229	2 007	88
23 Quintana Roo	1 733	122	364	2 219	83
24 San Luis Potosí	1 776	77	198	2 051	90
25 Sinaloa	1 775	34	198	2 007	90
26 Sonora	1 797	97	168	2 062	91
27 Tabasco	1 800	50	161	2 011	92
28 Tamaulipas	1 643	119	305	2 067	84
29 Tlaxcala	1 829	52	129	2 010	93
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	1 869	37	109	2 015	94
31 Yucatán	1 732	92	312	2 136	85
32 Zacatecas	1 733	62	199	1 994	90
Nacional	55 907	2 262	7 378	65 547	88

Tasas de respuesta de individuo por estado

Entidad	Completas	No viviendas	No conseguidas	Total	Tasa Respuesta
01 Aguascalientes	1 857	--	209	2 066	90
02 Baja California	1 833	1	202	2 036	90
03 Baja California Sur	1 872	--	149	2 021	93
04 Campeche	1 722	--	342	2 064	83
05 Coahuila de Zaragoza	1 702	1	245	1 948	87
06 Colima	1 580	3	361	1 944	81
07 Chiapas	1 852	3	194	2 049	91
08 Chihuahua	1 714	2	264	1 980	87
09 Ciudad de México	1 724	1	186	1 911	90
10 Durango	1 886	--	204	2 090	90
11 Guanajuato	1 921	2	206	2 129	90
12 Guerrero	1 957	5	184	2 146	91
13 Hidalgo	1 732	2	384	2 118	82
14 Jalisco	1 593	2	413	2 008	79
15 México	1 716	2	308	2 026	85
16 Michoacán de Ocampo	1 893	2	134	2 029	93
17 Morelos	1 887	--	108	1 995	95
18 Nayarit	1 747	2	297	2 046	85
19 Nuevo León	1 595	1	355	1 951	82
20 Oaxaca	1 630	--	224	1 854	88
21 Puebla	1 630	1	328	1 959	83
22 Querétaro	1 776	3	293	2 072	86
23 Quintana Roo	1 652	2	468	2 122	78
24 San Luis Potosí	1 880	1	259	2 140	88
25 Sinaloa	1 854	3	154	2 011	92
26 Sonora	1 829	--	213	2 042	90
27 Tabasco	1 960	--	186	2 146	91
28 Tamaulipas	1 656	1	322	1 979	84
29 Tlaxcala	1 791	1	359	2 151	83
30 Veracruz de Ignacio de la Llave	1 867	1	217	2 085	90
31 Yucatán	1 699	--	414	2 113	80
32 Zacatecas	1 870	--	184	2 054	91
Nacional	56 877	42	8 366	65 285	87



ANEXO B: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2011, TRADICIONAL 2016 Y ENCODAT 2016-2017



ANEXO B: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2011, TRADICIONAL 2016 Y ENCODAT 2016-2017

En general el análisis extenso de los datos ha demostrado que los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional presentan las mismas conclusiones prácticas; como ejemplo, en las figuras siguientes se comparan las estimaciones de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida.

Figura 1. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Tabaco.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza




Figura 2. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Alcohol.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza






Figura 3. Estimación de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida de Drogas ilegales.
Las líneas representan al intervalo del 95% de confianza



La Figura 1 es compatible con la hipótesis de que no hay diferencias significativas (estadística $T=1.4$) entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional para la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida. La Figura 2 es compatible con la diferencia entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional (estadística $T=2.16$); pero al comparar las estimaciones (ENCODAT 2016 y Tradicional) con las estimaciones de la ENA 2011 no se sugieren conclusiones con consecuencias prácticas diferentes. La Figura 3 es compatible con la hipótesis de que no hay diferencias significativas (estadística $T=1.2$) entre las estimaciones de los cuestionarios ENCODAT 2016 y Tradicional para la prevalencia de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida. La afirmación general es que las estimaciones de los cuestionarios apoyan conclusiones con consecuencias prácticas iguales respecto a las políticas de salud pública.



ANEXO 1: TENDENCIAS DE DROGAS



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del consumo de cualquier droga en la población total
Consumo en el último año de cualquier droga en la población total
Consumo en el último mes de cualquier droga en la población total
Consumo de drogas y su relación con diversos indicadores sociodemográficos población de 12 a 25 años
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años según sexo
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada según sexo y edad (1)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada según sexo y edad (2)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada según sexo y edad (1)
Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada según sexo y edad (2)
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 12 a 17 años
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 18 a 25 años
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 26 a 34 años
Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 35 a 65 años
Población de 12 a 17 años que ha sido expuesta a la prevención
Usuarios de 12 a 65 años que se han inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo
Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según sexo en la población de 12 a 65 años (1)
Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población de 12 a 65 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población masculina
Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población femenina
Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según sexo
Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según edad
Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas
Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población masculina
Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población femenina
Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo
Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo en la población masculina
Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo en la población femenina
Edad de inicio del consumo de drogas
Proporción de usuarios que reportó iniciar su consumo antes de los 18 años
Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio del consumo de tabaco
Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio de alcohol
Factores sociodemográficos asociados con la primera oportunidad de usar drogas y la transición al uso, abuso y dependencia en el consumo de sustancias en la población de 12 a 25 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 12 a 65 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 18 a 34 años
Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de cualquier droga en la población total

Cuadro TD1

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	275 103	4.0	267 150	3.9	19 657	0.3	480 670	6.6	476 201	6.6	37 489	0.5
18-34	2 827 338	18.5	2 726 918	17.8	324 184	2.1	3 754 486	22.8	3 708 506	22.6	418 134	2.5
35-65	1 905 053	11.6	1 824 765	11.1	346 985	2.1	2 414 060	13.8	2 339 421	13.4	235 363	1.3
Subtotal	5 007 493	13.0	4 818 833	12.5	690 826	1.8	6 649 216	16.2	6 524 128	15.8	690 986	1.7
Mujeres												
12-17	172 053	2.6	127 885	1.9	51 024	0.8	430 847	6.1	412 686	5.8	48 025	0.7
18-34	755 409	4.6	643 738	3.9	223 172	1.4	1 344 346	7.6	1 230 863	7.0	243 559	1.4
35-65	300 325	1.7	154 886	0.9	148 732	0.8	357 807	1.8	257 392	1.3	114 651	0.6
Subtotal	1 227 788	3.0	926 509	2.3	422 928	1.0	2 133 000	4.8	1 900 941	4.3	406 235	0.9
Total	6 235 281	7.8	5 745 342	7.2	1 113 753	1.4	8 782 216	10.3	8 425 069	9.9	1 097 221	1.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo en el último año de cualquier droga en la población total

Cuadro TD2

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	146 556	2.2	146 556	2.2	11 705	0.2	249 354	3.4	248 438	3.4	19 753	0.3
18-34	715 280	4.7	635 084	4.1	100 819	0.7	1 345 676	8.2	1 282 180	7.8	181 349	1.1
35-65	284 024	1.7	233 650	1.4	93 996	0.6	319 137	1.8	281 457	1.6	47 190	0.3
Subtotal	1 145 859	3.0	1 015 290	2.6	206 520	0.5	1 914 168	4.6	1 812 075	4.4	248 292	0.6
Mujeres												
12-17	73 860	1.1	60 556	0.9	13 303	0.2	188 061	2.7	165 607	2.3	39 151	0.6
18-34	179 208	1.1	92 262	0.6	99 294	0.6	343 557	2.0	282 423	1.6	87 267	0.5
35-65	53 855	0.3	30 576	0.2	24 025	0.1	63 301	0.3	26 554	0.1	36 748	0.2
Subtotal	306 923	0.7	183 395	0.4	136 623	0.3	594 920	1.3	474 583	1.1	163 166	0.4
Total	1 452 782	1.8	1 198 685	1.5	343 143	0.4	2 509 088	2.9	2 286 658	2.7	411 458	0.5

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo en el último mes de cualquier droga en la población total

Cuadro TD3

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	104 822	1.5	102 919	1.5	8 194	0.1	122 092	1.7	121 599	1.7	6 663	0.1
18-34	395 830	2.6	344 449	2.2	63 615	0.4	787 977	4.8	758 974	4.6	87 579	0.5
35-65	167 911	1.0	145 614	0.9	43 490	0.3	205 990	1.2	177 836	1.0	35 803	0.2
Subtotal	668 562	1.7	592 983	1.5	115 299	0.3	1 116 059	2.7	1 058 410	2.6	130 045	0.3
Mujeres												
12-17	19 398	0.3	15 297	0.2	4 100	0.1	55 002	0.8	49 422	0.7	6 226	0.1
18-34	59 957	0.4	29 554	0.2	30 403	0.2	116 702	0.7	107 882	0.6	23 166	0.1
35-65	13 721	0.1	747	***	13 721	0.1	29 546	0.2	8 640	***	20 906	0.1
Subtotal	93 076	0.2	45 598	0.1	48 224	0.1	201 250	0.5	165 945	0.4	50 299	0.1
Total	761 638	1.0	638 581	0.8	163 523	0.2	1 317 310	1.5	1 224 354	1.4	180 344	0.2

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas y su relación con diversos indicadores sociodemográficos en la población de 12 a 25 años

Cuadro TD4

	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Situación Escolar												
Estudia actualmente	659 989	4.2	577 605	3.7	125 080	0.8	1 597 209	9.1	1 556 968	8.9	174 558	1.0
No estudia	1 598 834	11.4	1 498 936	10.7	198 392	1.4	2 355 181	16.4	2 324 180	16.2	243 574	1.7
Situación Laboral												
Trabaja	1 380 910	12.9	1 297 339	12.1	179 747	1.7	2 223 447	19.7	2 201 930	19.6	230 337	2.0
Ama de casa	194 020	4.0	168 393	3.5	28 307	0.6	408 848	8.5	398 529	8.3	51 359	1.1
Desempleado	683 893	4.8	610 809	4.3	115 417	0.8	1 320 094	8.4	1 280 689	8.1	136 437	0.9

Porcentajes de consumo de drogas según las variables sociodemográficas indicadas.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TD5

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011			2016								
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	38 507 813	41 113 398	79 621 211	41 168 617	44 093 441	85 262 058						
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	92 170	0.2	49 520	0.1	141 690	0.2	86 550	0.2	18 646	***	105 196	0.1
Tranquilizantes	461 325	1.2	255 386	0.6	716 710	0.9	464 571	1.1	296 319	0.7	760 890	0.9
Sedantes	84 204	0.2	47 553	0.1	131 757	0.2	60 387	0.1	23 685	0.1	84 072	0.1
Anfetaminas o estimulantes	250 156	0.6	125 844	0.3	376 000	0.5	202 294	0.5	100 587	0.2	302 881	0.4
Mariguana	4 080 083	10.6	671 902	1.6	4 751 985	6.0	5 750 046	14.0	1 624 149	3.7	7 374 195	8.6
Cocaína	2 288 314	5.9	302 216	0.7	2 590 530	3.3	2 542 342	6.2	463 089	1.1	3 005 431	3.5
Crack	752 870	2.0	55 302	0.1	808 172	1.0	635 671	1.5	100 832	0.2	736 503	0.9
Alucinógenos	435 235	1.1	120 697	0.3	555 932	0.7	408 421	1.0	174 289	0.4	582 710	0.7
Inhalables	595 632	1.5	131 494	0.3	727 126	0.9	704 107	1.7	245 994	0.6	950 101	1.1
Heroína, opio	173 276	0.4	5 404	***	178 680	0.2	140 570	0.3	4 812	***	145 382	0.2
Estimulantes tipo anfetamínico	482 653	1.3	168 717	0.4	651 371	0.8	565 974	1.4	177 463	0.4	743 437	0.9
Otras drogas	--	--	2 141	***	2 141	***	6 634	***	10 742	***	17 376	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	191 955	0.5	34 937	0.1	226 893	0.3
Cualquier droga	5 007 493	13.0	1 227 788	3.0	6 235 281	7.8	6 649 216	16.2	2 133 000	4.8	8 782 216	10.3
Drogas ilegales	4 818 833	12.5	926 509	2.3	5 745 342	7.2	6 524 128	15.8	1 900 941	4.3	8 425 069	9.9
Drogas médicas	690 826	1.8	422 928	1.0	1 113 753	1.4	690 986	1.7	406 235	0.9	1 097 221	1.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD5A

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	29 754 276		15 388 877		34 478 059		31 861 406		16 499 064		36 901 588	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	65 599	0.2	11 737	0.1	64 354	0.2	41 788	0.1	35 443	0.2	27 965	0.1
Tranquilizantes	172 782	0.6	240 404	1.6	303 524	0.9	270 797	0.8	250 654	1.5	239 440	0.6
Sedantes	58 525	0.2	9 581	0.1	63 651	0.2	41 252	0.1	16 285	0.1	26 535	0.1
Anfetaminas o estimulantes	85 754	0.3	120 968	0.8	169 278	0.5	123 942	0.4	85 240	0.5	93 699	0.3
Mariguana	1 749 808	5.9	1 338 613	8.7	1 663 564	4.8	3 460 641	10.9	1 652 285	10.0	2 261 269	6.1
Cocaína	793 175	2.7	947 925	6.2	849 429	2.5	1 017 205	3.2	896 656	5.4	1 091 570	3.0
Crack	252 220	0.8	352 048	2.3	203 905	0.6	289 885	0.9	229 225	1.4	217 393	0.6
Alucinógenos	203 909	0.7	226 147	1.5	125 877	0.4	307 312	1.0	131 771	0.8	143 628	0.4
Inhalables	328 504	1.1	212 536	1.4	186 086	0.5	536 295	1.7	202 612	1.2	211 194	0.6
Heroína, opio	21 460	0.1	80 961	0.5	76 259	0.2	51 769	0.2	49 844	0.3	43 768	0.1
Estimulantes tipo anfetamínico	282 235	0.9	234 571	1.5	134 564	0.4	367 996	1.2	236 020	1.4	139 421	0.4
Otras drogas	2 141	***	--	--	--	--	11 760	***	1 515	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	195 475	0.6	17 151	0.1	14 267	***
Cualquier droga	2 258 824	7.6	1 771 079	11.5	2 205 378	6.4	3 952 390	12.4	2 057 959	12.5	2 771 867	7.5
Drogas ilegales	2 076 541	7.0	1 689 150	11.0	1 979 651	5.7	3 881 149	12.2	1 947 106	11.8	2 596 813	7.0
Drogas médicas	323 472	1.1	294 565	1.9	495 716	1.4	418 133	1.3	329 074	2.0	350 014	0.9

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD5B

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	14 981 318		7 148 067		16 378 428		16 202 664		7 482 282		17 483 670	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	30 706	0.2	9 907	0.1	51 557	0.3	36 447	0.2	32 938	0.4	17 165	0.1
Tranquilizantes	70 636	0.5	158 506	2.2	232 183	1.4	160 953	1.0	141 277	1.9	162 342	0.9
Sedantes	14 600	0.1	6 600	0.1	63 004	0.4	26 623	0.2	12 153	0.2	21 611	0.1
Anfetaminas o estimulantes	54 865	0.4	103 331	1.4	91 960	0.6	91 834	0.6	46 362	0.6	64 098	0.4
Mariguana	1 361 082	9.1	1 174 145	16.4	1 544 857	9.4	2 347 487	14.5	1 360 138	18.2	2 042 421	11.7
Cocaína	663 579	4.4	832 858	11.7	791 876	4.8	759 074	4.7	775 250	10.4	1 008 018	5.8
Crack	222 040	1.5	330 259	4.6	200 571	1.2	227 083	1.4	199 546	2.7	209 042	1.2
Alucinógenos	119 388	0.8	192 933	2.7	122 915	0.8	201 479	1.2	87 242	1.2	119 700	0.7
Inhalables	222 581	1.5	201 027	2.8	172 025	1.1	322 417	2.0	189 506	2.5	192 184	1.1
Heroína, opio	16 638	0.1	80 379	1.1	76 259	0.5	49 661	0.3	47 140	0.6	43 768	0.3
Estimulantes tipo anfetamínico	204 124	1.4	167 303	2.3	111 226	0.7	240 714	1.5	201 466	2.7	123 795	0.7
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	1 018	***	1 515	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	163 239	1.0	14 449	0.2	14 267	0.1
Cualquier droga	1 683 070	11.2	1 419 370	19.9	1 905 053	11.6	2 618 584	16.2	1 616 571	21.6	2 414 060	13.8
Drogas ilegales	1 599 774	10.7	1 394 294	19.5	1 824 765	11.1	2 591 655	16.0	1 593 052	21.3	2 339 421	13.4
Drogas médicas	151 792	1.0	192 049	2.7	346 985	2.1	272 839	1.7	182 784	2.4	235 363	1.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD5C

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	14 772 957		8 240 810		18 099 630		15 658 742		9 016 781		19 417 917	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	34 894	0.2	1 829	***	12 797	0.1	5 341	***	2 505	***	10 801	0.1
Tranquilizantes	102 146	0.7	81 899	1.0	71 341	0.4	109 843	0.7	109 377	1.2	77 099	0.4
Sedantes	43 926	0.3	2 981	***	646	***	14 629	0.1	4 132	***	4 924	***
Anfetaminas o estimulantes	30 889	0.2	17 637	0.2	77 318	0.4	32 108	0.2	38 878	0.4	29 601	0.2
Mariguana	388 726	2.6	164 469	2.0	118 707	0.7	1 113 154	7.1	292 147	3.2	218 848	1.1
Cocaína	129 596	0.9	115 067	1.4	57 553	0.3	258 131	1.6	121 406	1.3	83 552	0.4
Crack	30 180	0.2	21 789	0.3	3 334	***	62 802	0.4	29 679	0.3	8 351	***
Alucinógenos	84 520	0.6	33 214	0.4	2 962	***	105 832	0.7	44 529	0.5	23 928	0.1
Inhalables	105 924	0.7	11 509	0.1	14 061	0.1	213 877	1.4	13 106	0.1	19 010	0.1
Heroína, opio	4 822	***	582	***	--	--	2 108	***	2 704	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	78 111	0.5	67 269	0.8	23 338	0.1	127 283	0.8	34 554	0.4	15 626	0.1
Otras drogas	2 141	***	--	--	--	--	10 742	0.1	--	--	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	32 236	0.2	2 702	***	--	--
Cualquier droga	575 753	3.9	351 709	4.3	300 325	1.7	1 333 805	8.5	441 388	4.9	357 807	1.8
Drogas ilegales	476 767	3.2	294 856	3.6	154 886	0.9	1 289 494	8.2	354 055	3.9	257 392	1.3
Drogas médicas	171 679	1.2	102 516	1.2	148 732	0.8	145 294	0.9	146 290	1.6	114 651	0.6

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD5D

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	13 437 575		31 705 578		34 478 059		14 335 079		34 025 391		36 901 588	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	13 834	0.1	63 502	0.2	64 354	0.2	13 758	0.1	63 473	0.2	27 965	0.1
Tranquilizantes	58 252	0.4	354 935	1.1	303 524	0.9	62 500	0.4	458 950	1.3	239 440	0.6
Sedantes	7 696	0.1	60 411	0.2	63 651	0.2	12 018	0.1	45 519	0.1	26 535	0.1
Anfetaminas o estimulantes	4 085	***	202 637	0.6	169 278	0.5	18 092	0.1	191 090	0.6	93 699	0.3
Mariguana	322 596	2.4	2 765 825	8.7	1 663 564	4.8	761 888	5.3	4 351 038	12.8	2 261 269	6.1
Cocaína	98 200	0.7	1 642 901	5.2	849 429	2.5	154 116	1.1	1 759 745	5.2	1 091 570	3.0
Crack	14 954	0.1	589 314	1.9	203 905	0.6	54 338	0.4	464 772	1.4	217 393	0.6
Alucinógenos	15 989	0.1	414 066	1.3	125 877	0.4	46 375	0.3	392 708	1.2	143 628	0.4
Inhalables	125 657	0.9	415 383	1.3	186 086	0.5	190 148	1.3	548 759	1.6	211 194	0.6
Heroína, opio	2 680	***	99 740	0.3	76 259	0.2	5 491	***	96 122	0.3	43 768	0.1
Estimulantes tipo anfetamínico	38 484	0.3	478 322	1.5	134 564	0.4	85 900	0.6	518 116	1.5	139 421	0.4
Otras drogas	--	--	2 141	***	--	--	1 005	***	12 270	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	54 339	0.4	158 287	0.5	14 267	***
Cualquier droga	447 156	3.3	3 582 747	11.3	2 205 378	6.4	911 517	6.4	5 098 832	15.0	2 771 867	7.5
Drogas ilegales	395 035	2.9	3 370 656	10.6	1 979 651	5.7	888 887	6.2	4 939 369	14.5	2 596 813	7.0
Drogas médicas	70 682	0.5	547 356	1.7	495 716	1.4	85 514	0.6	661 693	1.9	350 014	0.9

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD5E

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	6 807 478		15 321 907		16 378 428		7 247 914		16 437 032		17 483 670	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	3 041	***	37 571	0.2	51 557	0.3	9 046	0.1	60 339	0.4	17 165	0.1
Tranquilizantes	16 616	0.2	212 526	1.4	232 183	1.4	25 436	0.4	276 794	1.7	162 342	0.9
Sedantes	6 292	0.1	14 908	0.1	63 004	0.4	5 262	0.1	33 513	0.2	21 611	0.1
Anfetaminas o estimulantes	--	--	158 196	1.0	91 960	0.6	3 901	0.1	134 294	0.8	64 098	0.4
Mariguana	236 114	3.5	2 299 113	15.0	1 544 857	9.4	422 035	5.8	3 285 590	20.0	2 042 421	11.7
Cocaína	51 643	0.8	1 444 795	9.4	791 876	4.8	73 081	1.0	1 461 244	8.9	1 008 018	5.8
Crack	11 387	0.2	540 911	3.5	200 571	1.2	27 987	0.4	398 641	2.4	209 042	1.2
Alucinógenos	5 283	0.1	307 038	2.0	122 915	0.8	27 767	0.4	260 954	1.6	119 700	0.7
Inhalables	72 356	1.1	351 252	2.3	172 025	1.1	86 967	1.2	424 957	2.6	192 184	1.1
Heroína, opio	--	--	97 017	0.6	76 259	0.5	3 383	***	93 418	0.6	43 768	0.3
Estimulantes tipo anfetamínico	21 543	0.3	349 883	2.3	111 226	0.7	30 189	0.4	411 990	2.5	123 795	0.7
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	2 178	***	4 101	***
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	34 171	0.5	143 517	0.9	14 267	0.1
Cualquier droga	275 103	4.0	2 827 338	18.5	1 905 053	11.6	480 670	6.6	3 754 486	22.8	2 414 060	13.8
Drogas ilegales	267 150	3.9	2 726 918	17.8	1 824 765	11.1	476 201	6.6	3 708 506	22.6	2 339 421	13.4
Drogas médicas	19 657	.3	324 184	2.1	346 985	2.1	37 489	0.5	418 134	2.5	235 363	1.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD5F

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	6 630 096		16 383 671		18 099 630		7 087 165		17 588 359		19 417 917	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	10 793	0.2	25 930	0.2	12 797	0.1	4 712	0.1	3 134	***	10 801	0.1
Tranquilizantes	41 636	0.6	142 408	0.9	71 341	0.4	37 065	0.5	182 156	1.0	77 099	0.4
Sedantes	1 404	***	45 503	0.3	646	***	6 756	0.1	12 005	0.1	4 924	***
Anfetaminas o estimulantes	4 085	0.1	44 441	0.3	77 318	0.4	14 191	0.2	56 796	0.3	29 601	0.2
Mariguana	86 483	1.3	466 712	2.8	118 707	0.7	339 853	4.8	1 065 448	6.1	218 848	1.1
Cocaína	46 557	0.7	198 106	1.2	57 553	0.3	81 036	1.1	298 501	1.7	83 552	0.4
Crack	3 567	0.1	48 402	0.3	3 334	***	26 351	0.4	66 130	0.4	8 351	***
Alucinógenos	10 706	0.2	107 028	0.7	2 962	***	18 608	0.3	131 754	0.7	23 928	0.1
Inhalables	53 301	0.8	64 131	0.4	14 061	0.1	103 181	1.5	123 802	0.7	19 010	0.1
Heroína, opio	2 680	***	2 723	***	--	--	2 108	***	2 704	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	16 941	0.3	128 439	0.8	23 338	0.1	55 711	0.8	106 126	0.6	15 626	0.1
Otras drogas	--	--	2 141	***	--	--	651	***	10 091	0.1	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	--	--	20 168	0.3	14 769	0.1	--	--
Cualquier droga	172 053	2.6	755 409	4.6	300 325	1.7	430 847	6.1	1 344 346	7.6	357 807	1.8
Drogas ilegales	127 885	1.9	643 738	3.9	154 886	0.9	412 686	5.8	1 230 863	7.0	257 392	1.3
Drogas médicas	51 024	0.8	223 172	1.4	148 732	0.8	48 025	0.7	243 559	1.4	114 651	0.6

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TD6

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	38 507 813		41 113 398		79 621 211		41 168 617		44 093 441		85 262 058	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	4 769	***	4 769	***	21 043	0.1	4 162	***	25 205	***
Tranquilizantes	118 642	0.3	93 336	0.2	211 978	0.3	137 894	0.3	118 566	0.3	256 460	0.3
Sedantes	15 022	***	15 329	***	30 351	***	28 217	0.1	8 090	***	36 307	***
Anfetaminas o estimulantes	75 057	0.2	29 584	0.1	104 641	0.1	103 279	0.3	53 832	0.1	157 112	0.2
Mariguana	842 039	2.2	120 421	0.3	962 460	1.2	1 421 056	3.5	400 565	0.9	1 821 621	2.1
Cocaína	355 654	0.9	40 252	0.1	395 906	0.5	573 236	1.4	110 013	0.2	683 248	0.8
Crack	83 586	0.2	6 388	***	89 974	0.1	117 608	0.3	32 512	0.1	150 120	0.2
Alucinógenos	53 812	0.1	8 025	***	61 838	0.1	87 954	0.2	48 097	0.1	136 050	0.2
Inhalables	77 369	0.2	19 361	***	96 730	0.1	161 807	0.4	50 039	0.1	211 846	0.2
Heroína, opio	10 694	***	--	--	10 694	***	21 830	0.1	1 421	***	23 251	***
Estimulantes tipo anfetamínico	86 386	0.2	33 451	0.1	119 837	0.2	160 734	0.4	46 872	0.1	207 606	0.2
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	248	***	602	***
Cualquier droga	1 145 859	3.0	306 923	0.7	1 452 782	1.8	1 914 168	4.6	594 920	1.3	2 509 088	2.9
Drogas ilegales	1 015 290	2.6	183 395	0.4	1 198 685	1.5	1 812 075	4.4	474 583	1.1	2 286 658	2.7
Drogas médicas	206 520	0.5	136 623	0.3	343 143	0.4	248 292	0.6	163 166	0.4	411 458	0.5

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD6A

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	29 754 276		15 388 877		34 478 059		31 861 406		16 499 064		36 901 588	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	***	--	--	--	--	15 437	***	4 507	***	5 261	***
Tranquilizantes	79 151	0.3	49 471	0.3	83 356	0.2	104 465	0.3	96 177	0.6	55 818	0.2
Sedantes	12 887	***	2 981	***	14 482	***	19 104	0.1	5 963	***	11 240	***
Anfetaminas o estimulantes	57 513	0.2	19 294	0.1	27 834	0.1	89 070	0.3	40 933	0.2	27 109	0.1
Mariguana	590 079	2.0	177 403	1.2	194 978	0.6	1 272 904	4.0	301 235	1.8	247 482	0.7
Cocaína	213 647	0.7	90 929	0.6	91 330	0.3	420 303	1.3	162 215	1.0	100 731	0.3
Crack	49 112	0.2	24 436	0.2	16 426	***	108 602	0.3	22 808	0.1	18 710	0.1
Alucinógenos	59 829	0.2	--	--	2 009	***	101 966	0.3	26 760	0.2	7 325	***
Inhalables	87 186	0.3	3 050	***	6 495	***	169 918	0.5	25 962	0.2	15 966	***
Heroína, opio	4 861	***	--	--	5 833	***	17 474	0.1	1 173	***	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	64 898	0.2	9 640	0.1	45 299	0.1	124 126	0.4	58 618	0.4	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	602	***	--	--	--	--
Cualquier droga	815 621	2.7	299 282	1.9	337 878	1.0	1 617 802	5.1	508 847	3.1	382 439	1.0
Drogas ilegales	701 866	2.4	232 593	1.5	264 226	0.8	1 546 934	4.9	431 714	2.6	308 011	0.8
Drogas médicas	153 375	0.5	71 746	0.5	118 021	0.3	199 794	0.6	127 726	0.8	83 938	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD6B

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	14 981 318		7 148 067		16 378 428		16 202 664		7 482 282		17 483 670	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	--	--	--	--	13 462	0.1	3 184	***	4 397	***
Tranquilizantes	39 049	0.3	19 515	0.3	60 078	0.4	61 605	0.4	49 781	0.7	26 508	0.2
Sedantes	540	***	--	--	14 482	0.1	13 905	0.1	5 963	0.1	8 349	***
Anfetaminas o estimulantes	44 215	0.3	10 150	0.1	20 692	0.1	62 280	0.4	23 340	0.3	17 659	0.1
Mariguana	483 746	3.2	171 135	2.4	187 158	1.1	945 140	5.8	250 495	3.3	225 421	1.3
Cocaína	179 422	1.2	90 929	1.3	85 304	0.5	333 764	2.1	144 078	1.9	95 393	0.5
Crack	42 724	0.3	24 436	0.3	16 426	.1	79 326	0.5	20 586	0.3	17 696	0.1
Alucinógenos	51 804	0.3	--	--	2 009	***	61 685	0.4	18 944	0.3	7 325	***
Inhalables	67 825	0.5	3 050	***	6 495	***	119 879	0.7	25 962	0.3	15 966	0.1
Heroína, opio	4 861	***	--	--	5 833	***	17 227	0.1	--	--	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	54 203	0.4	9 640	0.1	22 543	0.1	87 694	0.5	48 178	0.6	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	--	--	--	--
Cualquier droga	610 903	4.1	250 933	3.5	284 024	1.7	1 198 414	7.4	396 616	5.3	319 137	1.8
Drogas ilegales	555 315	3.7	226 325	3.2	233 650	1.4	1 164 658	7.2	365 960	4.9	281 457	1.6
Drogas médicas	82 859	0.6	29 665	0.4	93 996	0.6	131 438	0.8	69 664	0.9	47 190	0.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD6C

Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N por subgrupo	14 772 957		8 240 810		18 099 630		15 658 742		9 016 781		19 417 917	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	***	--	--	--	--	1 975	***	1 323	***	864	***
Tranquilizantes	40 102	0.3	29 956	0.4	23 278	0.1	42 860	0.3	46 396	0.5	29 310	0.2
Sedantes	12 348	0.1	2 981	***	--	--	5 198	***	--	--	2 892	***
Anfetaminas o estimulantes	13 298	0.1	9 145	0.1	7 142	***	26 790	0.2	17 593	0.2	9 450	***
Mariguana	106 333	0.7	6 268	0.1	7 820	***	327 764	2.1	50 740	0.6	22 060	0.1
Cocaína	34 226	0.2	--	--	6 026	***	86 538	0.6	18 136	0.2	5 338	***
Crack	6 388	***	--	--	--	--	29 276	0.2	2 222	***	1 014	***
Alucinógenos	8 025	0.1	--	--	--	--	40 281	0.3	7 815	0.1	--	--
Inhalables	19 361	0.1	--	--	--	--	50 039	0.3	--	--	--	--
Heroína, opio	--	--	--	--	--	--	248	***	1 173	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	10 695	0.1	--	--	22 756	0.1	36 433	0.2	10 439	0.1	--	--
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	248	***	--	--	--	--
Cualquier droga	204 719	1.4	48 349	0.6	53 855	0.3	419 388	2.7	112 230	1.2	63 301	0.3
Drogas ilegales	146 550	1.0	6 268	0.1	30 576	0.2	382 275	2.4	65 754	0.7	26 554	0.1
Drogas médicas	70 516	0.5	42 081	0.5	24 025	0.1	68 356	0.4	58 062	0.6	36 748	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD6D

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	13 437 575		31 705 578		34 478 059		14 335 079		34 025 391		36 901 588	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	***	--	--	--	--	4 816	***	15 127	***	5 261	***
Tranquilizantes	18 835	0.1	109 787	0.3	83 356	0.2	39 168	0.3	161 474	0.5	55 818	0.2
Sedantes	--	--	15 868	0.1	14 482	***	9 895	0.1	15 171	***	11 240	***
Anfetaminas o estimulantes	1 404	***	75 403	0.2	27 834	0.1	15 261	0.1	114 742	0.3	27 109	0.1
Mariguana	178 096	1.3	589 387	1.9	194 978	0.6	373 032	2.6	1 201 107	3.5	247 482	0.7
Cocaína	53 833	0.4	250 743	0.8	91 330	0.3	84 636	0.6	497 882	1.5	100 731	0.3
Crack	--	--	73 548	0.2	16 426	***	38 206	0.3	93 205	0.3	18 710	0.1
Alucinógenos	11 468	0.1	48 361	0.2	2 009	***	24 545	0.2	104 181	0.3	7 325	***
Inhalables	44 615	0.3	45 620	0.1	6 495	***	82 299	0.6	113 582	0.3	15 966	***
Heroína, opio	--	--	4 861	***	5 833	***	3 089	***	15 558	***	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	14 732	0.1	59 805	0.2	45 299	0.1	34 419	0.2	148 325	0.4	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	602	***	--	--	--	--
Cualquier droga	220 416	1.6	894 488	2.8	337 878	1.0	437 415	3.1	1 689 233	5.0	382 439	1.0
Drogas ilegales	207 113	1.5	727 346	2.3	264 226	0.8	414 045	2.9	1 564 603	4.6	308 011	0.8
Drogas médicas	25 008	0.2	200 113	0.6	118 021	0.3	58 904	0.4	268 616	0.8	83 938	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD6E

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	6 807 478		15 321 907		16 378 428		7 247 914		16 437 032		17 483 670	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	--	--	--	--	--	--	2 842	***	13 805	0.1	4 397	***
Tranquilizantes	11 705	0.2	46 860	0.3	60 078	0.4	12 214	0.2	99 172	0.6	26 508	0.2
Sedantes	--	--	540	***	14 482	0.1	4 697	0.1	15 171	0.1	8 349	***
Anfetaminas o estimulantes	--	--	54 365	0.4	20 692	0.1	1 771	***	83 850	0.5	17 659	0.1
Mariguana	137 451	2.0	517 431	3.4	187 158	1.1	224 219	3.1	971 416	5.9	225 421	1.3
Cocaína	25 995	0.4	244 355	1.6	85 304	0.5	44 793	0.6	433 050	2.6	95 393	0.5
Crack	--	--	67 160	0.4	16 426	0.1	20 237	0.3	79 675	0.5	17 696	0.1
Alucinógenos	3 442	0.1	48 361	0.3	2 009	***	18 324	0.3	62 305	0.4	7 325	***
Inhalables	37 602	0.6	33 273	0.2	6 495	***	43 904	0.6	101 937	0.6	15 966	0.1
Heroína, opio	--	--	4 861	***	5 833	***	2 842	***	14 385	0.1	4 603	***
Estimulantes tipo anfetamínico	5 608	0.1	58 235	0.4	22 543	0.1	14 573	0.2	121 300	0.7	24 861	0.1
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	354	***	--	--	--	--
Cualquier droga	146 556	2.2	715 280	4.7	284 024	1.7	249 354	3.4	1 345 676	8.2	319 137	1.8
Drogas ilegales	146 556	2.2	635 084	4.1	233 650	1.4	248 438	3.4	1 282 180	7.8	281 457	1.6
Drogas médicas	11 705	0.2	100 819	0.7	93 996	0.6	19 753	0.3	181 349	1.1	47 190	0.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD6F

N por subgrupo Drogas	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	6 630 096		16 383 671		18 099 630		7 087 165		17 588 359		19 417 917	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	4 769	0.1	--	--	--	--	1 975	***	1 323	***	864	***
Tranquilizantes	7 130	0.1	62 927	0.4	23 278	0.1	26 953	0.4	62 302	0.4	29 310	0.2
Sedantes	--	--	15 329	0.1	--	--	5 198	0.1	--	--	2 892	***
Anfetaminas o estimulantes	1 404	***	21 038	0.1	7 142	***	13 491	0.2	30 892	0.2	9 450	***
Mariguana	40 645	0.6	71 956	0.4	7 820	***	148 813	2.1	229 691	1.3	22 060	0.1
Cocaína	27 838	0.4	6 388	***	6 026	***	39 843	0.6	64 832	0.4	5 338	***
Crack	--	--	6 388	***	--	--	17 969	0.3	13 530	0.1	1 014	***
Alucinógenos	8 025	0.1	--	--	--	--	6 221	0.1	41 876	0.2	--	--
Inhalables	7 013	0.1	12 348	0.1	--	--	38 395	0.5	11 645	0.1	--	--
Heroína, opio	--	--	--	--	--	--	248	***	1 173	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	9 124	0.1	1 570	***	22 756	0.1	19 846	0.3	27 025	0.2	--	--
Otras drogas	--	--	--	--	--	--	248	***	--	--	--	--
Cualquier droga	73 860	1.1	179 208	1.1	53 855	0.3	188 061	2.7	343 557	2.0	63 301	0.3
Drogas ilegales	60 556	0.9	92 262	0.6	30 576	0.2	165 607	2.3	282 423	1.6	26 554	0.1
Drogas médicas	13 303	0.2	99 294	0.6	24 025	0.1	39 151	0.6	87 267	0.5	36 748	0.2

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD7

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-17	1 329 561	19.5	550 464	8.1	1 515 499	20.9	699 189	9.6
18-34	6 660 964	43.5	2 800 340	18.3	7 011 788	42.7	3 612 466	22.0
35-65	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4	5 634 224	32.2	2 204 357	12.6
Subtotal	13 441 813	34.9	5 223 197	13.6	14 161 511	34.4	6 516 013	15.8
Mujeres								
12-17	796 894	12.0	211 318	3.2	1 174 998	16.6	436 096	6.2
18-34	2 080 602	12.7	558 342	3.4	2 996 075	17.0	1 198 493	6.8
35-65	672 641	3.7	120 695	0.7	1 217 968	6.3	396 093	2.0
Subtotal	3 550 137	8.6	890 355	2.2	5 389 041	12.2	2 030 682	4.6
Total	16 991 950	21.3	6 113 552	7.7	19 550 552	22.9	8 546 694	10.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada
según sexo y edad

Cuadro TD8

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-25	4 994 872	33.3	2 133 507	14.2	5 542 601	34.2	2 815 229	17.4
26-34	2 995 653	41.9	1 217 297	17.0	2 984 686	39.9	1 496 426	20.0
35-65	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4	5 634 224	32.2	2 204 357	12.6
Subtotal	13 441 813	34.9	5 223 197	13.6	14 161 511	34.4	6 516 013	15.8
Mujeres								
12-25	2 143 319	14.5	576 149	3.9	3 060 959	19.5	1 283 887	8.2
26-34	734 178	8.9	193 511	2.3	1 110 113	12.3	350 701	3.9
35-65	672 641	3.7	120 695	0.7	1 217 968	6.3	396 093	2.0
Subtotal	3 550 137	8.6	890 355	2.2	5 389 041	12.2	2 030 682	4.6
Total	16 991 950	21.3	6 113 552	7.7	19 550 552	22.9	8 546 694	10.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD9

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada		Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-17	1 440 008	21.2	632 331	9.3	1 595 395	22.0	745 796	10.3
18-34	7 105 620	46.4	3 105 624	20.3	7 503 472	45.6	4 001 928	24.3
35-65	5 728 205	35.0	2 152 401	13.1	6 040 500	34.5	2 431 106	13.9
Subtotal	14 273 833	37.1	5 890 356	15.3	15 139 367	36.8	7 178 829	17.4
Mujeres								
12-17	846 317	12.8	232 214	3.5	1 230 278	17.4	480 455	6.8
18-34	2 415 836	14.7	699 169	4.3	3 340 005	19.0	1 314 961	7.5
35-65	744 447	4.1	139 970	0.8	1 347 380	6.9	428 271	2.2
Subtotal	4 006 600	9.7	1 071 354	2.6	5 917 663	13.4	2 223 688	5.0
Total	18 280 433	23.0	6 961 710	8.7	21 057 030	24.7	9 402 517	11.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD10

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada		Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-25	5 273 577	35.2	2 333 456	15.6	5 856 861	36.1	3 058 662	18.9
26-34	3 272 052	45.8	1 404 499	19.6	3 242 006	43.3	1 689 062	22.6
35-65	5 728 205	35.0	2 152 401	13.1	6 040 500	34.5	2 431 106	13.9
Subtotal	14 273 833	37.1	5 890 356	15.3	15 139 367	36.8	7 178 829	17.4
Mujeres								
12-25	2 401 734	16.3	689 282	4.7	3 267 392	20.9	1 378 790	8.8
26-34	860 420	10.4	242 101	2.9	1 302 891	14.4	416 626	4.6
35-65	744 447	4.1	139 970	0.8	1 347 380	6.9	428 271	2.2
Subtotal	4 006 600	9.7	1 071 354	2.6	5 917 663	13.4	2 223 688	5.0
Total	18 280 433	23.0	6 961 710	8.7	21 057 030	24.7	9 402 517	11.0

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TD11

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	1 329 561	19.5	550 464	8.1	1 515 499	20.9	699 189	9.6
Mujeres	796 894	12.0	211 318	3.2	1 174 998	16.6	436 096	6.2
Situación Escolar								
Estudiante	1 533 019	14.0	557 179	5.1	2 048 370	17.4	843 327	7.2
No estudiante	593 436	23.8	204 603	8.2	642 126	24.9	291 958	11.3
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	191 512	6.1	56 881	1.8	296 940	9.3	107 869	3.4
Secundaria	1 131 974	14.9	352 504	4.6	1 501 782	18.7	632 561	7.9
Bachillerato o Equivalente	802 969	30.1	352 397	13.2	882 309	28.8	391 922	12.8

Porcentajes obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 18 a 25 años

Cuadro TD12

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	3 665 311	44.8	1 583 043	19.4	4 027 102	45.0	2 116 040	23.6
Mujeres	1 346 425	16.5	364 831	4.5	1 885 962	22.0	847 792	9.9
Situación Escolar								
Estudiante	1 621 060	34.2	710 113	15.0	2 256 337	39.4	1 142 942	19.9
No estudiante	3 390 676	29.3	1 237 761	10.7	3 656 727	31.0	1 820 889	15.4
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	316 045	17.7	102 438	5.7	277 490	21.0	145 620	11.0
Secundaria	1 365 060	27.7	597 498	12.1	1 477 606	31.5	746 525	15.9
Bachillerato o Equivalente	2 183 447	35.1	831 841	13.4	2 702 731	35.7	1 350 880	17.8
Licenciatura	1 127 556	34.8	406 223	12.5	1 415 462	37.3	706 428	18.6
Posgrado	9 874	21.5	9 874	21.5	23 981	59.3	6 436	15.9
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	3 239 691	38.7	1 360 623	16.3	3 652 047	41.2	1 832 017	20.7
Ama de casa	476 355	12.5	107 111	2.8	617 421	16.2	266 376	7.0
Desempleado	1 295 689	31.3	480 140	11.6	1 643 596	33.9	865 438	17.8
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 618 552	24.1	560 106	8.4	3 186 104	30.8	1 531 942	14.8
De 3 a 6 salarios mínimos	1 962 893	36.3	742 648	13.7	1 912 689	38.9	980 880	20.0
Más de 6 salarios mínimos	356 496	50.3	231 977	32.7	270 334	42.0	151 527	23.6
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	1 358 096	23.9	500 788	8.8	1 489 086	26.2	787 862	13.9
Separado/Viudo/Divorciado	90 837	43.7	12 972	6.2	137 585	39.4	32 706	9.4
Soltero	3 562 804	34.2	1 434 114	13.8	4 286 393	37.3	2 143 263	18.6

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TD13

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	2 995 653	41.9	1 217 297	17.0	2 984 686	39.9	1 496 426	20.0
Mujeres	734 178	8.9	193 511	2.3	1 110 113	12.3	350 701	3.9
Situación Escolar								
Estudiante	188 412	25.9	40 898	5.6	293 285	33.3	141 102	16.0
No estudiante	3 541 419	24.2	1 369 909	9.3	3 801 515	24.3	1 706 026	10.9
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	645 558	20.8	264 025	8.5	491 812	20.2	247 708	10.2
Secundaria	1 379 941	25.5	437 267	8.1	1 355 080	23.7	626 530	10.9
Bachillerato o Equivalente	970 686	25.8	391 675	10.4	1 205 245	24.8	541 745	11.2
Licenciatura	688 262	25.7	298 800	11.2	932 302	30.5	368 235	12.0
Posgrado	37 990	13.8	18 145	6.6	65 524	30.5	46 647	21.7
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	3 107 306	31.7	1 189 533	12.1	3 294 419	31.8	1 547 384	14.9
Ama de casa	316 807	6.8	87 896	1.9	539 151	10.0	163 468	3.0
Desempleado	305 718	33.0	133 379	14.4	261 230	35.7	136 275	18.6
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 325 979	20.5	486 409	7.5	2 270 363	22.8	1 007 484	10.1
De 3 a 6 salarios mínimos	1 432 059	27.2	549 392	10.4	1 340 347	29.3	602 144	13.2
Más de 6 salarios mínimos	371 926	41.5	152 997	17.1	160 979	32.5	118 275	23.9
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	2 406 946	22.2	785 986	7.3	2 373 099	21.3	1 081 833	9.7
Separado/Viudo/Divorciado	166 126	23.1	84 366	11.7	253 811	33.0	103 656	13.5
Soltero	1 156 759	30.2	540 455	14.1	1 467 890	32.0	661 638	14.4

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a drogas por características sociodemográficas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TD14

Características sociodemográficas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4	5 634 224	32.2	2 204 357	12.6
Mujeres	672 641	3.7	120 695	0.7	1 217 968	6.3	396 093	2.0
Situación Escolar								
Estudiante	189 963	24.7	49 045	6.4	228 228	25.2	120 736	13.3
No estudiante	5 933 966	17.6	1 944 043	5.8	6 623 965	18.4	2 479 714	6.9
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	1 907 872	14.8	634 345	4.9	2 001 235	16.1	732 007	5.9
Secundaria	1 795 378	19.4	498 249	5.4	2 324 372	20.1	858 624	7.4
Bachillerato o Equivalente	1 200 947	21.8	447 789	8.1	1 278 335	20.2	492 962	7.8
Licenciatura	930 474	20.5	333 351	7.4	956 514	21.9	395 909	9.0
Posgrado	134 164	18.8	33 786	4.7	100 921	20.3	40 885	8.2
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	5 267 721	25.1	1 766 590	8.4	5 614 907	24.3	2 135 551	9.3
Ama de casa	217 517	2.1	37 720	0.4	539 478	4.8	142 304	1.3
Desempleado	638 691	21.7	188 779	6.4	697 807	26.7	322 595	12.4
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	2 158 408	14.1	742 480	4.9	3 878 516	17.7	1 393 265	6.4
De 3 a 6 salarios mínimos	2 657 135	22.9	841 431	7.3	2 108 091	21.1	846 755	8.5
Más de 6 salarios mínimos	546 064	26.4	202 989	9.8	299 075	24.1	115 456	9.3
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	4 928 402	18.2	1 510 305	5.6	5 293 578	18.6	1 933 434	6.8
Separado/Viudo/Divorciado	597 006	15.9	179 328	4.8	761 268	16.4	309 237	6.7
Soltero	598 521	16.8	303 456	8.5	797 346	21.1	357 779	9.5

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Población de 12 a 17 años que ha sido expuesta a la prevención

Cuadro TD15

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	Usuario experimental		Usuario regular		No usuario		Usuario experimental		Usuario regular		No usuario	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
Con prevención	10 102	0.3	9 221	0.3	3 180 607	99.4	109 374	2.9	24 877	0.6	3 694 858	96.5
Sin prevención	171 572	4.8	84 208	2.3	3 351 769	92.9	207 459	6.1	138 960	4.1	3 072 386	89.9
Mujeres												
Con prevención	26 674	0.7	--	--	3 729 038	99.3	99 182	2.3	35 945	0.8	4 165 066	96.9
Sin prevención	118 590	4.1	26 790	0.9	2 729 005	94.9	207 122	7.4	88 598	3.2	2 491 253	89.4
Total												
Con prevención	36 776	0.5	9 221	0.1	6 909 644	99.3	208 555	2.6	60 822	0.7	7 859 923	96.7
Sin prevención	290 161	4.5	110 998	1.7	6 080 774	93.8	414 581	6.7	227 558	3.7	5 563 639	89.7

Porcentajes obtenidos de la población que ya había consumido al momento de la prevención.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Usuarios de 12 a 65 años que se han inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo

Cuadro TD16

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales			
	2011		2016	
	N	%	N	%
Hombres				
12-25	7 119	0.4	18 886	0.7
26-34	77 637	5.6	31 045	1.9
35-65	48 911	2.7	48 061	2.1
Subtotal	133 667	2.8	97 991	1.5
Mujeres				
12-25	29 908	6.3	9 677	0.8
26-34	582	0.2	1 410	0.4
35-65	--	--	--	--
Subtotal	30 490	3.3	11 088	0.6
Total	164 157	2.9	109 079	1.3

Porcentajes obtenidos de la población que usa drogas ilegales según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según sexo en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD17

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	26 549 152	68.9	27 290 290	66.4	53 839 442	67.6	29 800 740	72.4	31 636 874	71.7	61 437 614	72.1
Sigue igual	8 126 462	21.1	10 174 158	24.7	18 300 620	23.0	9 414 380	22.9	10 607 319	24.1	20 021 700	23.5
Ha disminuido	3 832 199	10.0	3 648 950	8.9	7 481 149	9.4	1 953 496	4.7	1 849 248	4.2	3 802 744	4.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD18

		Encuestas Nacionales											
		2011						2016					
		12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
N por subgrupo		29 754 276		15 388 877		34 478 059		31 861 406		16 499 064		36 901 588	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas													
Ha incrementado el número de usuarios		19 170 686	64.4	10 410 676	67.7	24 258 080	70.4	21 486 012	67.4	12 194 352	73.9	27 757 251	75.2
Sigue igual		7 410 670	24.9	3 681 778	23.9	7 208 172	20.9	8 537 462	26.8	3 802 314	23.0	7 681 924	20.8
Ha disminuido		3 172 920	10.7	1 296 423	8.4	3 011 806	8.7	1 837 933	5.8	502 398	3.0	1 462 413	4.0

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población masculina

Cuadro TD19

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	9 934 301	66.3	4 747 647	66.4	11 867 205	72.5	11 101 768	68.5	5 406 220	72.3	13 292 751	76.0
Sigue igual	3 433 459	22.9	1 780 996	24.9	2 912 006	17.8	4 111 938	25.4	1 835 571	24.5	3 466 871	19.8
Ha disminuido	1 613 558	10.8	619 423	8.7	1 599 217	9.8	988 958	6.1	240 491	3.2	724 048	4.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad en la población femenina

Cuadro TD20

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	9 236 385	62.5	5 663 029	68.7	12 390 876	68.5	10 384 243	66.3	6 788 131	75.3	14 464 500	74.5
Sigue igual	3 977 210	26.9	1 900 782	23.1	4 296 166	23.7	4 425 524	28.3	1 966 743	21.8	4 215 052	21.7
Ha disminuido	1 559 362	10.6	676 999	8.2	1 412 589	7.8	848 975	5.4	261 907	2.9	738 365	3.8

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según sexo

Cuadro TD21

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011				2016							
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:												
La violencia familiar y social	33 940 400	88.1	36 868 633	89.7	70 809 032	88.9	36 531 233	88.7	40 049 908	90.8	76 581 140	89.8
Los accidentes	34 382 310	89.3	36 552 393	88.9	70 934 704	89.1	37 415 322	90.9	39 391 115	89.3	76 806 437	90.1
Si una persona se inyecta con una aguja que alguien más utilizó puede adquirir el VIH/SIDA	35 585 240	92.4	38 667 289	94.1	74 252 529	93.3	37 574 528	91.3	40 718 322	92.3	78 292 849	91.8
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	31 563 893	82.0	33 296 148	81.0	64 860 042	81.5	34 314 718	83.4	36 027 396	81.7	70 342 114	82.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según edad

Cuadro TD22

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:												
La violencia familiar y social	25 506 843	85.7	13 922 372	90.5	31 379 818	91.0	27 435 195	86.1	15 002 711	90.9	34 143 234	92.5
Los accidentes	26 158 199	87.9	13 749 524	89.3	31 026 981	90.0	27 723 875	87.0	14 957 178	90.7	34 125 385	92.5
Si una persona se inyecta con una aguja que alguien más utilizó puede adquirir el VIH/SIDA	27 719 570	93.2	14 497 130	94.2	32 035 830	92.9	29 055 407	91.2	15 513 744	94.0	33 723 698	91.4
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	23 927 301	80.4	12 910 728	83.9	28 022 012	81.3	26 133 648	82.0	13 736 169	83.3	30 472 297	82.6

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas

Cuadro TD23

N por subgrupo	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	72.7	71.9	80.2	75.8	68.8	70.4	78.8	73.4
Mariguana regalada	11.0	10.9	9.4	10.3	12.0	10.4	9.1	10.4
Otra droga regalada	1.4	2.1	0.8	1.3	1.1	1.6	1.1	1.2
Mariguana comprada	4.7	2.7	2.9	3.5	6.2	4.6	3.4	4.7
Otra droga comprada	0.6	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.4	0.6
Mariguana y otra droga regalada	7.9	7.7	4.8	6.5	7.7	8.8	5.6	7.0
Mariguana y otra droga comprada	0.5	1.0	0.4	0.6	1.4	1.5	0.6	1.1
Mariguana y otra droga regalada y comprada	1.2	2.9	0.9	1.4	2.1	1.7	1.0	1.6

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población masculina

Cuadro TD24

N por subgrupo	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	62.5	52.1	63.2	60.9	60.4	53.2	63.4	60.4
Mariguana regalada	14.6	17.8	16.7	16.1	14.1	15.4	15.0	14.7
Otra droga regalada	1.5	2.9	1.4	1.7	1.2	1.5	1.7	1.4
Mariguana comprada	7.2	5.3	5.6	6.2	8.3	8.0	5.8	7.2
Otra droga comprada	.8	1.3	1.0	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0
Mariguana y otra droga regalada	10.5	13.5	9.3	10.5	10.2	14.6	10.1	11.0
Mariguana y otra droga comprada	0.9	1.4	0.9	1.0	1.8	2.8	1.3	1.8
Mariguana y otra droga regalada y comprada	1.9	5.6	1.9	2.6	3.0	3.3	1.9	2.6

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas en la población femenina

Cuadro TD25

N por subgrupo	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	83.0	89.0	95.6	89.8	77.5	84.8	92.6	85.6
Mariguana regalada	7.3	4.9	2.7	4.8	9.7	6.3	3.7	6.4
Otra droga regalada	1.4	1.3	0.4	0.9	1.0	1.7	0.5	0.9
Mariguana comprada	2.1	0.5	0.5	1.1	4.0	1.8	1.2	2.3
Otra droga comprada	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.6	0.1	0.3
Mariguana y otra droga regalada	5.2	2.7	0.7	2.7	5.1	4.1	1.5	3.3
Mariguana y otra droga comprada	0.1	0.6	--	0.1	1.0	0.4	***	0.4
Mariguana y otra droga regalada y comprada	0.4	0.5	0.1	0.3	1.3	0.3	0.3	0.6

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo

Cuadro TD26

N por subgrupo Exposición	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga		Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	565 828	0.9	671 457	1.1	992 063	1.6	935 765	1.5	773 895	1.2	1 479 524	2.4
Mariguana regalada	943 983	11.5	333 667	4.1	1 064 569	13.0	1 661 132	18.7	432 478	4.9	1 833 977	20.7
Otra droga regalada	86 907	8.4	226 126	21.7	251 333	24.2	99 441	9.9	137 381	13.7	190 293	18.9
Mariguana comprada	692 348	24.5	278 322	9.9	739 848	26.2	1 221 445	30.6	434 137	10.9	1 324 080	33.2
Otra droga comprada	79 589	15.5	172 638	33.6	191 279	37.2	146 334	27.1	184 990	34.3	260 380	48.2
Mariguana y otra droga regalada	1 662 114	32.1	1 542 471	29.8	2 131 113	41.1	2 260 211	37.8	1 614 352	27.0	2 554 422	42.7
Mariguana y otra droga comprada	134 742	30.3	148 407	33.3	214 174	48.1	351 684	38.1	218 180	23.7	381 889	41.4
Mariguana y otra droga regalada y comprada	586 474	53.0	560 530	50.6	650 901	58.8	698 184	52.1	606 706	45.3	757 651	56.5

Porcentajes de consumo de drogas para cada tipo de exposición.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo en la población masculina

Cuadro TD27

N por subgrupo Exposición	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga		Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga	
	4 080 083		3 013 760		5 007 493		5 750 046		3 331 637		6 649 216	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	434 492	1.9	348 991	1.5	605 406	2.6	656 058	2.6	456 404	1.8	936 505	3.8
Mariguana regalada	791 396	12.8	243 598	3.9	868 593	14.0	1 241 179	20.5	352 073	5.8	1 383 626	22.8
Otra droga regalada	46 851	7.1	150 573	22.8	170 749	25.9	71 240	12.0	84 328	14.2	127 345	21.5
Mariguana comprada	591 663	24.9	257 829	10.8	633 787	26.7	985 243	33.3	336 128	11.4	1 042 284	35.2
Otra droga comprada	79 589	20.7	143 619	37.4	162 261	42.3	118 539	29.9	128 383	32.3	194 431	49.0
Mariguana y otra droga regalada	1 475 650	36.3	1 272 695	31.3	1 815 877	44.7	1 803 169	39.9	1 293 941	28.6	2 018 373	44.7
Mariguana y otra droga comprada	132 601	34.4	101 698	26.4	167 465	43.5	306 448	42.1	199 116	27.4	332 632	45.7
Mariguana y otra droga regalada y comprada	527 842	52.9	494 757	49.6	583 356	58.4	568 171	53.6	481 264	45.4	614 020	58.0

Porcentajes de consumo de drogas obtenidos de la población masculina para cada tipo de exposición.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo en la población femenina

Cuadro TD28

N por subgrupo Exposición	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga		Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga	
	671 902		919 858		1 227 788		1 624 149		1 070 483		2 133 000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	131 337	0.4	322 466	0.9	386 657	1.0	279 707	.7	317 491	.8	543 019	1.4
Mariguana regalada	152 587	7.7	90 069	4.6	195 975	9.9	419 953	14.9	80 405	2.9	450 351	16.0
Otra droga regalada	40 056	10.5	75 553	19.9	80 584	21.2	28 202	6.8	53 053	12.8	62 949	15.2
Mariguana comprada	100 685	22.7	20 493	4.6	106 061	24.0	236 203	23.0	98 009	9.5	281 795	27.4
Otra droga comprada	--	--	29 019	22.2	29 019	22.2	27 795	19.4	56 608	39.6	65 949	46.1
Mariguana y otra droga regalada	186 464	16.7	269 776	24.1	315 237	28.2	457 041	31.3	320 411	21.9	536 050	36.7
Mariguana y otra droga comprada	2 141	3.6	46 709	78.1	46 709	78.1	45 236	23.3	19 065	9.8	49 256	25.3
Mariguana y otra droga regalada y comprada	58 632	53.8	65 773	60.3	67 545	62.0	130 013	46.3	125 442	44.6	143 631	51.1

Porcentajes de consumo de drogas obtenidos de la población femenina para cada tipo de exposición.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Edad de inicio del consumo de drogas

Cuadro TD29

Drogas	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más	17 años o menos	18 a 25 años	26 a 34 años	35 años o más
	%	%	%	%	%	%	%	%
Opiáceos	42.6	38.0	13.1	6.3	51.8	42.5	1.4	4.4
Tranquilizantes	30.5	46.8	9.0	13.8	42.0	39.8	10.9	7.3
Sedantes	48.8	42.7	8.6	--	38.9	56.5	3.7	0.9
Anfetaminas o estimulantes	15.6	60.7	17.5	6.2	26.1	49.9	18.1	5.9
Mariguana	57.6	36.1	4.1	2.1	57.7	37.6	3.4	1.2
Cocaína	38.8	47.2	10.1	3.9	43.1	46.2	7.0	3.7
Crack	39.9	49.4	7.2	3.6	50.3	40.7	6.4	2.7
Alucinógenos	29.0	63.4	4.5	3.1	33.4	57.4	8.1	1.0
Inhalables	77.0	19.9	1.7	1.3	71.7	24.3	3.9	0.2
Heroína, opio	34.3	50.0	14.6	1.0	44.4	50.9	4.7	--
Estimulantes tipo anfetamínico	25.1	62.2	7.5	5.1	43.7	45.8	8.0	2.5
Otras drogas	--	100.0	--	--	84.5	0.7	10.1	4.7
Cualquier droga	51.7	38.4	6.5	3.4	55.6	38.2	4.4	1.7

Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS**

Proporción de usuarios que reportó iniciar su consumo antes de los 18 años

Cuadro TD30

	Encuestas Nacionales					
		2011			2016	
N por subgrupo	Mariguana	Cocaína	Otras drogas	Mariguana	Cocaína	Otras drogas
Cohorte	%	%	%	%	%	%
Hombres						
18-25	71.2	61.8	46.0	66.3	58.1	53.4
26-34	55.4	38.4	36.6	52.6	41.5	46.3
35-65	44.6	12.0	29.3	44.0	27.8	42.9
Subtotal	55.7	35.4	36.8	54.3	40.5	47.9
Mujeres						
18-25	60.7	80.3	53.9	58.8	65.5	52.3
26-34	43.1	35.6	21.8	30.1	31.2	25.5
35-65	18.7	12.1	17.5	29.1	9.9	9.9
Subtotal	47.2	44.2	31.4	47.3	41.3	32.6
Total	54.5	36.3	35.2	52.9	40.6	43.8

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio del consumo de tabaco

Cuadro TD31

	Encuestas Nacionales							
	2011				2016			
	Edad de inicio de tabaco							
	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha fumado tabaco	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha fumado tabaco
N por subgrupo	6 407 399	2 303 145	--	7 592 877	9 654 426	4 731 421	466 592	41 502 990
Drogas	%	%	%	%	%	%	%	%
Mariguana	18.5	8.9	--	0.5	29.7	11.9	5.9	1.1
Cocaína	9.1	4.0	--	0.2	14.1	4.8	5.5	0.3
Crack	3.2	1.5	--	--	4.0	1.0	0.4	0.1
Alucinógenos	2.9	0.2	--	--	2.5	0.8	0.6	0.1
Inhalables	3.1	***	--	--	4.7	1.0	0.5	0.2
Heroína, opio	0.3	***	--	--	0.8	***	--	***
Estimulantes tipo anfetamínico	3.3	1.3	--	--	3.8	1.0	1.3	0.1
Otras drogas	***	***	--	--	0.1	***	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	0.9	0.7	0.5	0.1
Cualquier droga ilegal	21.8	9.7	--	0.8	33.4	13.5	7.8	1.4
No consume drogas ilegales	78.2	90.3	--	99.2	66.6	86.5	92.2	98.6

Porcentajes obtenidos de cada droga conforme los grupos de edad de inicio de tabaco.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Consumo de drogas ilegales según la edad de inicio de alcohol

Cuadro TD32

	Encuestas Nacionales							
	2011			2016				
				Edad de inicio de Alcohol				
	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha consumido Alcohol	17 años o menos	18 a 25 años	26 años o más	Nunca ha consumido Alcohol
N por subgrupo	8 589 799	3 674 849	--	3 813 412	31 782 630	24 717 522	3 328 302	24 715 826
Drogas	%	%	%	%	%	%	%	%
Mariguana	14.6	3.8	--	0.5	18.2	5.2	1.3	1.0
Cocaína	7.3	1.5	--	0.2	7.5	1.9	0.6	0.5
Crack	2.4	0.8	--	--	2.0	0.2	0.1	0.2
Alucinógenos	1.9	0.6	--	--	1.5	0.2	0.2	0.2
Inhalables	2.2	0.3	--	--	2.5	0.5	0.1	0.1
Heroína, opio	0.2	***	--	--	0.4	***	***	0.1
Estimulantes tipo anfetamínico	2.7	0.2	--	--	1.9	0.4	0.1	0.1
Otras drogas	***	***	--	--	***	***	--	--
Mariguana sintética*	--	--	--	--	0.6	***	--	0.1
Cualquier droga ilegal	17.1	4.8	--	0.7	20.5	6.1	1.7	1.3
No consume drogas ilegales	82.9	95.2	--	99.3	79.5	93.9	98.3	98.7

Porcentajes obtenidos de cada droga conforme los grupos de edad de inicio de alcohol.

*En 2011 no se reportó mariguana sintética.

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Factores sociodemográficos asociados con la primera oportunidad de usar drogas
y la transición al uso, abuso y dependencia en el consumo de sustancias
en la población de 12 a 25 años

Cuadro TD33

Exposición	Encuestas Nacionales															
	2011								2016							
	Oportunidad de usar		Experimentación dada la oportunidad		Abuso dada la oportunidad		Dependencia dado el abuso		Oportunidad de usar		Experimentación dada la oportunidad		Abuso dada la oportunidad		Dependencia dado el abuso	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo																
Hombre	5 613 471	37.5	846 224	15.1	667 072	11.9	223 810	30.7	6 415 770	39.6	1 170 014	18.2	1 121 639	17.5	238 314	19.8
Mujer	2 505 974	17.0	356 610	14.2	136 102	5.4	33 219	22.8	3 526 075	22.5	734 773	20.8	353 257	10.0	76 441	20.0
Edad																
12-17	2 483 740	18.5	263 669	10.6	116 090	4.7	49 252	41.0	3 101 960	21.6	476 752	15.4	257 217	8.3	73 254	25.4
18-25	5 635 705	34.5	939 165	16.7	687 084	12.2	207 778	27.5	6 839 884	39.0	1 428 035	20.9	1 217 679	17.8	241 500	18.7
Situación Escolar																
Estudia actualmente	3 706 499	23.6	398 984	10.8	195 054	5.3	73 179	35.2	4 878 729	27.9	828 713	17.0	561 157	11.5	85 738	14.2
No estudia	4 412 946	31.4	803 850	18.2	608 120	13.8	183 850	27.5	5 063 115	35.2	1 076 074	21.3	913 739	18.0	229 017	23.4
Situación Laboral																
Trabaja	4 320 229	40.4	769 651	17.8	490 626	11.4	150 921	27.7	5 048 486	44.8	1 034 191	20.5	894 634	17.7	214 853	22.4
Ama de Casa	711 929	14.7	135 952	19.1	39 343	5.5	12 333	31.3	955 833	19.9	219 200	22.9	117 252	12.3	12 326	9.9
Desempleado	3 087 287	21.7	297 232	9.6	273 205	8.8	93 776	32.2	3 937 525	24.9	651 396	16.5	463 010	11.8	87 575	17.6
Intento suicida																
Con intento	279 518	49.0	106 398	38.1	20 919	7.5	--	--	217 040	58.8	44 575	20.5	67 431	31.1	47 037	66.8
Sin intento	7 839 927	26.9	1 096 436	14.0	782 254	10.0	257 029	30.6	272 952	51.5	64 512	23.6	62 391	22.9	16 777	25.0

Porcentajes obtenidos para cada grupo definido en los renglones.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD34

	Encuestas Nacionales					
	Hombres		2016 Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	445 798	1.1	99 073	0.2	544 870	0.6
Uso sin dependencia	6 203 419	15.1	2 033 927	4.6	8 237 345	9.7
Exposición a drogas sin consumo	10 599 504	25.7	4 748 302	10.8	15 347 806	18.0
No consumo	23 919 896	58.1	37 212 140	84.4	61 132 036	71.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TD35

	Encuestas Nacionales					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	51 443	0.7	32 984	0.5	84 426	0.6
Uso sin dependencia	429 227	5.9	397 863	5.6	827 090	5.8
Exposición a drogas sin consumo	1 350 063	18.6	1 017 929	14.4	2 367 991	16.5
No consumo	5 417 181	74.7	5 638 390	79.6	11 055 571	77.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
en la población de 18 a 34 años

Cuadro TD36

	Encuestas Nacionales					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	331 621	2.0	59 885	0.3	391 506	1.2
Uso sin dependencia	3 422 865	20.8	1 284 462	7.3	4 707 327	13.8
Exposición a drogas sin consumo	4 845 134	29.5	2 510 781	14.3	7 355 915	21.6
No consumo	7 837 413	47.7	13 733 231	78.1	21 570 644	63.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TD37

	Encuestas Nacionales					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dependencia	62 734	0.4	6 205	***	68 938	0.2
Uso sin dependencia	2 351 327	13.4	351 602	1.8	2 702 929	7.3
Exposición a drogas sin consumo	4 404 308	25.2	1 219 592	6.3	5 623 899	15.2
No consumo	10 665 302	61.0	17 840 519	91.9	28 505 821	77.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED1

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	5.3	4.8	0.8	11.8	11.1	2.0
Baja California	9.6	9.3	0.8	13.8	13.5	1.9
Baja California Sur	8.0	7.2	1.6	11.1	10.9	1.1
Campeche	5.3	5.0	0.8	11.8	11.5	0.7
Chiapas	2.2	1.7	0.6	5.8	5.8	0.2
Chihuahua	8.2	7.5	2.4	12.2	11.7	2.1
Ciudad de México	8.5	7.8	1.9	10.6	10.3	0.7
Coahuila	3.6	3.1	0.9	11.4	10.8	1.4
Colima	2.8	2.4	0.8	12.4	12.0	2.0
Durango	8.2	7.8	0.8	10.5	9.5	2.0
Estado de México	4.8	4.6	0.6	10.0	9.7	0.9
Guanajuato	6.9	5.7	1.2	10.0	9.6	1.3
Guerrero	5.2	4.7	0.6	7.8	7.5	0.8
Hidalgo	9.2	8.3	1.5	7.9	7.6	0.8
Jalisco	5.3	5.0	1.0	16.0	15.3	2.2
Michoacán	5.6	4.3	2.5	9.2	9.0	1.5
Morelos	4.6	4.1	0.5	7.5	7.5	0.7
Nayarit	7.6	6.6	1.1	13.2	12.3	2.6
Nuevo León	4.4	4.1	0.7	11.4	10.6	1.6
Oaxaca	3.5	3.4	0.2	6.9	6.6	0.7
Puebla	3.6	3.4	0.3	7.9	7.5	1.3
Querétaro	6.8	6.7	0.1	12.3	12.1	1.2
Quintana Roo	11.2	10.1	1.8	15.5	14.9	1.4
San Luis Potosí	3.4	3.0	0.5	7.7	7.5	0.7
Sinaloa	6.6	6.3	0.9	9.4	9.4	1.5
Sonora	5.5	5.1	1.1	10.9	10.3	1.3
Tabasco	6.4	5.9	1.0	10.8	10.4	0.8
Tamaulipas	11.1	10.3	1.9	10.3	10.0	1.4
Tlaxcala	3.0	2.2	1.1	7.1	6.8	0.6
Veracruz	3.3	2.7	0.8	9.2	8.5	1.9
Yucatán	4.7	3.9	1.3	11.4	10.8	1.7
Zacatecas	6.4	6.0	0.8	9.9	9.5	1.4
Nacional	5.7	5.2	1.0	10.3	9.9	1.3

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED2

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	9.4	8.6	1.4	18.7	17.9	2.9
Baja California	14.0	13.9	0.7	22.0	21.8	3.3
Baja California Sur	11.7	11.0	2.1	17.3	17.3	1.6
Campeche	9.9	9.7	0.8	19.5	19.0	0.7
Chiapas	3.4	3.3	0.2	8.7	8.7	0.1
Chihuahua	13.4	12.7	3.6	18.9	18.4	2.4
Ciudad de México	12.6	12.2	2.6	17.5	17.3	0.7
Coahuila	5.4	5.0	1.1	17.1	16.8	1.9
Colima	4.8	4.5	1.2	18.7	18.4	1.7
Durango	13.5	13.4	0.8	16.7	15.3	3.5
Estado de México	7.8	7.7	0.9	15.5	15.4	1.3
Guanajuato	8.8	7.9	1.0	15.7	15.3	1.7
Guerrero	8.7	8.1	0.6	13.6	13.5	0.8
Hidalgo	15.3	14.5	1.7	12.3	12.0	1.3
Jalisco	7.6	7.5	1.0	22.8	22.1	2.3
Michoacán	9.6	8.0	4.2	14.3	14.1	2.2
Morelos	8.6	8.3	0.3	12.3	12.3	1.4
Nayarit	12.0	10.8	1.4	21.1	20.2	3.5
Nuevo León	6.9	6.9	0.7	16.6	16.3	1.5
Oaxaca	6.6	6.6	0.1	9.6	9.4	0.7
Puebla	6.1	5.8	0.4	12.4	11.8	2.4
Querétaro	12.1	12.1	0.1	19.2	19.1	1.7
Quintana Roo	18.2	16.9	2.2	23.3	23.1	1.1
San Luis Potosí	6.3	6.0	0.5	12.9	12.7	1.1
Sinaloa	9.1	8.8	1.2	16.7	16.6	2.4
Sonora	9.2	8.7	1.5	16.4	15.7	1.8
Tabasco	10.6	10.6	0.9	19.0	18.9	1.0
Tamaulipas	19.7	19.1	2.8	15.8	15.4	2.0
Tlaxcala	4.6	4.1	1.0	11.6	11.1	1.0
Veracruz	5.3	5.1	0.7	15.0	14.7	2.2
Yucatán	6.7	6.2	1.1	19.3	18.9	2.4
Zacatecas	11.9	11.5	1.3	16.3	16.2	1.7
Nacional	9.1	8.8	1.3	16.2	15.8	1.7

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED3

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.6	1.3	0.3	5.5	4.9	1.2
Baja California	5.1	4.6	0.8	5.4	5.1	0.6
Baja California Sur	4.1	3.2	1.0	4.7	4.3	0.7
Campeche	0.9	0.4	0.7	4.5	4.3	0.7
Chiapas	1.0	0.1	1.0	3.1	3.0	0.4
Chihuahua	3.0	2.4	1.2	5.6	5.2	1.9
Ciudad de México	4.9	3.9	1.3	4.3	3.9	0.6
Coahuila	1.8	1.3	0.8	5.8	4.9	0.9
Colima	0.8	0.3	0.5	6.3	5.6	2.3
Durango	3.3	2.6	0.7	4.6	4.1	0.6
Estado de México	1.9	1.7	0.3	5.0	4.5	0.6
Guanajuato	5.2	3.9	1.4	4.8	4.5	1.0
Guerrero	2.0	1.6	0.6	2.4	2.0	0.7
Hidalgo	3.8	2.7	1.4	4.0	3.6	0.4
Jalisco	3.2	2.5	1.0	9.7	8.9	2.2
Michoacán	2.0	1.1	1.0	4.5	4.3	0.8
Morelos	1.1	0.5	0.7	3.3	3.1	0.2
Nayarit	3.4	2.5	0.9	5.5	4.5	1.8
Nuevo León	2.0	1.3	0.7	6.3	5.0	1.7
Oaxaca	0.8	0.6	0.2	4.6	4.0	0.6
Puebla	1.4	1.2	0.2	3.8	3.7	0.4
Querétaro	1.9	1.9	--	6.0	5.7	0.6
Quintana Roo	4.0	3.1	1.5	7.5	6.3	1.7
San Luis Potosí	0.7	0.3	0.5	3.0	2.8	0.4
Sinaloa	4.1	4.0	0.6	2.3	2.3	0.5
Sonora	1.8	1.5	0.8	5.4	4.9	0.8
Tabasco	2.6	1.6	1.1	3.0	2.4	0.6
Tamaulipas	2.8	1.8	1.1	5.0	4.7	0.8
Tlaxcala	1.5	0.4	1.2	3.1	2.9	0.2
Veracruz	1.5	0.6	1.0	3.9	2.7	1.5
Yucatán	2.8	1.8	1.4	3.8	3.1	1.1
Zacatecas	1.5	1.2	0.5	4.0	3.4	1.2
Nacional	2.6	1.9	0.8	4.8	4.3	0.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED4

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.6	0.6	--	8.1	8.0	0.9
Baja California	3.5	3.5	--	5.2	5.1	0.5
Baja California Sur	1.8	1.8	--	6.2	5.5	1.0
Campeche	1.4	1.2	0.5	6.6	6.6	0.9
Chiapas	0.6	0.5	0.1	2.4	2.4	0.3
Chihuahua	3.7	3.3	1.1	5.9	5.9	0.4
Ciudad de México	8.1	7.2	1.3	7.2	7.2	--
Coahuila	1.6	1.6	0.4	7.1	7.1	0.3
Colima	0.8	0.8	0.2	6.7	6.5	3.3
Durango	2.8	2.7	0.2	5.5	5.3	0.7
Estado de México	1.8	1.7	0.4	10.1	9.7	0.3
Guanajuato	4.7	3.7	1.0	5.9	5.9	1.8
Guerrero	3.6	3.6	--	5.9	5.7	0.7
Hidalgo	12.0	11.3	0.8	8.3	8.2	1.1
Jalisco	2.6	2.4	0.8	8.0	7.8	0.7
Michoacán	3.7	3.2	1.3	6.5	6.5	1.6
Morelos	0.7	0.7	--	6.6	6.6	--
Nayarit	3.4	3.2	0.3	6.3	6.2	0.5
Nuevo León	2.0	1.6	0.4	5.5	5.5	0.3
Oaxaca	1.4	1.3	0.1	4.6	4.6	0.5
Puebla	0.6	0.6	--	4.4	3.8	0.8
Querétaro	2.8	2.8	--	8.8	8.8	0.8
Quintana Roo	4.4	3.2	1.6	5.7	5.6	0.1
San Luis Potosí	1.6	1.6	--	5.8	5.8	0.6
Sinaloa	2.5	2.5	0.2	4.2	4.2	--
Sonora	1.2	1.0	0.2	6.7	6.1	0.7
Tabasco	4.9	4.9	0.2	3.3	3.2	0.3
Tamaulipas	2.9	2.9	--	5.1	5.1	--
Tlaxcala	1.9	1.9	0.4	6.3	6.3	--
Veracruz	1.5	0.7	0.8	4.7	4.5	0.5
Yucatán	2.4	2.1	0.4	5.6	5.1	1.0
Zacatecas	1.2	1.2	--	6.1	5.8	0.6
Nacional	2.9	2.6	0.5	6.4	6.2	0.6

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED5

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	8.0	7.6	0.5	17.1	16.2	2.8
Baja California	11.1	11.1	0.5	18.7	18.6	2.8
Baja California Sur	11.2	10.5	2.1	13.2	13.1	1.2
Campeche	8.1	7.5	1.2	15.3	15.2	0.6
Chiapas	2.4	2.0	0.6	8.8	8.8	0.3
Chihuahua	10.3	9.6	2.8	17.2	16.5	3.8
Ciudad de México	11.1	10.7	2.2	16.7	16.5	0.5
Coahuila	4.8	4.3	0.8	18.4	17.5	2.1
Colima	3.8	2.9	1.6	17.5	17.1	2.1
Durango	10.3	10.0	0.5	14.5	13.8	2.3
Estado de México	6.7	6.6	0.8	12.8	12.2	1.7
Guanajuato	8.5	7.7	0.8	13.8	13.3	1.4
Guerrero	7.5	6.5	1.3	10.1	10.0	1.1
Hidalgo	13.7	12.2	2.8	11.7	11.2	1.4
Jalisco	6.8	6.4	1.4	25.1	24.9	3.6
Michoacán	5.6	4.9	2.4	11.8	11.8	2.2
Morelos	7.1	6.1	1.0	11.0	11.0	1.7
Nayarit	10.8	9.1	1.9	16.7	14.9	3.2
Nuevo León	6.1	5.9	0.4	17.3	16.4	2.6
Oaxaca	5.7	5.7	--	11.0	10.1	1.3
Puebla	5.8	5.3	0.5	13.9	13.8	2.3
Querétaro	9.5	9.5	0.1	17.1	16.8	1.6
Quintana Roo	13.0	12.9	1.0	20.7	20.3	1.4
San Luis Potosí	2.9	2.6	0.6	11.6	11.4	1.2
Sinaloa	8.7	8.3	0.7	14.0	13.9	2.4
Sonora	6.5	6.3	1.0	13.9	13.3	2.2
Tabasco	6.6	6.4	0.6	14.9	14.6	1.1
Tamaulipas	15.4	14.5	2.9	14.3	13.8	1.8
Tlaxcala	3.7	2.6	1.1	9.5	8.9	1.0
Veracruz	4.1	3.9	0.4	15.7	14.4	3.1
Yucatán	4.1	4.1	0.7	15.4	14.6	1.5
Zacatecas	8.8	8.3	1.0	14.4	14.1	2.4
Nacional	7.5	7.1	1.1	15.0	14.5	1.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED6

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	3.8	3.5	0.4	13.8	13.3	1.9
Baja California	6.6	6.6	0.4	13.6	13.5	2.2
Baja California Sur	8.4	8.4	1.1	10.5	10.2	1.2
Campeche	6.0	5.9	0.7	13.9	13.9	0.5
Chiapas	1.9	1.5	0.4	6.7	6.7	0.3
Chihuahua	6.9	6.7	2.4	12.3	11.5	2.5
Ciudad de México	8.8	8.0	1.2	15.8	15.8	0.3
Coahuila	3.1	3.1	0.5	14.4	14.0	1.4
Colima	2.1	1.8	0.3	13.5	13.4	2.5
Durango	6.3	6.3	0.1	10.4	10.2	0.9
Estado de México	4.7	4.6	0.7	12.6	12.3	1.2
Guanajuato	5.5	5.0	0.5	11.1	11.1	1.2
Guerrero	6.3	6.0	0.6	8.5	8.3	1.0
Hidalgo	14.1	12.8	2.3	11.5	11.3	0.9
Jalisco	4.3	4.2	0.8	19.4	19.2	2.4
Michoacán	5.2	4.7	2.2	11.4	11.4	2.6
Morelos	3.3	2.8	0.6	11.1	11.1	1.6
Nayarit	7.4	7.2	0.5	14.0	12.2	2.9
Nuevo León	5.0	4.6	0.4	13.7	13.7	0.9
Oaxaca	2.5	2.5	0.1	10.5	10.5	0.7
Puebla	3.6	3.2	0.3	12.9	12.7	2.0
Querétaro	6.4	6.4	--	13.6	13.3	0.9
Quintana Roo	9.4	8.7	1.4	17.0	17.0	0.6
San Luis Potosí	1.7	1.7	0.2	9.5	9.3	1.4
Sinaloa	4.0	4.0	0.1	10.1	10.0	1.6
Sonora	4.4	4.3	0.9	11.6	11.2	1.3
Tabasco	5.0	4.9	0.2	11.1	11.0	0.7
Tamaulipas	10.2	9.5	0.9	11.5	11.5	0.5
Tlaxcala	3.5	2.5	1.1	9.7	9.7	0.3
Veracruz	2.1	1.7	0.4	9.9	9.1	1.0
Yucatán	4.5	4.4	1.0	10.4	9.7	1.5
Zacatecas	4.6	4.1	0.5	12.5	12.1	2.3
Nacional	5.1	4.8	0.7	12.4	12.2	1.3

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED7

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	9.3	9.3	0.2	15.5	14.6	2.8
Baja California	13.0	13.0	0.4	17.2	17.0	2.2
Baja California Sur	9.3	7.8	2.2	12.7	12.7	1.0
Campeche	6.2	5.0	1.5	10.6	10.2	1.0
Chiapas	1.6	1.4	0.4	6.6	6.6	0.5
Chihuahua	11.0	9.6	2.1	16.4	16.4	3.2
Ciudad de México	12.9	12.9	3.2	12.3	11.9	0.6
Coahuila	5.2	4.2	1.0	16.4	15.5	1.8
Colima	4.5	3.2	2.9	16.1	15.4	2.3
Durango	11.0	10.3	1.0	14.5	13.0	3.7
Estado de México	6.2	6.0	0.5	11.0	9.9	1.6
Guanajuato	11.0	9.3	1.7	12.0	11.0	2.2
Guerrero	6.0	4.4	1.6	8.8	8.7	0.9
Hidalgo	11.1	9.9	1.8	9.1	8.3	1.9
Jalisco	8.0	7.2	2.2	22.0	21.7	3.5
Michoacán	4.4	3.5	1.6	7.5	7.5	0.8
Morelos	8.4	7.6	0.9	6.9	6.9	0.3
Nayarit	10.1	6.9	3.2	12.9	12.5	1.5
Nuevo León	5.0	5.0	0.5	15.0	12.8	4.3
Oaxaca	7.7	7.7	--	5.3	3.6	1.7
Puebla	5.2	5.0	0.3	6.4	6.1	1.4
Querétaro	9.3	9.3	0.2	16.6	16.6	2.2
Quintana Roo	12.9	12.9	0.9	16.8	15.8	2.0
San Luis Potosí	4.1	3.6	1.0	10.1	10.0	0.1
Sinaloa	12.1	11.3	1.4	13.1	13.1	1.7
Sonora	5.9	5.6	0.5	12.2	11.1	2.5
Tabasco	8.3	7.9	1.1	12.2	11.8	1.2
Tamaulipas	15.2	14.5	4.4	12.2	11.1	3.1
Tlaxcala	2.6	2.1	0.5	5.9	4.5	1.8
Veracruz	5.2	5.0	0.7	16.5	15.2	4.7
Yucatán	1.8	1.8	--	16.9	16.3	1.0
Zacatecas	9.7	9.6	0.9	10.4	10.1	0.9
Nacional	7.9	7.4	1.2	12.5	11.8	2.0

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED8

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	4.7	3.8	1.6	8.2	7.3	1.8
Baja California	10.5	9.8	1.3	12.2	11.7	1.6
Baja California Sur	6.8	5.6	1.7	10.8	10.6	1.2
Campeche	4.2	4.0	0.4	10.5	9.8	0.7
Chiapas	2.9	2.1	1.0	4.3	4.2	0.1
Chihuahua	7.9	7.1	2.5	10.0	9.6	1.4
Ciudad de México	6.3	5.4	1.9	6.8	6.2	0.9
Coahuila	3.3	2.6	1.3	6.6	6.0	1.2
Colima	2.6	2.5	0.4	9.9	9.2	1.4
Durango	8.8	8.1	1.3	8.9	7.3	2.3
Estado de México	4.0	3.8	0.6	7.5	7.4	0.4
Guanajuato	6.4	4.8	1.7	8.0	7.6	1.0
Guerrero	3.5	3.3	0.2	6.5	6.0	0.5
Hidalgo	3.5	3.0	0.6	4.4	4.2	0.3
Jalisco	5.0	4.6	0.6	10.4	9.0	1.5
Michoacán	6.4	4.2	3.2	7.9	7.3	0.7
Morelos	3.9	3.7	0.3	4.9	4.7	0.2
Nayarit	6.6	5.8	0.8	12.8	12.2	2.9
Nuevo León	3.6	3.1	1.1	8.1	7.3	1.1
Oaxaca	2.7	2.5	0.3	4.4	4.3	0.2
Puebla	2.8	2.7	0.3	3.5	2.9	0.7
Querétaro	5.7	5.6	0.1	8.9	8.7	0.8
Quintana Roo	12.1	9.7	3.0	13.3	12.1	1.9
San Luis Potosí	4.8	4.1	0.6	5.0	4.8	0.4
Sinaloa	6.3	6.1	1.4	7.4	7.3	1.2
Sonora	6.2	5.5	1.7	9.7	9.2	0.8
Tabasco	7.0	5.9	1.8	9.7	9.2	0.8
Tamaulipas	9.7	8.9	1.6	8.5	8.2	1.5
Tlaxcala	2.7	1.8	1.4	5.1	4.9	0.4
Veracruz	3.5	2.6	1.3	5.6	5.0	1.3
Yucatán	6.4	4.5	2.2	9.7	9.3	2.2
Zacatecas	6.5	6.2	1.1	7.2	6.9	0.9
Nacional	5.2	4.5	1.2	7.5	7.0	0.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED9

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	3.3	2.6	0.1	9.9	2.7	0.9
Baja California	7.5	3.9	2.7	12.8	4.6	3.1
Baja California Sur	6.0	3.8	1.6	9.8	4.1	1.5
Campeche	4.6	1.7	0.2	9.9	4.0	0.1
Chiapas	0.8	1.0	--	5.0	1.7	0.3
Chihuahua	6.2	4.8	1.0	10.2	6.1	1.3
Ciudad de México	6.6	3.1	0.8	9.1	3.0	0.8
Coahuila	2.5	1.7	0.2	9.2	3.7	0.4
Colima	1.7	1.5	0.3	10.8	4.9	2.4
Durango	5.8	4.0	0.8	7.8	4.2	1.3
Estado de México	3.9	1.8	0.4	9.0	2.2	0.3
Guanajuato	3.1	2.1	0.4	8.3	3.4	1.0
Guerrero	3.4	3.4	0.3	6.0	3.4	0.6
Hidalgo	6.7	4.0	0.9	6.9	2.3	0.3
Jalisco	4.1	1.9	0.7	12.2	6.9	2.0
Michoacán	3.2	2.4	0.6	8.0	3.7	1.6
Morelos	3.5	2.0	0.1	6.9	2.1	0.3
Nayarit	4.8	3.9	0.5	10.9	5.7	1.8
Nuevo León	3.2	1.9	0.5	9.5	3.1	0.6
Oaxaca	2.7	1.4	--	5.2	2.6	0.3
Puebla	2.8	0.9	0.4	6.3	3.0	0.7
Querétaro	6.2	2.3	0.4	10.3	4.0	1.0
Quintana Roo	8.6	6.0	0.4	13.8	5.8	0.6
San Luis Potosí	2.7	0.6	0.1	6.1	2.1	0.7
Sinaloa	3.8	3.7	0.7	8.1	4.7	2.0
Sonora	3.6	2.9	0.6	9.4	4.3	1.4
Tabasco	5.5	2.2	0.3	8.8	4.8	0.5
Tamaulipas	8.3	6.0	0.3	8.7	3.8	0.4
Tlaxcala	1.6	0.8	--	6.1	1.3	0.6
Veracruz	2.6	0.9	0.1	7.5	3.2	0.5
Yucatán	3.8	0.7	0.3	10.0	3.5	0.4
Zacatecas	4.9	3.3	0.5	8.3	4.1	1.2
Nacional	4.2	2.4	0.5	8.6	3.5	0.9

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED10

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	6.0	4.9	0.3	16.0	4.8	1.4
Baja California	10.8	6.0	4.2	20.7	7.6	5.3
Baja California Sur	9.3	5.8	2.7	15.5	7.4	2.3
Campeche	9.2	3.3	0.4	16.4	7.2	0.2
Chiapas	1.7	2.0	--	8.2	2.7	0.7
Chihuahua	10.6	8.4	1.9	16.1	9.7	1.4
Ciudad de México	10.8	5.7	1.5	15.4	5.6	1.4
Coahuila	4.0	2.8	0.3	14.4	6.7	0.8
Colima	3.2	2.8	0.4	16.4	8.4	3.8
Durango	10.1	6.8	1.2	12.2	7.0	2.1
Estado de México	6.6	3.1	0.5	14.4	4.2	0.2
Guanajuato	4.5	2.0	0.8	13.0	5.6	1.4
Guerrero	6.1	6.3	0.5	10.7	6.7	1.2
Hidalgo	11.9	7.5	1.3	11.2	4.0	0.6
Jalisco	6.9	3.0	0.8	17.1	11.8	3.2
Michoacán	5.9	5.0	0.8	12.8	6.4	2.2
Morelos	7.2	4.1	0.2	11.3	3.6	0.5
Nayarit	8.0	6.7	0.8	18.1	9.8	2.9
Nuevo León	5.4	3.4	0.8	14.7	5.1	0.3
Oaxaca	5.5	2.9	--	7.8	3.9	0.5
Puebla	4.9	1.6	0.5	10.7	5.4	1.1
Querétaro	11.2	4.1	0.8	15.8	7.0	1.8
Quintana Roo	14.9	9.9	0.5	21.4	8.4	0.7
San Luis Potosí	5.3	1.1	0.3	10.6	4.0	1.5
Sinaloa	5.3	5.5	1.1	14.5	8.3	3.7
Sonora	6.6	5.3	1.1	14.6	7.1	2.3
Tabasco	9.9	3.7	0.6	15.8	9.1	1.0
Tamaulipas	15.2	11.2	0.5	13.4	6.2	0.7
Tlaxcala	3.3	1.6	--	10.2	2.4	0.8
Veracruz	4.8	2.0	0.1	13.2	5.7	1.0
Yucatán	6.1	1.2	0.3	17.6	6.8	0.7
Zacatecas	9.6	6.4	0.6	14.0	8.2	2.3
Nacional	7.2	4.1	0.8	14.0	6.2	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED11

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.9	0.5	--	4.3	0.7	0.4
Baja California	4.2	1.8	1.2	4.8	1.5	0.9
Baja California Sur	2.7	1.7	0.4	3.7	0.7	0.8
Campeche	0.2	0.1	--	3.6	1.0	--
Chiapas	--	0.1	--	2.1	0.8	--
Chihuahua	1.8	1.4	0.1	4.5	2.6	1.2
Ciudad de México	2.9	0.9	0.2	3.4	0.7	0.2
Coahuila	1.1	0.6	0.1	4.1	0.8	--
Colima	0.3	0.3	0.3	5.2	1.4	1.0
Durango	1.8	1.3	0.4	3.6	1.5	0.4
Estado de México	1.4	0.7	0.2	3.9	0.3	0.4
Guanajuato	1.8	2.1	0.1	4.1	1.5	0.7
Guerrero	1.0	0.9	0.1	1.7	0.4	--
Hidalgo	2.2	0.9	0.5	3.0	0.8	0.1
Jalisco	1.4	0.8	0.6	7.7	2.3	0.9
Michoacán	0.8	0.1	0.4	3.6	1.2	1.1
Morelos	0.4	0.2	--	2.9	0.8	***
Nayarit	1.8	1.2	0.2	4.0	1.7	0.8
Nuevo León	1.1	0.4	0.1	4.5	1.2	0.8
Oaxaca	0.3	0.1	--	2.8	1.4	***
Puebla	1.0	0.3	0.2	2.4	0.9	0.4
Querétaro	1.7	0.7	0.1	5.3	1.3	0.3
Quintana Roo	2.3	2.1	0.2	5.8	3.0	0.5
San Luis Potosí	0.2	***	***	1.9	0.4	--
Sinaloa	2.4	2.0	0.4	1.8	1.1	0.3
Sonora	0.7	0.6	***	4.3	1.4	0.6
Tabasco	1.4	0.7	--	2.1	0.9	--
Tamaulipas	1.6	1.0	--	4.2	1.6	0.1
Tlaxcala	--	0.1	--	2.3	0.2	0.3
Veracruz	0.6	--	--	2.3	0.8	0.1
Yucatán	1.6	0.2	0.3	2.8	0.4	0.1
Zacatecas	0.7	0.5	0.3	3.2	0.3	0.2
Nacional	1.4	0.7	0.2	3.7	1.1	0.4

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED12

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	0.6	--	--	7.9	0.8	--
Baja California	2.8	--	1.7	5.1	0.5	0.2
Baja California Sur	1.5	--	0.3	4.6	0.2	0.1
Campeche	1.2	0.1	0.1	4.9	2.1	--
Chiapas	0.4	0.1	--	2.0	0.8	--
Chihuahua	3.0	1.1	0.4	5.5	2.4	1.0
Ciudad de México	5.9	1.0	1.4	6.0	1.4	0.2
Coahuila	1.6	0.1	--	5.8	0.4	0.6
Colima	0.8	0.2	--	6.4	1.0	3.2
Durango	2.4	0.2	0.2	5.1	1.0	0.6
Estado de México	1.5	0.6	***	7.4	0.4	1.2
Guanajuato	2.0	0.6	0.9	5.2	1.9	2.1
Guerrero	3.0	3.0	--	5.4	1.6	1.1
Hidalgo	9.6	5.2	2.0	7.3	2.6	0.5
Jalisco	2.0	0.6	0.4	7.8	--	--
Michoacán	2.4	1.5	1.4	5.9	1.9	1.7
Morelos	0.3	--	--	6.2	1.2	0.1
Nayarit	3.1	1.7	0.4	5.1	1.4	1.1
Nuevo León	1.2	0.6	--	5.5	1.0	0.3
Oaxaca	0.9	1.2	--	3.2	2.0	0.1
Puebla	--	0.2	0.1	2.6	1.1	0.2
Querétaro	2.7	--	--	7.8	1.7	0.2
Quintana Roo	2.7	1.1	--	4.9	2.3	0.6
San Luis Potosí	0.8	0.4	--	4.9	0.2	0.2
Sinaloa	1.9	1.4	--	4.1	0.9	0.2
Sonora	0.9	0.1	0.2	5.8	1.1	0.6
Tabasco	3.6	2.0	--	2.8	1.0	--
Tamaulipas	2.5	1.3	--	4.3	0.8	0.2
Tlaxcala	1.4	0.6	--	5.1	0.2	0.1
Veracruz	0.7	0.5	--	3.6	0.8	0.2
Yucatán	2.1	0.2	0.2	4.2	1.6	0.6
Zacatecas	0.7	0.5	0.2	4.8	0.6	1.0
Nacional	2.0	0.8	0.3	5.3	1.1	0.6

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED13

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	4.4	4.9	0.1	14.5	3.9	1.5
Baja California	9.1	5.0	3.5	18.1	6.6	5.0
Baja California Sur	8.5	6.7	3.1	12.0	3.7	2.8
Campeche	7.0	3.0	0.4	13.1	5.9	0.3
Chiapas	0.4	1.8	--	7.4	2.8	0.8
Chihuahua	7.5	7.0	1.7	14.5	8.1	2.8
Ciudad de México	9.3	5.2	1.5	15.7	3.4	1.2
Coahuila	3.5	2.3	0.1	15.5	6.5	0.8
Colima	2.0	2.1	0.8	16.1	7.5	3.2
Durango	6.8	6.4	1.4	11.0	6.1	2.5
Estado de México	5.3	2.2	0.5	11.6	3.5	0.1
Guanajuato	3.6	3.8	0.5	11.5	4.4	1.5
Guerrero	4.4	5.5	0.3	7.3	5.3	0.6
Hidalgo	9.7	6.5	1.0	10.3	3.0	0.6
Jalisco	5.1	2.9	1.4	18.8	11.8	4.5
Michoacán	4.0	3.0	0.6	10.6	3.5	1.8
Morelos	5.1	3.6	0.1	10.1	3.8	0.4
Nayarit	6.8	6.3	0.9	13.8	5.9	1.9
Nuevo León	4.9	3.1	0.5	14.7	4.8	1.0
Oaxaca	4.7	2.4	--	8.6	3.5	0.3
Puebla	4.5	1.7	0.8	11.4	5.6	1.5
Querétaro	9.0	3.7	0.6	15.1	5.4	2.2
Quintana Roo	10.7	9.1	0.7	19.6	7.2	0.8
San Luis Potosí	2.6	0.4	0.3	8.9	3.3	1.8
Sinaloa	4.9	4.9	1.4	12.5	6.9	4.0
Sonora	3.9	4.0	0.9	12.4	5.3	2.0
Tabasco	6.3	2.9	0.4	11.7	7.6	1.0
Tamaulipas	10.5	9.3	0.2	12.1	5.3	0.8
Tlaxcala	1.9	0.6	--	7.9	1.6	0.7
Veracruz	3.5	1.9	0.2	13.1	5.3	1.3
Yucatán	3.8	1.0	0.5	12.9	3.8	0.4
Zacatecas	6.2	5.1	0.9	12.4	6.7	2.5
Nacional	5.5	3.6	0.8	12.8	5.2	1.5

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED14

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	2.4	1.7	--	12.3	1.9	1.3
Baja California	5.7	1.8	2.4	13.3	2.8	2.7
Baja California Sur	7.3	5.2	2.7	9.7	2.2	1.7
Campeche	5.8	1.7	0.5	11.7	4.9	0.3
Chiapas	0.4	1.1	--	5.3	2.3	--
Chihuahua	6.2	4.6	1.3	11.3	3.0	1.7
Ciudad de México	6.7	1.7	0.9	14.8	3.1	1.0
Coahuila	2.8	1.4	0.1	12.8	3.4	1.1
Colima	1.4	0.8	0.4	12.4	5.8	3.8
Durango	4.9	3.4	0.5	8.7	3.2	1.8
Estado de México	3.7	2.1	0.5	11.3	1.5	0.7
Guanajuato	1.8	2.7	0.4	9.8	2.6	1.5
Guerrero	4.1	5.0	0.2	7.0	2.8	0.6
Hidalgo	10.3	6.5	1.6	10.2	2.7	0.2
Jalisco	3.7	1.7	1.4	15.7	5.5	1.8
Michoacán	3.8	3.0	0.6	10.4	3.4	2.7
Morelos	2.4	1.8	--	10.5	3.2	0.4
Nayarit	5.9	4.4	1.0	11.5	3.7	1.6
Nuevo León	3.5	2.0	0.6	12.7	3.5	1.2
Oaxaca	1.8	1.3	--	8.4	3.9	0.4
Puebla	2.7	1.1	0.4	10.7	5.2	1.2
Querétaro	6.2	1.2	--	11.9	3.5	1.1
Quintana Roo	7.0	5.6	0.7	16.3	5.0	1.0
San Luis Potosí	1.3	0.3	***	7.7	1.8	1.6
Sinaloa	2.1	2.1	0.4	9.5	4.2	2.5
Sonora	2.4	2.9	0.5	11.0	3.6	1.6
Tabasco	4.3	1.6	0.2	8.7	5.6	0.7
Tamaulipas	7.5	5.1	0.1	10.4	3.1	0.5
Tlaxcala	1.7	0.7	--	8.5	1.3	0.2
Veracruz	1.5	0.6	--	7.7	2.3	0.7
Yucatán	4.1	1.0	0.4	8.9	2.2	0.7
Zacatecas	2.9	3.0	0.5	11.4	4.8	2.8
Nacional	3.8	2.2	0.6	10.9	3.2	1.2

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED15

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	4.8	6.8	0.2	13.0	5.3	0.3
Baja California	10.1	6.8	4.0	16.5	8.2	5.2
Baja California Sur	5.4	4.4	1.6	10.6	3.6	2.6
Campeche	4.0	2.9	--	8.9	4.6	--
Chiapas	0.4	1.4	--	6.2	2.1	1.6
Chihuahua	6.0	6.2	1.5	12.8	11.8	3.2
Ciudad de México	11.2	8.2	2.3	11.3	2.7	1.0
Coahuila	3.2	2.2	--	12.3	7.3	--
Colima	2.1	2.9	1.0	15.0	5.5	2.1
Durango	6.4	6.6	2.1	10.2	7.6	2.3
Estado de México	4.9	1.3	0.2	8.7	4.6	--
Guanajuato	6.0	2.7	1.1	9.0	5.6	2.2
Guerrero	3.5	3.8	0.4	5.8	6.1	1.1
Hidalgo	8.3	5.2	0.6	7.8	3.2	1.2
Jalisco	5.2	3.1	0.3	15.4	15.0	6.2
Michoacán	2.9	1.3	1.3	6.4	2.2	--
Morelos	6.0	3.5	0.3	5.8	2.5	0.1
Nayarit	4.8	5.5	0.3	10.7	6.2	1.8
Nuevo León	4.7	3.2	--	11.1	4.5	--
Oaxaca	6.5	3.5	--	3.4	1.2	--
Puebla	3.6	1.5	1.0	4.0	2.0	0.8
Querétaro	8.6	5.1	1.3	14.7	5.9	2.7
Quintana Roo	11.2	9.2	0.3	15.1	7.9	0.2
San Luis Potosí	3.6	0.7	0.5	7.4	3.5	0.6
Sinaloa	7.5	7.0	2.1	10.9	6.8	3.7
Sonora	4.1	2.9	1.1	9.6	4.9	1.6
Tabasco	7.6	4.5	0.5	9.8	5.7	0.7
Tamaulipas	9.6	10.6	0.3	8.8	6.4	0.9
Tlaxcala	1.8	0.3	--	4.0	0.9	1.2
Veracruz	4.5	2.9	0.3	14.4	6.7	1.3
Yucatán	1.8	0.4	0.4	13.6	5.2	--
Zacatecas	7.3	4.8	0.9	7.2	4.6	0.5
Nacional	5.8	3.8	0.8	10.0	5.4	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED16

Estado	Encuestas Nacionales					
	2008			2016		
	Estimulantes			Estimulantes		
	Mariguana	Cocaína	tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%
Aguascalientes	3.5	1.3	0.2	6.2	2.3	0.7
Baja California	7.8	4.3	2.2	10.5	4.1	2.3
Baja California Sur	5.1	2.1	0.4	9.4	6.0	0.8
Campeche	3.8	0.9	--	8.7	2.9	--
Chiapas	1.5	0.7	--	4.1	0.9	--
Chihuahua	6.2	4.3	0.4	8.2	5.8	***
Ciudad de México	4.5	1.9	--	4.8	3.2	0.6
Coahuila	1.8	1.7	0.3	4.7	2.3	--
Colima	1.8	1.6	--	7.5	3.9	1.4
Durango	6.4	3.2	0.4	5.8	3.7	0.3
Estado de México	3.6	2.0	0.4	7.1	1.7	0.1
Guanajuato	3.1	1.0	--	6.5	3.1	0.1
Guerrero	2.6	1.6	0.5	5.1	2.6	0.3
Hidalgo	2.6	1.0	0.2	3.8	1.6	--
Jalisco	3.8	1.5	0.1	7.6	5.0	0.5
Michoacán	2.7	2.2	0.3	6.4	4.7	1.4
Morelos	3.5	1.4	0.1	4.3	1.0	0.2
Nayarit	3.7	2.8	0.1	10.5	7.1	2.1
Nuevo León	2.3	1.2	0.5	6.4	2.3	0.3
Oaxaca	2.0	0.6	--	3.0	2.1	0.2
Puebla	2.6	0.4	--	2.9	1.3	0.1
Querétaro	4.9	2.0	0.4	6.5	3.6	0.2
Quintana Roo	8.7	4.3	***	10.4	5.4	0.4
San Luis Potosí	3.6	0.8	0.1	4.0	1.9	--
Sinaloa	3.6	3.6	0.4	5.7	4.1	0.8
Sonora	4.5	3.0	0.4	8.1	4.5	1.2
Tabasco	5.7	1.4	0.2	8.3	3.7	0.2
Tamaulipas	8.3	4.4	0.4	7.2	3.5	0.1
Tlaxcala	1.3	1.2	--	4.6	1.4	0.7
Veracruz	2.6	0.4	--	4.4	2.2	0.1
Yucatán	4.5	0.6	0.1	9.3	4.0	0.3
Zacatecas	5.7	2.9	0.2	5.9	3.1	--
Nacional	3.8	1.8	0.3	6.1	3.0	0.4

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED17

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.4	1.0	0.4	3.7	3.5	0.7
Baja California	4.3	4.1	0.4	4.5	4.4	0.8
Baja California Sur	2.5	2.5	--	3.3	3.3	0.2
Campeche	1.2	1.1	0.1	2.1	1.7	0.4
Chiapas	0.6	0.2	0.4	1.1	1.1	0.1
Chihuahua	3.7	3.3	1.2	3.8	3.4	1.0
Ciudad de México	2.2	1.8	0.5	2.9	2.7	0.2
Coahuila	1.3	1.1	0.4	4.0	3.6	0.6
Colima	0.3	0.2	0.2	3.1	2.9	0.7
Durango	2.2	2.0	0.2	3.2	2.7	0.7
Estado de México	0.9	0.9	0.1	2.3	2.1	0.5
Guanajuato	1.9	1.5	0.5	2.7	2.6	0.5
Guerrero	1.9	1.8	0.2	2.6	2.3	0.4
Hidalgo	4.6	4.5	0.2	2.3	2.3	0.1
Jalisco	1.0	0.8	0.4	5.2	4.9	0.5
Michoacán	2.4	1.8	1.1	3.8	3.4	0.7
Morelos	0.9	0.7	0.2	2.1	2.1	0.1
Nayarit	2.1	1.6	0.6	3.4	2.8	0.9
Nuevo León	1.8	1.8	0.3	3.1	2.8	0.5
Oaxaca	0.7	0.6	0.2	1.5	1.4	0.2
Puebla	0.7	0.7	--	3.2	3.0	0.5
Querétaro	1.1	1.1	--	3.5	3.4	0.3
Quintana Roo	1.8	1.4	0.6	4.2	3.8	0.4
San Luis Potosí	0.4	0.4	--	2.2	2.0	0.4
Sinaloa	1.9	1.7	0.4	3.2	2.9	0.6
Sonora	1.8	1.5	0.4	3.1	3.0	0.5
Tabasco	1.5	1.5	--	3.1	2.9	0.4
Tamaulipas	3.3	3.0	0.4	2.4	2.0	0.4
Tlaxcala	0.6	0.2	0.4	2.1	2.0	0.1
Veracruz	0.8	0.5	0.2	2.5	1.7	1.0
Yucatán	1.5	1.0	0.7	1.9	1.7	0.3
Zacatecas	0.9	0.9	0.1	3.0	2.6	0.7
Nacional	1.6	1.4	0.3	2.9	2.7	0.5

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED18

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	2.3	1.7	0.7	5.8	5.4	1.1
Baja California	6.0	6.0	0.2	7.6	7.5	1.4
Baja California Sur	4.1	4.1	--	5.2	5.2	0.2
Campeche	2.2	2.2	--	3.1	2.7	0.4
Chiapas	0.5	0.4	0.1	1.7	1.7	0.1
Chihuahua	6.2	5.8	1.7	5.0	4.8	0.4
Ciudad de México	2.9	2.6	0.7	4.9	4.7	0.3
Coahuila	1.5	1.3	0.5	6.3	5.9	0.6
Colima	0.6	0.3	0.3	4.2	4.1	0.5
Durango	3.0	3.0	0.1	6.0	5.1	1.5
Estado de México	1.5	1.5	0.1	3.6	3.6	0.6
Guanajuato	1.6	1.5	0.2	4.3	4.2	0.6
Guerrero	3.2	3.2	--	4.3	3.8	0.7
Hidalgo	8.5	8.3	0.2	3.8	3.7	0.1
Jalisco	1.4	1.4	0.3	7.8	7.7	0.5
Michoacán	4.2	3.2	2.1	6.0	5.6	0.9
Morelos	1.5	1.5	--	2.9	2.9	0.2
Nayarit	2.8	2.0	0.8	5.9	4.9	1.4
Nuevo León	3.4	3.3	0.5	4.3	4.2	0.4
Oaxaca	1.1	1.0	0.1	1.6	1.3	0.4
Puebla	1.1	1.1	--	5.5	5.3	0.6
Querétaro	1.3	1.3	--	5.7	5.5	0.6
Quintana Roo	2.8	2.2	0.8	6.5	6.1	0.4
San Luis Potosí	0.7	0.7	--	3.4	3.0	0.5
Sinaloa	3.6	3.2	0.6	5.6	5.1	0.7
Sonora	2.6	2.4	0.3	5.3	5.3	0.8
Tabasco	2.4	2.4	--	5.5	5.4	0.4
Tamaulipas	6.2	5.7	0.6	3.0	2.6	0.4
Tlaxcala	0.5	0.5	0.1	3.1	3.1	--
Veracruz	1.1	1.1	--	4.0	3.2	1.3
Yucatán	1.8	1.3	0.6	3.1	3.0	0.3
Zacatecas	1.7	1.7	--	4.8	4.2	1.2
Nacional	2.5	2.3	0.4	4.6	4.4	0.6

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED19

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.6	0.4	0.1	1.8	1.7	0.3
Baja California	2.6	2.1	0.5	1.3	1.3	0.1
Baja California Sur	0.7	0.7	--	1.3	1.3	0.1
Campeche	0.3	***	0.2	1.2	0.8	0.4
Chiapas	0.7	--	0.7	0.6	0.5	0.1
Chihuahua	1.3	1.0	0.7	2.6	2.0	1.6
Ciudad de México	1.5	1.1	0.4	1.1	0.9	0.1
Coahuila	1.0	0.9	0.2	1.8	1.3	0.5
Colima	0.1	0.1	0.1	1.9	1.7	1.0
Durango	1.4	1.1	0.3	0.5	0.5	***
Estado de México	0.4	0.3	0.1	1.1	0.8	0.3
Guanajuato	2.2	1.5	0.8	1.3	1.2	0.4
Guerrero	0.8	0.6	0.4	1.0	0.9	0.1
Hidalgo	1.3	1.1	0.2	1.0	1.0	0.1
Jalisco	0.7	0.2	0.5	2.7	2.2	0.5
Michoacán	0.8	0.5	0.3	1.8	1.4	0.5
Morelos	0.4	--	0.4	1.3	1.3	--
Nayarit	1.5	1.2	0.4	1.1	0.9	0.4
Nuevo León	0.3	0.2	0.1	2.0	1.4	0.6
Oaxaca	0.4	0.2	0.2	1.4	1.4	--
Puebla	0.4	0.4	--	1.1	1.0	0.3
Querétaro	0.9	0.9	--	1.4	1.4	0.1
Quintana Roo	0.8	0.5	0.4	1.8	1.4	0.5
San Luis Potosí	0.1	0.1	--	1.1	1.1	0.3
Sinaloa	0.3	0.2	0.1	0.9	0.9	0.4
Sonora	1.0	0.5	0.4	0.9	0.7	0.2
Tabasco	0.6	0.6	--	0.9	0.5	0.3
Tamaulipas	0.6	0.5	0.1	1.8	1.4	0.5
Tlaxcala	0.6	--	0.6	1.1	0.9	0.2
Veracruz	0.5	--	0.5	1.0	0.4	0.7
Yucatán	1.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.4
Zacatecas	0.2	0.2	0.2	1.3	1.2	0.3
Nacional	0.8	0.5	0.3	1.3	1.1	0.4

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED20

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.1	0.1	--	5.8	5.7	0.8
Baja California	3.1	3.1	--	3.2	3.0	0.5
Baja California Sur	1.8	1.8	--	2.5	2.5	0.2
Campeche	0.5	0.5	--	3.8	3.2	0.7
Chiapas	0.5	0.5	--	1.2	0.8	0.3
Chihuahua	2.7	2.7	0.7	4.1	4.1	0.4
Ciudad de México	4.0	3.1	0.9	3.5	3.5	--
Coahuila	1.1	1.1	0.4	3.9	3.9	0.3
Colima	0.2	0.2	0.2	4.9	4.9	2.5
Durango	1.7	1.6	0.2	2.7	2.7	0.5
Estado de México	0.8	0.8	***	2.3	2.1	0.2
Guanajuato	2.6	1.7	0.9	3.4	3.2	1.6
Guerrero	2.9	2.9	--	4.6	4.4	0.7
Hidalgo	9.1	9.1	0.1	4.8	4.8	0.2
Jalisco	1.3	1.1	0.4	2.2	2.0	0.2
Michoacán	2.6	2.1	0.5	5.1	4.1	1.1
Morelos	--	--	--	4.9	4.9	--
Nayarit	2.6	2.5	0.3	2.7	2.6	0.5
Nuevo León	2.0	1.6	0.4	2.9	2.9	0.2
Oaxaca	0.6	0.5	0.1	2.4	2.4	0.3
Puebla	0.4	0.4	--	2.5	2.1	0.4
Querétaro	0.6	0.6	--	5.4	5.4	0.7
Quintana Roo	2.2	1.5	1.0	3.0	3.0	--
San Luis Potosí	1.4	1.4	--	3.8	3.8	0.6
Sinaloa	1.5	1.3	0.2	3.2	3.2	--
Sonora	0.4	0.2	0.1	3.4	3.2	0.1
Tabasco	2.9	2.9	--	1.9	1.8	0.3
Tamaulipas	1.5	1.5	--	3.1	3.1	--
Tlaxcala	0.7	0.7	0.3	4.2	4.2	--
Veracruz	1.1	0.5	0.6	1.6	1.4	0.5
Yucatán	1.0	1.0	0.1	2.8	2.4	0.5
Zacatecas	0.9	0.9	--	3.8	3.8	--
Nacional	1.7	1.5	0.3	3.1	2.9	0.4

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED21

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	2.2	2.2	--	5.0	4.7	1.1
Baja California	5.6	5.6	0.2	7.6	7.6	1.3
Baja California Sur	4.1	4.1	--	5.3	5.3	0.1
Campeche	2.6	2.3	0.3	2.3	2.1	0.2
Chiapas	0.3	0.2	0.1	2.0	2.0	0.1
Chihuahua	4.3	4.2	0.7	5.8	5.3	1.7
Ciudad de México	2.7	2.4	0.7	5.0	5.0	0.1
Coahuila	1.4	1.2	0.3	7.2	6.5	0.8
Colima	0.7	0.3	0.4	3.8	3.6	0.3
Durango	3.2	3.1	0.1	5.3	4.7	1.1
Estado de México	1.5	1.3	0.3	3.8	3.4	1.1
Guanajuato	2.7	2.3	0.4	4.2	4.0	0.4
Guerrero	3.2	2.9	0.6	3.4	2.9	0.6
Hidalgo	6.3	6.1	0.3	3.5	3.5	--
Jalisco	1.8	1.4	0.7	10.6	10.4	0.8
Michoacán	3.4	3.0	1.7	5.4	4.9	1.2
Morelos	2.2	1.6	0.6	2.3	2.3	0.3
Nayarit	2.9	1.8	1.1	4.3	3.0	1.6
Nuevo León	1.7	1.7	0.3	6.2	5.5	1.0
Oaxaca	0.5	0.5	--	2.4	2.1	0.3
Puebla	1.5	1.5	--	6.2	6.0	1.0
Querétaro	2.0	2.0	--	4.8	4.8	0.2
Quintana Roo	2.0	2.0	0.2	7.4	6.9	0.5
San Luis Potosí	0.1	0.1	--	3.2	2.7	0.5
Sinaloa	2.2	2.2	0.3	5.4	4.8	1.3
Sonora	2.2	2.1	0.3	4.4	4.2	1.0
Tabasco	1.8	1.8	--	5.1	4.9	0.5
Tamaulipas	3.9	3.6	0.4	3.9	3.3	0.8
Tlaxcala	1.0	0.2	0.7	2.6	2.5	0.1
Veracruz	0.8	0.8	--	4.5	3.5	1.5
Yucatán	1.7	1.7	0.3	2.5	2.4	0.1
Zacatecas	1.3	1.3	0.3	4.9	4.1	1.8
Nacional	2.2	2.0	0.4	5.0	4.6	0.8

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED22

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.2	1.2	--	6.7	6.4	0.8
Baja California	5.1	5.1	0.2	6.8	6.7	1.7
Baja California Sur	4.8	4.8	--	5.2	5.2	0.2
Campeche	2.7	2.7	--	3.6	3.3	0.3
Chiapas	0.5	0.5	0.1	2.4	2.3	0.3
Chihuahua	4.1	4.1	1.0	5.3	5.0	1.0
Ciudad de México	3.5	2.9	0.8	7.0	7.0	--
Coahuila	1.4	1.4	0.2	7.5	7.5	0.3
Colima	0.3	0.1	0.3	5.6	5.6	1.1
Durango	2.8	2.8	0.1	4.4	4.3	0.3
Estado de México	1.5	1.4	0.3	3.4	3.3	0.8
Guanajuato	3.1	2.7	0.4	4.0	4.0	0.8
Guerrero	4.0	3.7	0.6	4.7	4.5	0.5
Hidalgo	8.9	8.7	0.3	4.5	4.5	0.1
Jalisco	1.6	1.5	0.5	8.1	7.8	0.2
Michoacán	3.4	3.0	1.4	7.5	6.7	1.5
Morelos	1.4	1.0	0.3	3.9	3.9	0.2
Nayarit	2.7	2.5	0.3	4.9	3.5	1.9
Nuevo León	2.2	2.0	0.2	6.0	5.6	0.8
Oaxaca	0.6	0.5	0.1	3.5	3.2	0.5
Puebla	1.2	1.2	--	6.8	6.7	0.9
Querétaro	1.6	1.6	--	5.8	5.8	0.6
Quintana Roo	2.6	2.3	0.6	7.7	7.7	--
San Luis Potosí	0.7	0.7	--	4.7	4.2	0.8
Sinaloa	0.7	0.6	0.1	5.6	4.9	0.9
Sonora	2.1	1.8	0.3	4.9	4.9	0.8
Tabasco	2.0	2.0	--	4.6	4.6	0.3
Tamaulipas	1.9	1.8	0.2	3.7	3.7	0.2
Tlaxcala	1.1	0.4	0.8	3.9	3.9	--
Veracruz	0.9	0.6	0.3	2.7	2.4	0.5
Yucatán	2.1	2.0	0.4	2.7	2.4	0.3
Zacatecas	1.5	1.5	--	6.0	5.1	1.5
Nacional	2.2	2.0	0.4	5.1	4.9	0.6

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED23

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	2.3	2.3	--	2.2	1.9	1.3
Baja California	4.6	4.6	--	5.8	5.8	--
Baja California Sur	1.2	1.2	--	3.7	3.7	--
Campeche	0.6	--	0.6	1.1	0.7	0.4
Chiapas	--	--	--	0.4	0.4	--
Chihuahua	3.3	3.0	0.3	5.3	4.8	2.0
Ciudad de México	2.2	2.2	0.6	1.3	1.3	0.1
Coahuila	1.2	0.7	0.5	3.4	2.0	1.4
Colima	0.9	0.6	0.3	1.5	1.1	0.5
Durango	2.5	2.4	0.1	4.6	3.5	2.1
Estado de México	0.9	0.9	***	3.3	2.6	0.7
Guanajuato	1.7	0.7	1.0	3.7	3.4	0.9
Guerrero	1.0	1.0	--	2.3	1.4	0.8
Hidalgo	3.6	3.6	--	2.8	2.8	--
Jalisco	1.7	0.7	1.0	8.4	8.2	1.4
Michoacán	2.6	2.0	1.0	0.7	0.3	0.4
Morelos	1.6	1.1	0.5	1.5	1.5	0.1
Nayarit	3.1	1.1	2.0	1.9	1.8	0.2
Nuevo León	1.1	1.1	0.5	3.6	3.0	0.6
Oaxaca	0.6	0.6	--	0.2	0.2	--
Puebla	1.0	1.0	--	1.0	0.5	0.5
Querétaro	1.4	1.4	--	3.5	3.5	--
Quintana Roo	1.1	1.1	--	3.6	2.4	1.2
San Luis Potosí	0.2	0.2	--	0.5	0.5	--
Sinaloa	4.4	4.4	0.6	3.1	3.1	1.1
Sonora	1.1	1.1	0.1	2.5	2.2	0.6
Tabasco	2.3	2.3	--	3.1	2.8	0.7
Tamaulipas	5.6	5.3	0.6	3.7	2.0	1.6
Tlaxcala	0.6	0.3	0.2	1.2	1.0	0.1
Veracruz	0.9	0.9	--	5.1	3.5	2.5
Yucatán	0.4	0.4	--	2.2	2.2	--
Zacatecas	0.5	0.5	0.5	1.6	1.6	0.7
Nacional	1.7	1.5	0.3	3.1	2.6	0.8

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED24

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	1.1	0.2	1.1	1.5	1.3	0.3
Baja California	3.4	2.8	0.8	1.9	1.8	0.4
Baja California Sur	0.9	0.9	--	1.6	1.5	0.2
Campeche	0.1	0.1	--	1.3	0.8	0.5
Chiapas	0.9	--	0.9	0.1	0.1	--
Chihuahua	3.5	2.8	1.8	1.9	1.4	0.5
Ciudad de México	1.2	0.9	0.3	1.1	0.8	0.3
Coahuila	1.1	1.0	0.5	1.2	0.8	0.4
Colima	0.1	--	0.1	1.7	1.6	0.6
Durango	1.4	1.1	0.3	1.3	0.8	0.5
Estado de México	0.4	0.4	***	0.9	0.9	--
Guanajuato	0.7	0.5	0.3	1.0	1.0	0.1
Guerrero	0.1	0.1	--	0.7	0.7	--
Hidalgo	0.9	0.7	0.2	0.3	0.1	0.1
Jalisco	0.1	0.1	--	1.1	0.7	0.4
Michoacán	1.2	0.3	0.8	1.7	1.7	***
Morelos	0.2	0.2	--	0.8	0.8	--
Nayarit	1.2	1.0	0.2	2.9	2.8	0.4
Nuevo León	1.9	1.9	0.3	0.6	0.4	0.2
Oaxaca	0.9	0.7	0.3	0.2	0.2	--
Puebla	--	--	--	0.5	0.5	--
Querétaro	0.4	0.4	--	1.3	1.0	0.3
Quintana Roo	1.4	0.5	0.9	0.9	0.4	0.5
San Luis Potosí	0.2	0.2	--	0.7	0.6	0.1
Sinaloa	1.8	1.3	0.5	1.3	1.2	0.1
Sonora	1.9	1.4	0.5	1.9	1.8	0.2
Tabasco	0.5	0.5	--	1.7	1.3	0.4
Tamaulipas	3.4	3.0	0.5	0.7	0.5	0.2
Tlaxcala	--	--	--	0.6	0.4	0.2
Veracruz	0.6	0.3	0.3	1.1	0.4	0.7
Yucatán	1.4	0.2	1.3	1.1	0.8	0.4
Zacatecas	0.5	0.5	--	0.8	0.8	--
Nacional	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.2

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED25

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	0.8	0.2	3.0	0.5
Baja California	3.1	0.6	3.8	0.6
Baja California Sur	1.9	0.7	2.9	0.3
Campeche	0.7	0.4	1.2	0.7
Chiapas	0.1	0.1	0.8	0.2
Chihuahua	2.7	1.4	2.8	1.1
Ciudad de México	1.7	0.3	2.5	0.6
Coahuila	0.7	0.6	3.2	1.0
Colima	0.2	***	2.3	0.3
Durango	1.2	0.7	1.9	0.8
Estado de México	0.6	0.2	2.1	0.6
Guanajuato	0.5	0.6	1.9	0.9
Guerrero	1.0	1.4	1.6	1.1
Hidalgo	3.0	2.0	1.8	0.5
Jalisco	0.6	0.1	2.9	1.9
Michoacán	1.0	0.7	3.0	0.9
Morelos	0.4	0.3	1.9	0.3
Nayarit	1.4	0.5	2.3	0.7
Nuevo León	1.6	0.3	2.2	0.9
Oaxaca	0.3	0.1	1.0	0.7
Puebla	0.6	***	1.5	1.3
Querétaro	1.0	0.1	2.8	1.0
Quintana Roo	1.1	0.6	2.9	1.6
San Luis Potosí	0.3	0.1	1.5	0.2
Sinaloa	1.0	1.1	2.5	0.8
Sonora	1.2	0.4	2.8	0.9
Tabasco	1.2	0.5	1.9	1.4
Tamaulipas	2.0	1.4	1.6	0.6
Tlaxcala	0.1	0.1	1.7	0.2
Veracruz	0.4	0.1	1.3	0.5
Yucatán	0.8	0.2	1.6	0.6
Zacatecas	0.6	0.2	2.0	0.9
Nacional	1.0	0.4	2.1	0.8

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TED26

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	1.3	0.5	4.5	1.0
Baja California	4.5	1.1	6.3	1.0
Baja California Sur	3.0	1.0	4.6	0.6
Campeche	1.4	0.8	1.7	1.0
Chiapas	0.2	0.3	1.2	0.4
Chihuahua	4.8	2.0	4.1	1.1
Ciudad de México	2.5	0.6	4.3	1.3
Coahuila	0.7	0.8	5.7	1.7
Colima	0.3	0.1	2.9	0.5
Durango	1.9	1.6	3.5	1.4
Estado de México	1.0	0.3	3.5	1.1
Guanajuato	0.9	0.4	2.9	1.2
Guerrero	1.8	2.4	2.4	2.0
Hidalgo	5.6	3.9	3.0	1.0
Jalisco	1.2	0.3	3.7	3.9
Michoacán	1.8	1.5	4.8	1.6
Morelos	0.9	0.7	2.6	0.2
Nayarit	1.7	0.9	3.9	1.2
Nuevo León	3.0	0.5	3.8	1.0
Oaxaca	0.7	0.3	1.3	0.3
Puebla	1.0	0.1	2.5	2.5
Querétaro	1.1	--	4.6	1.9
Quintana Roo	1.7	1.1	4.7	2.4
San Luis Potosí	0.6	0.2	2.3	0.4
Sinaloa	1.8	2.2	4.4	1.3
Sonora	2.4	0.4	5.0	1.5
Tabasco	1.9	0.9	3.5	2.8
Tamaulipas	3.5	2.7	1.9	0.5
Tlaxcala	0.3	0.1	2.8	0.3
Veracruz	0.9	0.2	2.4	1.0
Yucatán	1.2	0.2	2.9	0.9
Zacatecas	1.1	0.3	3.3	1.9
Nacional	1.7	0.8	3.5	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TED27

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	0.4	--	1.7	***
Baja California	1.8	0.1	1.3	0.2
Baja California Sur	0.7	0.3	1.1	***
Campeche	--	--	0.8	0.4
Chiapas	--	--	0.5	--
Chihuahua	0.7	0.8	1.6	1.1
Ciudad de México	1.0	--	0.9	--
Coahuila	0.6	0.3	0.9	0.3
Colima	0.1	--	1.7	0.1
Durango	0.6	--	0.4	0.2
Estado de México	0.2	0.1	0.8	0.1
Guanajuato	0.2	0.8	1.1	0.6
Guerrero	0.4	0.5	0.9	0.2
Hidalgo	0.8	0.3	0.7	0.1
Jalisco	0.1	--	2.2	--
Michoacán	0.4	--	1.3	0.3
Morelos	--	--	1.3	0.4
Nayarit	1.1	0.2	0.8	0.2
Nuevo León	0.2	0.1	0.6	0.7
Oaxaca	--	--	0.8	1.1
Puebla	0.3	--	0.7	0.3
Querétaro	0.9	0.1	1.1	0.2
Quintana Roo	0.4	0.1	0.9	0.7
San Luis Potosí	--	--	0.8	0.1
Sinaloa	0.2	--	0.6	0.3
Sonora	--	0.4	0.6	0.3
Tabasco	0.5	0.1	0.4	0.1
Tamaulipas	0.5	0.3	1.3	0.6
Tlaxcala	--	--	0.8	--
Veracruz	--	--	0.2	--
Yucatán	0.5	0.2	0.3	0.2
Zacatecas	0.2	--	0.9	***
Nacional	0.4	0.1	0.9	0.2

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TED28

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	0.1	--	5.3	0.6
Baja California	2.7	--	3.0	0.3
Baja California Sur	1.5	--	2.2	--
Campeche	0.4	--	3.0	1.3
Chiapas	0.4	0.1	0.7	--
Chihuahua	2.4	0.1	3.3	1.3
Ciudad de México	2.8	0.2	3.2	0.2
Coahuila	1.1	0.1	3.6	0.4
Colima	0.2	--	4.7	0.2
Durango	1.4	0.1	2.3	0.6
Estado de México	0.6	0.2	2.1	0.4
Guanajuato	1.1	0.3	2.9	1.6
Guerrero	2.7	2.6	3.8	1.6
Hidalgo	6.6	3.5	4.1	0.8
Jalisco	0.7	--	2.0	--
Michoacán	1.6	0.3	3.9	0.2
Morelos	--	--	4.8	1.2
Nayarit	2.3	0.7	2.2	0.5
Nuevo León	1.2	0.5	2.9	0.6
Oaxaca	0.3	--	2.4	1.5
Puebla	--	0.2	1.5	0.5
Querétaro	0.6	--	4.4	0.4
Quintana Roo	1.1	0.8	2.3	1.0
San Luis Potosí	0.7	0.4	2.8	0.2
Sinaloa	1.3	0.2	3.0	0.4
Sonora	0.2	0.1	3.2	0.9
Tabasco	1.6	1.1	1.2	0.4
Tamaulipas	1.5	0.5	2.3	0.5
Tlaxcala	0.6	--	3.9	0.1
Veracruz	0.5	--	1.3	0.7
Yucatán	1.0	--	2.0	0.9
Zacatecas	0.4	0.4	2.8	0.4
Nacional	1.2	0.4	2.6	0.6

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TED29

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	1.8	0.5	4.4	0.8
Baja California	4.4	0.8	6.3	1.0
Baja California Sur	2.9	1.5	4.8	0.5
Campeche	1.5	0.8	1.3	0.8
Chiapas	--	0.2	1.6	0.4
Chihuahua	3.2	2.1	4.9	1.7
Ciudad de México	2.4	0.5	4.6	1.1
Coahuila	0.8	0.9	6.0	1.9
Colima	0.3	0.1	2.9	0.6
Durango	2.0	1.4	2.9	1.1
Estado de México	0.9	0.3	3.3	0.8
Guanajuato	0.3	1.4	2.9	0.9
Guerrero	1.0	2.1	1.6	1.6
Hidalgo	3.9	3.1	2.7	1.0
Jalisco	1.1	0.4	5.9	4.3
Michoacán	1.8	1.5	4.2	1.7
Morelos	0.9	0.9	2.2	0.3
Nayarit	1.5	0.8	2.6	1.2
Nuevo León	1.7	0.2	4.1	1.8
Oaxaca	0.3	0.3	1.2	1.1
Puebla	1.5	--	2.9	2.7
Querétaro	1.8	0.1	3.8	2.2
Quintana Roo	1.6	0.9	5.3	3.0
San Luis Potosí	0.1	--	2.0	0.3
Sinaloa	0.8	1.6	3.9	1.3
Sonora	1.4	1.0	3.9	1.7
Tabasco	1.8	0.5	3.1	2.7
Tamaulipas	1.2	2.6	2.8	1.0
Tlaxcala	0.1	0.2	2.3	0.1
Veracruz	0.8	--	2.4	0.9
Yucatán	1.3	0.3	2.4	0.8
Zacatecas	1.3	--	3.6	1.6
Nacional	1.4	0.7	3.5	1.5

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TED30

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	0.7	0.5	6.0	0.6
Baja California	4.3	0.4	6.5	1.1
Baja California Sur	3.6	1.7	5.0	0.4
Campeche	1.8	0.9	2.6	1.2
Chiapas	0.2	0.3	1.9	0.4
Chihuahua	3.5	1.6	4.7	1.3
Ciudad de México	2.7	0.3	6.6	1.5
Coahuila	1.1	0.6	7.1	1.6
Colima	0.1	--	5.0	0.6
Durango	2.1	1.2	2.7	0.9
Estado de México	1.0	0.2	3.2	0.5
Guanajuato	0.9	1.1	3.0	1.3
Guerrero	2.1	3.0	3.1	2.2
Hidalgo	6.5	3.5	4.0	0.8
Jalisco	1.1	0.2	5.8	2.0
Michoacán	1.7	1.5	5.9	1.8
Morelos	0.4	0.9	3.7	0.8
Nayarit	2.1	0.7	3.3	1.3
Nuevo León	1.8	0.4	4.6	1.6
Oaxaca	0.4	--	2.3	1.8
Puebla	1.0	0.1	3.5	2.8
Querétaro	1.6	0.1	4.5	1.9
Quintana Roo	1.7	1.2	6.1	3.1
San Luis Potosí	0.4	0.2	3.0	0.3
Sinaloa	0.6	0.1	4.6	1.0
Sonora	1.3	1.0	4.7	1.7
Tabasco	1.4	0.5	2.8	2.4
Tamaulipas	1.2	0.8	3.2	0.6
Tlaxcala	0.4	--	3.5	0.2
Veracruz	0.6	--	1.4	1.4
Yucatán	1.7	0.3	2.3	0.7
Zacatecas	1.2	0.2	4.2	1.4
Nacional	1.5	0.6	4.0	1.3

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TED31

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	2.3	0.2	1.9	1.0
Baja California	3.3	0.9	3.8	0.4
Baja California Sur	0.7	--	2.8	0.4
Campeche	--	--	0.4	0.3
Chiapas	--	--	0.1	0.1
Chihuahua	1.9	1.3	4.1	2.1
Ciudad de México	2.2	0.6	1.0	0.1
Coahuila	0.4	0.7	1.4	1.2
Colima	0.6	0.1	0.7	0.3
Durango	1.1	0.7	2.7	1.0
Estado de México	0.5	0.4	2.6	1.3
Guanajuato	--	0.7	2.6	0.6
Guerrero	0.4	0.7	1.0	0.5
Hidalgo	0.9	2.7	1.5	1.1
Jalisco	0.7	0.3	2.3	5.5
Michoacán	1.6	0.4	0.3	--
Morelos	1.0	--	1.5	0.1
Nayarit	1.1	0.8	1.1	0.4
Nuevo León	1.1	0.2	2.0	1.2
Oaxaca	--	0.6	0.1	0.1
Puebla	1.0	--	0.2	0.3
Querétaro	1.0	--	3.0	1.2
Quintana Roo	1.0	0.4	1.3	1.4
San Luis Potosí	0.2	--	0.5	0.1
Sinaloa	1.5	3.2	1.6	0.9
Sonora	0.7	0.4	1.8	1.0
Tabasco	2.3	1.0	1.9	1.3
Tamaulipas	1.4	4.3	1.3	1.3
Tlaxcala	--	0.3	1.0	--
Veracruz	0.9	--	3.1	--
Yucatán	0.4	--	2.2	1.1
Zacatecas	0.5	--	1.6	0.9
Nacional	1.0	0.6	1.8	1.0

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TED32

Estado	Encuestas Nacionales			
	2008		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%
Aguascalientes	0.2	--	0.7	0.2
Baja California	1.9	0.8	1.7	0.3
Baja California Sur	0.9	***	1.2	0.2
Campeche	--	0.1	0.5	0.4
Chiapas	--	--	0.1	***
Chihuahua	2.4	1.2	0.8	0.4
Ciudad de México	0.7	0.1	0.7	0.3
Coahuila	0.4	0.4	0.6	0.3
Colima	--	--	0.9	--
Durango	0.3	0.4	0.8	0.5
Estado de México	0.3	0.1	0.9	0.4
Guanajuato	0.4	--	0.6	0.6
Guerrero	0.1	--	0.5	0.3
Hidalgo	0.6	0.2	0.1	--
Jalisco	0.1	--	0.5	0.3
Michoacán	0.1	--	1.3	0.5
Morelos	0.2	--	0.7	***
Nayarit	0.8	0.1	2.1	0.3
Nuevo León	1.6	0.3	0.2	0.1
Oaxaca	0.4	0.1	0.2	--
Puebla	--	--	0.2	0.3
Querétaro	0.2	--	1.0	0.1
Quintana Roo	0.4	0.1	0.3	0.2
San Luis Potosí	0.2	--	0.6	0.2
Sinaloa	1.0	0.9	1.0	0.5
Sonora	1.4	--	1.7	0.2
Tabasco	0.3	0.2	1.0	0.5
Tamaulipas	2.9	0.5	0.4	0.2
Tlaxcala	--	--	0.2	0.2
Veracruz	0.1	0.2	0.4	***
Yucatán	0.2	0.1	0.6	0.2
Zacatecas	--	0.2	0.3	0.5
Nacional	0.6	0.2	0.7	0.3

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro TED33

Estado	Encuestas Nacionales					
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Aguascalientes	0.7	0.7	***	1.9	1.8	0.4
Baja California	3.1	2.9	0.3	3.0	3.0	0.5
Baja California Sur	2.0	2.0	--	1.7	1.7	***
Campeche	0.2	0.1	0.1	1.0	0.8	0.2
Chiapas	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--
Chihuahua	1.6	1.4	0.2	2.5	2.3	0.6
Ciudad de México	1.5	1.3	0.2	1.6	1.5	0.2
Coahuila	1.1	0.9	0.3	2.6	2.6	0.1
Colima	0.2	0.1	0.1	1.7	1.6	0.2
Durango	1.5	1.5	0.1	1.8	1.6	0.3
Estado de México	0.6	0.6	***	1.2	1.1	0.3
Guanajuato	1.2	0.9	0.3	1.2	1.2	0.1
Guerrero	1.3	1.2	0.1	0.9	0.8	***
Hidalgo	3.3	3.2	0.1	0.5	0.5	***
Jalisco	0.6	0.6	0.1	3.0	2.9	0.1
Michoacán	1.4	1.1	0.8	2.5	2.3	0.4
Morelos	0.6	0.5	0.1	0.9	0.9	0.1
Nayarit	1.5	1.4	0.2	2.8	2.3	0.6
Nuevo León	1.6	1.6	0.2	1.9	1.9	0.2
Oaxaca	0.3	0.2	0.1	0.5	0.5	--
Puebla	0.1	0.1	--	1.3	1.2	0.2
Querétaro	0.4	0.4	--	1.8	1.7	0.1
Quintana Roo	0.7	0.6	0.2	2.2	1.9	0.3
San Luis Potosí	0.2	0.2	--	0.6	0.6	***
Sinaloa	1.3	1.1	0.2	1.9	1.8	0.2
Sonora	1.1	0.9	0.2	2.3	2.2	0.1
Tabasco	1.1	1.1	--	1.2	1.1	0.2
Tamaulipas	2.7	2.6	0.2	1.0	0.9	0.1
Tlaxcala	0.1	0.1	--	1.1	1.1	***
Veracruz	0.3	0.3	--	1.1	0.7	0.5
Yucatán	0.6	0.2	0.3	1.4	1.4	0.1
Zacatecas	0.3	0.3	--	1.3	1.3	0.1
Nacional	1.0	0.9	0.1	1.5	1.4	0.2

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 3: TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (2)

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD1

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	6.6	6.0	1.5	8.4	7.3	1.8	11.5	10.9	1.8
Noroccidental	7.5	7.1	1.0	9.2	9.0	1.3	11.5	11.2	1.6
Nororiental	6.3	5.8	1.1	9.6	8.9	2.3	10.2	9.7	1.3
Occidental	5.5	5.1	1.0	10.3	9.2	1.8	14.4	13.7	2.1
Centro	5.3	4.8	0.7	6.6	6.2	1.2	9.4	9.1	1.0
Ciudad de México	8.5	7.8	1.9	8.8	7.9	1.5	10.6	10.3	0.7
Centro Sur	4.2	3.5	1.0	7.5	6.8	1.1	8.5	8.1	1.4
Sur	4.9	4.3	1.0	5.3	5.0	0.9	9.6	9.3	0.8
Nacional	5.7	5.2	1.0	7.8	7.2	1.4	10.3	9.9	1.3

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD2

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	10.6	10.1	2.2	13.6	13.0	2.0	17.8	17.2	2.5
Noroccidental	11.1	10.8	1.2	16.5	16.3	2.0	18.5	18.2	2.5
Nororiental	10.8	10.6	1.3	15.5	15.0	3.2	15.5	15.2	1.6
Occidental	8.5	8.2	1.1	17.2	16.5	1.7	21.2	20.6	2.3
Centro	8.4	8.1	0.8	10.6	10.1	1.7	14.7	14.4	1.6
Ciudad de México	12.6	12.2	2.6	12.6	11.9	1.5	17.5	17.3	0.7
Centro Sur	7.1	6.5	1.3	13.6	13.0	1.5	13.6	13.4	1.7
Sur	7.9	7.6	0.8	9.3	9.1	1.0	15.7	15.6	0.9
Nacional	9.1	8.8	1.3	13.0	12.5	1.8	16.2	15.8	1.7

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD3

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.7	2.1	0.9	3.5	1.9	1.7	5.4	4.8	1.2
Noroccidental	3.8	3.5	0.8	1.9	1.5	0.5	4.4	4.1	0.6
Nororiental	1.9	1.2	0.8	3.8	3.0	1.4	5.1	4.4	1.1
Occidental	2.7	2.1	0.8	3.8	2.4	1.8	8.0	7.2	1.9
Centro	2.4	1.9	0.6	3.0	2.6	0.8	4.6	4.2	0.6
Ciudad de México	4.9	3.9	1.3	5.4	4.3	1.4	4.3	3.9	0.6
Centro Sur	1.5	0.9	0.7	1.9	1.3	0.7	3.9	3.2	1.1
Sur	2.0	1.1	1.1	1.5	1.0	0.7	3.9	3.4	0.8
Nacional	2.6	1.9	0.8	3.0	2.3	1.0	4.8	4.3	0.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD4

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.8	2.6	0.7	3.0	2.6	0.7	6.2	6.2	0.4
Noroccidental	2.5	2.4	0.1	4.2	4.2	0.2	5.4	5.1	0.4
Nororiental	2.2	2.0	0.2	6.3	5.4	1.6	5.5	5.5	0.3
Occidental	2.2	2.0	0.5	3.6	3.3	0.5	7.5	7.3	0.8
Centro	2.9	2.6	0.4	2.8	2.2	0.6	7.8	7.6	0.7
Ciudad de México	8.1	7.2	1.3	4.9	4.9	--	7.2	7.2	--
Centro Sur	2.3	1.8	0.6	2.4	2.2	0.2	5.3	5.2	0.8
Sur	2.2	1.9	0.4	2.2	2.1	0.3	3.8	3.7	0.4
Nacional	2.9	2.6	0.5	3.3	2.9	0.5	6.4	6.2	0.6

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD5

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	8.3	7.8	1.6	12.2	10.6	2.6	17.1	16.3	2.8
Noroccidental	9.2	8.9	0.8	11.5	11.1	1.4	15.6	15.3	2.4
Nororiental	8.4	7.9	1.3	13.1	12.7	2.9	15.1	14.4	2.0
Occidental	7.3	6.8	1.3	14.2	13.2	1.8	21.8	21.4	3.3
Centro	7.4	6.9	0.8	11.3	10.7	2.0	13.1	12.7	1.7
Ciudad de México	11.1	10.7	2.2	13.4	12.9	1.5	16.7	16.5	0.5
Centro Sur	5.4	5.0	0.9	10.1	9.2	1.1	13.0	12.3	2.2
Sur	5.5	5.2	0.7	6.0	5.8	0.7	13.5	13.2	0.9
Nacional	7.5	7.1	1.1	11.3	10.6	1.7	15.0	14.5	1.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD6

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	5.5	5.4	1.3	7.3	6.2	1.5	12.7	12.1	1.7
Noroccidental	5.3	5.3	0.5	7.5	7.3	0.7	11.7	11.5	1.7
Nororiental	5.8	5.4	0.5	10.9	10.5	2.2	12.0	12.0	0.9
Occidental	4.4	4.2	0.6	8.5	7.8	1.2	17.2	16.8	2.4
Centro	5.3	5.0	0.7	7.9	7.1	1.3	12.2	12.0	1.3
Ciudad de México	8.8	8.0	1.2	8.0	7.7	0.7	15.8	15.8	0.3
Centro Sur	3.7	3.3	0.8	6.8	6.0	0.7	10.1	9.8	1.3
Sur	4.1	3.8	0.6	4.3	4.2	0.4	10.2	10.1	0.6
Nacional	5.1	4.8	0.7	7.6	7.0	1.1	12.4	12.2	1.3

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD7

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	8.9	7.8	1.5	13.8	12.4	3.1	16.0	15.4	2.8
Noroccidental	10.5	10.1	0.8	13.3	12.8	1.8	14.3	14.0	2.0
Nororiental	8.1	7.8	1.9	11.8	10.8	3.2	13.0	11.6	2.9
Occidental	8.3	7.4	1.9	16.9	15.8	2.0	18.5	18.1	2.8
Centro	7.2	6.7	0.7	10.3	10.1	2.0	10.3	9.5	1.7
Ciudad de México	12.9	12.9	3.2	16.3	15.7	1.8	12.3	11.9	0.6
Centro Sur	5.6	5.1	0.9	9.6	9.1	1.0	11.1	10.2	2.6
Sur	5.1	4.8	0.6	6.1	5.7	1.0	11.2	10.9	1.0
Nacional	7.9	7.4	1.2	11.5	11.0	1.9	12.5	11.8	2.0

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD8

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	6.4	5.7	1.8	7.2	6.3	1.6	8.5	7.8	1.5
Noroccidental	7.8	7.2	1.5	9.1	8.8	1.6	9.9	9.6	1.2
Nororiental	5.8	5.2	1.2	7.5	6.8	2.0	7.6	7.0	1.1
Occidental	5.2	4.7	0.8	9.2	7.8	2.2	10.0	8.9	1.6
Centro	4.2	3.7	0.7	3.8	3.5	0.8	6.5	6.3	0.6
Ciudad de México	6.3	5.4	1.9	6.3	4.9	1.9	6.8	6.2	0.9
Centro Sur	4.0	3.1	1.3	7.4	6.7	1.4	6.0	5.5	0.8
Sur	5.6	4.4	1.6	6.0	5.4	1.3	8.2	7.8	0.9
Nacional	5.2	4.5	1.2	6.4	5.7	1.4	7.5	7.0	0.9

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD9

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	4.8	3.6	0.7	5.9	3.8	0.7	9.4	4.8	1.0
Noroccidental	5.3	3.6	1.5	7.4	4.9	1.2	10.2	4.5	2.2
Nororiental	4.7	2.9	0.3	7.4	4.7	1.1	8.5	3.1	0.6
Occidental	4.0	2.3	0.5	6.8	4.0	0.6	11.3	5.9	1.8
Centro	3.8	1.9	0.4	5.2	2.4	1.2	8.1	2.6	0.5
Ciudad de México	6.6	3.1	0.8	6.7	2.6	0.5	9.1	3.0	0.8
Centro Sur	2.9	1.8	0.2	5.7	3.5	0.5	6.9	3.2	0.7
Sur	3.6	1.9	0.2	4.6	2.2	0.1	8.3	3.4	0.4
Nacional	4.2	2.4	0.5	6.0	3.3	0.8	8.6	3.5	0.9

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD10

	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.2	6.1	1.2	10.9	6.5	1.4	14.7	8.0	1.3
Noroccidental	8.0	5.6	2.3	13.8	9.2	2.2	16.7	7.7	3.7
Nororiental	8.5	5.4	0.6	12.9	8.3	2.0	13.4	5.2	0.7
Occidental	7.0	3.9	0.7	12.1	7.5	0.9	16.6	10.3	2.9
Centro	6.6	3.1	0.6	8.9	4.2	1.6	13.1	4.7	0.7
Ciudad de México	10.8	5.7	1.5	10.8	4.0	0.8	15.4	5.6	1.4
Centro Sur	5.4	3.6	0.3	10.8	6.6	0.8	11.7	5.7	1.2
Sur	6.4	3.3	0.3	8.4	4.3	--	14.0	5.9	0.7
Nacional	7.2	4.1	0.8	10.6	5.9	1.3	14.0	6.2	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD11

	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.6	1.1	0.2	1.1	1.2	0.2	4.2	1.7	0.6
Noroccidental	2.6	1.5	0.6	1.0	0.5	0.2	3.6	1.3	0.6
Nororiental	1.1	0.5	—	2.1	1.2	0.2	3.8	1.1	0.4
Occidental	1.2	0.8	0.4	1.9	0.7	0.3	6.3	1.8	0.8
Centro	1.4	0.8	0.2	1.9	0.6	0.8	3.6	0.7	0.4
Ciudad de México	2.9	0.9	0.2	3.0	1.4	0.3	3.4	0.7	0.2
Centro Sur	0.7	0.2	0.1	1.0	0.6	0.1	2.6	1.0	0.3
Sur	0.9	0.5	0.1	1.0	0.3	0.2	2.8	1.0	0.1
Nacional	1.4	0.7	0.2	1.6	0.7	0.4	3.7	1.1	0.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD12

Región	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.4	0.6	0.2	1.9	0.6	0.7	5.6	1.4	0.8
Noroccidental	1.9	0.5	0.7	4.2	--	--	5.0	0.8	0.3
Nororiental	1.5	0.8	--	5.1	2.8	1.6	5.0	0.7	0.3
Occidental	1.7	0.6	0.3	2.3	1.2	0.7	7.1	0.3	0.4
Centro	1.9	0.8	0.3	2.0	0.3	--	6.0	1.1	1.0
Ciudad de México	5.9	1.0	1.4	2.9	0.3	--	6.0	1.4	0.2
Centro Sur	1.5	1.3	0.3	1.3	0.7	--	4.4	1.5	0.7
Sur	1.6	0.6	--	2.1	0.8	0.2	3.1	1.3	0.2
Nacional	2.0	0.8	0.3	2.4	0.7	0.3	5.3	1.1	0.6

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD13

	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	6.0	5.2	1.1	8.2	5.7	1.2	14.2	7.1	2.0
Noroccidental	6.5	4.8	2.2	9.1	5.7	1.8	14.4	6.1	3.7
Nororiental	6.2	4.5	0.4	10.6	6.9	1.5	12.6	4.6	1.1
Occidental	5.1	3.6	1.1	9.6	6.5	0.9	17.0	9.6	3.6
Centro	5.3	2.8	0.6	8.9	4.7	2.6	11.4	4.0	0.8
Ciudad de México	9.3	5.2	1.5	11.2	5.0	1.2	15.7	3.4	1.2
Centro Sur	4.0	2.9	0.3	7.6	5.2	0.7	10.7	4.5	1.1
Sur	4.1	3.0	0.3	5.3	3.1	0.2	11.5	4.9	0.7
Nacional	5.5	3.6	0.8	8.7	5.2	1.5	12.8	5.2	1.5

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD14

	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	4.8	3.3	0.7	5.4	2.6	1.1	11.3	3.2	1.5
Noroccidental	3.8	2.4	1.3	6.5	2.4	0.6	11.2	3.4	2.3
Nororiental	4.2	2.5	0.3	9.4	4.9	2.1	10.8	3.0	1.1
Occidental	3.6	2.0	1.1	5.8	2.5	0.9	14.3	4.9	2.0
Centro	3.7	2.2	0.5	5.7	2.5	1.3	10.7	2.6	0.9
Ciudad de México	6.7	1.7	0.9	6.4	1.6	0.6	14.8	3.1	1.0
Centro Sur	2.6	2.1	0.2	5.1	2.8	0.4	8.4	3.0	1.1
Sur	3.0	1.8	0.2	4.1	2.2	0.3	8.6	3.5	0.4
Nacional	3.8	2.2	0.6	5.9	2.7	0.9	10.9	3.2	1.2

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD15

	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	5.1	4.9	1.1	8.3	7.5	0.9	12.1	9.5	2.0
Noroccidental	7.4	5.6	2.5	10.3	7.5	2.7	12.6	6.5	3.6
Nororiental	6.1	5.1	0.2	8.3	7.4	0.4	9.5	4.8	0.4
Occidental	5.2	3.9	0.4	10.9	10.4	0.9	13.6	11.2	4.1
Centro	5.2	2.1	0.5	8.7	4.9	2.8	8.0	4.1	0.8
Ciudad de México	11.2	8.2	2.3	13.4	7.2	1.3	11.3	2.7	1.0
Centro Sur	4.4	2.8	0.5	6.7	5.9	0.7	9.1	4.6	0.7
Sur	4.0	3.2	0.2	4.9	2.9	--	9.6	4.3	0.8
Nacional	5.8	3.8	0.8	8.7	6.2	1.5	10.0	5.4	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD16

	2008			Encuestas Nacionales 2011			2016		
	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico	Mariguana	Cocaína	Estimulantes tipo anfetamínico
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	4.7	3.2	0.4	5.4	3.4	0.4	6.5	4.1	0.1
Noroccidental	5.4	3.6	1.0	7.0	6.0	1.1	8.3	4.4	1.4
Nororiental	4.5	2.1	0.4	5.4	3.3	0.6	6.1	2.6	0.2
Occidental	3.9	1.8	0.1	6.0	2.7	0.2	7.6	4.6	0.6
Centro	3.2	1.4	0.2	3.0	1.0	0.4	5.8	1.9	0.1
Ciudad de México	4.5	1.9	--	4.3	1.4	0.1	4.8	3.2	0.6
Centro Sur	2.5	1.0	0.1	5.8	3.1	0.4	4.7	2.8	0.4
Sur	4.0	1.3	0.1	5.1	2.0	--	7.2	2.9	0.1
Nacional	3.8	1.8	0.3	4.8	2.5	0.4	6.1	3.0	0.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD17

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.5	2.3	0.7	2.0	1.6	0.6	3.8	3.3	0.8
Noroccidental	2.8	2.5	0.3	2.9	2.8	0.5	3.6	3.5	0.6
Nororiental	2.0	1.8	0.2	3.1	2.4	1.2	2.7	2.4	0.4
Occidental	1.1	0.9	0.4	2.0	1.5	0.6	4.5	4.1	0.6
Centro	1.3	1.2	0.2	1.5	1.2	0.3	2.6	2.4	0.4
Ciudad de México	2.2	1.8	0.5	2.1	1.7	0.4	2.9	2.7	0.2
Centro Sur	1.3	1.0	0.4	1.5	1.3	0.1	2.6	2.1	0.7
Sur	1.1	0.8	0.4	0.8	0.6	0.2	2.2	2.0	0.3
Nacional	1.6	1.4	0.3	1.8	1.5	0.4	2.9	2.7	0.5

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD18

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	3.9	3.7	0.9	3.2	3.0	0.5	5.7	5.3	0.7
Noroccidental	4.2	4.1	0.4	5.3	5.3	0.8	6.2	6.0	0.9
Nororiental	3.7	3.5	0.4	5.3	4.5	1.7	3.7	3.4	0.4
Occidental	1.6	1.5	0.4	3.2	2.7	0.7	6.8	6.6	0.7
Centro	1.9	1.9	0.1	2.1	1.7	0.4	4.1	4.0	0.5
Ciudad de México	2.9	2.6	0.7	3.3	2.6	0.7	4.9	4.7	0.3
Centro Sur	2.2	1.9	0.5	2.7	2.7	--	4.1	3.5	1.0
Sur	1.5	1.3	0.2	1.0	0.9	0.1	3.5	3.4	0.3
Nacional	2.5	2.3	0.4	3.0	2.6	0.5	4.6	4.4	0.6

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD19

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	1.2	1.0	0.5	1.0	0.3	0.6	1.9	1.4	0.9
Noroccidental	1.3	1.0	0.3	0.5	0.3	0.2	1.1	1.0	0.2
Nororiental	0.4	0.3	0.1	1.0	0.4	0.6	1.7	1.3	0.5
Occidental	0.6	0.3	0.4	0.9	0.3	0.6	2.2	1.9	0.5
Centro	0.8	0.5	0.2	0.9	0.7	0.3	1.2	1.0	0.3
Ciudad de México	1.5	1.1	0.4	1.0	0.9	0.1	1.1	0.9	0.1
Centro Sur	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	1.3	0.9	0.4
Sur	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.9	0.6	0.3
Nacional	0.8	0.5	0.3	0.7	0.4	0.3	1.3	1.1	0.4

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD20

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.0	2.0	0.5	1.5	1.2	0.6	3.7	3.7	0.4
Noroccidental	1.8	1.7	0.1	2.3	2.3	0.2	3.2	3.1	0.2
Nororiental	1.7	1.5	0.2	4.5	4.0	1.1	3.2	3.2	0.3
Occidental	1.2	1.0	0.3	1.6	1.6	--	3.0	2.8	0.4
Centro	1.6	1.5	0.2	1.1	1.1	--	3.1	2.9	0.5
Ciudad de México	4.0	3.1	0.9	2.6	2.6	--	3.5	3.5	--
Centro Sur	1.6	1.2	0.4	0.5	0.4	0.1	3.1	2.8	0.7
Sur	1.2	1.1	0.1	1.9	1.8	0.1	2.0	1.7	0.3
Nacional	1.7	1.5	0.3	1.6	1.5	0.2	3.1	2.9	0.4

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD21

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	3.1	2.9	0.4	3.1	2.4	0.8	6.2	5.6	1.3
Noroccidental	3.6	3.6	0.2	4.0	3.7	0.4	5.9	5.7	1.1
Nororiental	2.1	2.0	0.3	4.6	3.2	1.6	4.8	4.2	0.8
Occidental	1.8	1.4	0.6	2.6	2.0	0.9	8.4	8.0	1.0
Centro	2.1	1.9	0.3	2.5	2.0	0.7	4.2	3.9	0.7
Ciudad de México	2.7	2.4	0.7	3.8	3.4	0.3	5.0	5.0	0.1
Centro Sur	1.8	1.7	0.5	2.7	2.4	0.3	4.1	3.4	1.0
Sur	1.3	1.2	0.1	0.6	0.5	0.2	3.6	3.4	0.2
Nacional	2.2	2.0	0.4	2.8	2.3	0.6	5.0	4.6	0.8

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD22

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.9	2.9	0.5	2.5	2.1	0.6	5.9	5.8	0.6
Noroccidental	2.9	2.8	0.2	3.5	3.3	0.3	5.8	5.5	1.1
Nororiental	1.7	1.6	0.1	5.7	4.6	1.7	5.0	4.7	0.6
Occidental	1.6	1.5	0.3	2.0	1.7	0.5	7.3	6.9	0.6
Centro	2.3	2.1	0.3	2.7	2.1	0.7	4.4	4.3	0.7
Ciudad de México	3.5	2.9	0.8	3.6	3.3	0.3	7.0	7.0	--
Centro Sur	2.0	1.7	0.6	2.0	1.9	0.1	4.3	3.9	0.7
Sur	1.5	1.4	0.2	1.4	1.3	0.1	3.7	3.6	0.2
Nacional	2.2	2.0	0.4	2.7	2.4	0.5	5.1	4.9	0.6

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD23

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.4	2.1	0.3	2.8	1.9	0.9	4.5	3.6	1.8
Noroccidental	3.4	3.4	0.2	3.7	3.4	0.4	4.0	3.9	0.5
Nororiental	2.4	2.3	0.4	2.4	1.3	1.1	2.8	2.1	0.8
Occidental	1.7	0.9	0.9	3.1	2.3	0.9	5.8	5.6	1.1
Centro	1.3	1.1	0.2	1.1	0.9	0.2	2.8	2.4	0.6
Ciudad de México	2.2	2.2	0.6	3.3	3.1	0.2	1.3	1.3	0.1
Centro Sur	1.2	1.1	0.2	1.9	1.4	0.4	2.7	1.8	1.3
Sur	0.7	0.7	--	0.3	--	0.3	1.8	1.5	0.3
Nacional	1.7	1.5	0.3	1.9	1.5	0.5	3.1	2.6	0.8

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD24

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.2	1.8	1.0	1.3	1.1	0.4	1.5	1.1	0.5
Noroccidental	2.4	1.8	0.6	2.1	2.1	0.8	1.7	1.6	0.2
Nororiental	2.0	1.8	0.3	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.2
Occidental	0.4	0.2	0.1	1.6	0.9	0.6	1.3	1.0	0.4
Centro	0.4	0.3	0.1	0.7	0.5	0.1	0.8	0.8	***
Ciudad de México	1.2	0.9	0.3	0.7	0.2	0.5	1.1	0.8	0.3
Centro Sur	0.7	0.4	0.4	0.8	0.8	--	1.0	0.7	0.3
Sur	0.9	0.2	0.7	0.4	0.1	0.3	0.8	0.6	0.3
Nacional	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.3	1.0	0.8	0.2

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD25

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.7	1.0	1.0	0.8	2.8	1.0
Noroccidental	1.9	0.7	2.3	1.0	3.1	0.7
Nororiental	1.4	0.6	1.9	1.1	1.9	0.6
Occidental	0.7	0.2	1.3	0.5	2.7	1.4
Centro	0.8	0.4	1.0	0.2	2.0	0.7
Ciudad de México	1.7	0.3	1.5	0.1	2.5	0.6
Centro Sur	0.7	0.5	0.9	0.8	1.7	0.7
Sur	0.6	0.3	0.5	0.2	1.5	0.7
Nacional	1.0	0.4	1.2	0.5	2.1	0.8

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD26

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	2.8	1.5	1.7	1.3	4.6	1.3
Noroccidental	3.0	1.2	4.3	2.0	5.3	1.2
Nororiental	2.6	1.1	3.8	2.2	2.9	0.7
Occidental	1.2	0.4	2.5	0.7	3.7	2.9
Centro	1.3	0.6	1.7	0.2	3.2	1.3
Ciudad de México	2.5	0.6	2.4	0.2	4.3	1.3
Centro Sur	1.2	0.9	1.8	1.6	2.8	1.2
Sur	1.0	0.5	0.8	0.2	2.5	1.3
Nacional	1.7	0.8	2.2	0.9	3.5	1.4

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD27

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	0.6	0.5	0.3	0.2	1.1	0.6
Noroccidental	0.7	0.2	0.2	--	0.8	0.2
Nororiental	0.2	0.1	0.1	--	0.9	0.5
Occidental	0.2	--	0.1	0.3	1.8	***
Centro	0.3	0.2	0.4	0.1	0.8	0.2
Ciudad de México	1.0	--	0.8	0.1	0.9	--
Centro Sur	0.1	0.1	--	0.1	0.7	0.3
Sur	0.2	0.1	0.3	0.1	0.5	0.2
Nacional	0.4	0.1	0.3	0.1	0.9	0.2

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD28

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.7	0.1	0.8	0.3	3.2	0.8
Noroccidental	1.5	0.1	2.3	--	3.0	0.5
Nororiental	1.1	0.5	3.2	1.0	2.7	0.4
Occidental	0.7	0.1	1.4	0.8	2.6	0.2
Centro	1.0	0.5	1.0	0.3	2.6	0.7
Ciudad de México	2.8	0.2	2.1	0.3	3.2	0.2
Centro Sur	1.0	0.5	0.2	0.2	2.6	0.9
Sur	0.8	0.3	1.6	0.8	1.4	0.5
Nacional	1.2	0.4	1.3	0.4	2.6	0.6

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD29

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	2.1	1.5	1.4	1.2	4.9	1.6
Noroccidental	2.5	1.1	2.9	1.4	4.8	1.2
Nororiental	1.2	1.0	2.8	1.6	3.2	1.2
Occidental	1.2	0.4	1.6	0.8	5.0	3.1
Centro	1.2	0.6	1.8	0.3	3.1	1.2
Ciudad de México	2.4	0.5	3.1	0.1	4.6	1.1
Centro Sur	1.0	0.8	1.5	1.6	2.5	1.3
Sur	0.9	0.4	0.5	--	2.6	1.4
Nacional	1.4	0.7	1.9	0.8	3.5	1.5

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD30

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína	Mariguana	Cocaína
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.4	1.2	1.4	0.9	5.1	1.3
Noroccidental	2.3	0.5	2.8	0.7	5.3	1.2
Nororiental	1.3	0.5	4.0	1.5	3.8	1.0
Occidental	1.1	0.3	1.2	0.7	5.4	1.6
Centro	1.4	0.6	1.9	0.4	3.4	1.1
Ciudad de México	2.7	0.3	2.9	0.1	6.6	1.5
Centro Sur	1.1	0.9	1.4	1.2	3.0	1.7
Sur	1.0	0.5	1.2	0.4	2.8	1.3
Nacional	1.5	0.6	2.0	0.7	4.0	1.3

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD31

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.2	1.0	0.7	1.1	2.9	1.6
Noroccidental	1.9	1.3	2.5	1.7	2.6	0.7
Nororiental	1.0	1.5	1.0	1.3	1.4	1.0
Occidental	0.9	0.3	2.3	0.9	2.0	3.6
Centro	0.6	0.5	0.9	--	2.1	0.9
Ciudad de México	2.2	0.6	2.8	0.3	1.0	0.1
Centro Sur	0.8	0.3	0.3	1.1	1.6	0.1
Sur	0.7	0.3	--	--	1.0	0.7
Nacional	1.0	0.6	1.2	0.6	1.8	1.0

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD32

Región	2008		Encuestas Nacionales 2011		2016	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.3	0.8	0.8	0.5	0.7	0.4
Noroccidental	1.4	0.5	1.7	1.1	1.4	0.3
Nororiental	1.7	0.3	0.7	0.7	0.4	0.2
Occidental	0.2	--	0.9	0.1	0.6	0.3
Centro	0.2	0.1	0.3	--	0.7	0.3
Ciudad de México	0.7	0.1	0.2	0.1	0.7	0.3
Centro Sur	0.2	0.1	0.6	0.3	0.6	0.2
Sur	0.1	0.1	0.1	--	0.4	0.2
Nacional	0.6	0.2	0.6	0.3	0.7	0.3

Cocaína también incluye crack.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD33

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	1.4	1.2	0.2	1.1	0.9	0.3	2.4	2.3	0.4
Noroccidental	1.9	1.7	0.2	2.0	1.9	0.4	2.4	2.3	0.2
Nororiental	1.6	1.6	0.2	1.4	1.3	0.3	1.3	1.3	0.1
Occidental	0.7	0.6	0.1	1.3	0.9	0.5	2.6	2.5	0.2
Centro	0.8	0.7	0.1	0.6	0.4	0.1	1.2	1.1	0.2
Ciudad de México	1.5	1.3	0.2	1.5	1.3	0.2	1.6	1.5	0.2
Centro Sur	0.7	0.6	0.2	0.6	0.5	0.1	1.3	1.0	0.3
Sur	0.5	0.3	0.1	0.5	0.4	***	0.9	0.8	0.1
Nacional	1.0	0.9	0.1	1.0	0.8	0.2	1.5	1.4	0.2

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD34

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	2.2	2.0	0.3	1.9	1.8	0.2	3.9	3.9	0.2
Noroccidental	3.1	3.0	0.2	3.9	3.9	0.7	4.3	4.3	0.4
Nororiental	3.0	2.9	0.3	2.6	2.6	0.4	1.9	1.8	0.2
Occidental	1.2	1.1	0.2	2.3	1.8	0.5	4.3	4.2	0.3
Centro	1.2	1.2	--	1.0	0.7	0.3	2.3	2.2	0.4
Ciudad de México	2.0	1.7	0.2	2.4	2.0	0.4	2.8	2.6	0.2
Centro Sur	1.3	1.2	0.3	1.1	1.1	--	2.3	1.9	0.5
Sur	0.7	0.6	0.1	0.8	0.8	--	1.5	1.5	0.1
Nacional	1.7	1.6	0.2	1.7	1.5	0.3	2.7	2.6	0.3

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIONES

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD35

Región	Encuestas Nacionales								
	Cualquier droga %	2008 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2011 Drogas ilegales %	Drogas médicas %	Cualquier droga %	2016 Drogas ilegales %	Drogas médicas %
Norcentral	0.7	0.5	0.2	0.4	***	0.4	0.9	0.7	0.5
Noroccidental	0.7	0.5	0.3	--	--	--	0.4	0.4	0.1
Nororiental	0.3	0.3	--	0.1	--	0.1	0.8	0.8	0.1
Occidental	0.2	0.1	--	0.4	--	0.4	1.0	0.9	0.1
Centro	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	--	0.2	0.1	***
Ciudad de México	1.0	0.9	0.2	0.6	0.6	0.1	0.6	0.4	0.1
Centro Sur	0.2	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.3	0.2	0.1
Sur	0.2	--	0.2	0.2	0.1	***	0.3	0.2	0.1
Nacional	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	0.1

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 4: INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Listado de Tablas

Uso de los Intervalos de Confianza

Consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en la población de 12 a 17 años

Consumo de drogas en la población de 18 a 34 años

Consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

Consumo de drogas en la población de 12 a 25 años

Consumo de drogas en la población de 26 a 34 años

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 17 años

Consumo de drogas en la población masculina de 18 a 34 años

Consumo de drogas en la población masculina de 35 a 65 años

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 17 años

Consumo de drogas en la población femenina de 18 a 34 años

Consumo de drogas en la población femenina de 35 a 65 años

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 25 años

Consumo de drogas en la población masculina de 26 a 34 años

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 25 años

Consumo de drogas en la población femenina de 26 a 34 años

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de anfetaminas alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de anfetaminas alguna vez en el cuadro de POBLACIÓN MASCULINA que en este caso sería 0.5% e IC 0.308-0.675; después se busca el dato de anfetaminas alguna vez en el cuadro de POBLACIÓN FEMENINA que es de 0.2% e IC 0.138-0.318. Se observan los intervalos de confianza para identificar si estos se sobrelapan o no.

Aquí se observa que ambos intervalos comparten una amplia franja de valores, por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de anfetaminas es igual en ambos sexos. Si los intervalos de confianza no se sobrelapan, entonces podemos decir que sus prevalencias no son iguales y observar cuál es el que tiene la mayor prevalencia.

Para que tenga sentido el uso de los intervalos de confianza, las poblaciones a comparar deben ser similares, por ejemplo la población de 12 a 17 años de un Estado con la población de 12 a 17 años de otro, el total de un Estado con otro, hombres y mujeres del mismo Estado y grupo de edad.

Es importante mencionar que cuando los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta. Cuando el porcentaje obtenido es cero, se muestran dos guiones.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICD1

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.067-0.180
Tranquilizantes	0.9	0.759-1.026
Sedantes	0.1	0.060-0.137
Anfetaminas	0.4	0.255-0.456
Mariguana	8.6	8.184-9.114
Cocaína	3.5	3.231-3.819
Crack	0.9	0.736-0.991
Alucinógenos	0.7	0.542-0.825
Inhalables	1.1	0.942-1.287
Heroína, opio	0.2	0.097-0.244
Estimulantes tipo anfetamínico	0.9	0.731-1.013
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.3	0.190-0.343
Cualquier droga	10.3	9.788-10.813
Drogas Médicas	1.3	1.119-1.455
Drogas Ilegales	9.9	9.372-10.391
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.010-0.049
Tranquilizantes	0.3	0.224-0.377
Sedantes	***	0.014-0.071
Anfetaminas	0.2	0.097-0.272
Mariguana	2.1	1.911-2.362
Cocaína	0.8	0.632-0.971
Crack	0.2	0.112-0.240
Alucinógenos	0.2	0.086-0.233
Inhalables	0.2	0.178-0.318
Heroína, opio	***	0.006-0.049
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.178-0.309
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	2.9	2.670-3.216
Drogas Médicas	0.5	0.370-0.596
Drogas Ilegales	2.7	2.417-2.947

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICD2

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.096-0.325
Tranquilizantes	1.1	0.928-1.329
Sedantes	0.1	0.079-0.215
Anfetaminas	0.5	0.308-0.675
Mariguana	14.0	13.130-14.804
Cocaína	6.2	5.624-6.727
Crack	1.5	1.295-1.793
Alucinógenos	1.0	0.756-1.228
Inhalables	1.7	1.399-2.021
Heroína, opio	0.3	0.189-0.494
Estimulantes tipo anfetamínico	1.4	1.154-1.595
Otras drogas	***	0.002-0.030
Mariguana sintética	0.5	0.316-0.617
Cualquier droga	16.2	15.240-17.062
Drogas Médicas	1.7	1.402-1.955
Drogas Ilegales	15.8	14.938-16.757
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	0.012-0.091
Tranquilizantes	0.3	0.230-0.440
Sedantes	0.1	0.015-0.122
Anfetaminas	0.3	0.085-0.417
Mariguana	3.5	3.032-3.871
Cocaína	1.4	1.055-1.729
Crack	0.3	0.165-0.406
Alucinógenos	0.2	0.132-0.296
Inhalables	0.4	0.263-0.523
Heroína, opio	0.1	0.008-0.098
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.271-0.510
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	4.6	4.139-5.160
Drogas Médicas	0.6	0.410-0.796
Drogas Ilegales	4.4	3.897-4.906

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICD3

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	0.020-0.065
Tranquilizantes	0.7	0.502-0.842
Sedantes	0.1	0.014-0.094
Anfetaminas	0.2	0.138-0.318
Mariguana	3.7	3.276-4.091
Cocaína	1.1	0.856-1.244
Crack	0.2	0.145-0.312
Alucinógenos	0.4	0.232-0.559
Inhalables	0.6	0.394-0.722
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.243-0.562
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.1	0.032-0.126
Cualquier droga	4.8	4.382-5.293
Drogas Médicas	0.9	0.732-1.111
Drogas Ilegales	4.3	3.869-4.753
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.018
Tranquilizantes	0.3	0.158-0.380
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.055-0.189
Mariguana	0.9	0.710-1.107
Cocaína	0.2	0.157-0.342
Crack	0.1	0.024-0.124
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.1	0.054-0.173
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.044-0.169
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	1.3	1.113-1.585
Drogas Médicas	0.4	0.247-0.494
Drogas Ilegales	1.1	0.867-1.286

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICD4

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.019-0.173
Tranquilizantes	0.4	0.246-0.626
Sedantes	0.1	0.003-0.165
Anfetaminas	0.1	0.002-0.250
Mariguana	5.3	4.562-6.068
Cocaína	1.1	0.805-1.345
Crack	0.4	0.211-0.547
Alucinógenos	0.3	0.181-0.466
Inhalables	1.3	0.935-1.718
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.6	0.243-0.955
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.4	0.223-0.535
Cualquier droga	6.4	5.365-7.352
Drogas Médicas	0.6	0.386-0.807
Drogas Ilegales	6.2	5.211-7.191
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.127-0.420
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	2.6	2.194-3.011
Cocaína	0.6	0.381-0.800
Crack	0.3	0.109-0.424
Alucinógenos	0.2	0.084-0.259
Inhalables	0.6	0.389-0.759
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.102-0.378
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	3.1	2.619-3.483
Drogas Médicas	0.4	0.233-0.588
Drogas Ilegales	2.9	2.469-3.308

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICD5

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.056-0.317
Tranquilizantes	1.3	1.076-1.622
Sedantes	0.1	0.063-0.204
Anfetaminas	0.6	0.333-0.790
Mariguana	12.8	11.891-13.684
Cocaína	5.2	4.542-5.801
Crack	1.4	1.086-1.645
Alucinógenos	1.2	0.828-1.480
Inhalables	1.6	1.248-1.977
Heroína, opio	0.3	0.131-0.434
Estimulantes tipo anfetamínico	1.5	1.219-1.826
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.5	0.290-0.640
Cualquier droga	15.0	14.007-15.964
Drogas Médicas	1.9	1.583-2.306
Drogas Ilegales	14.5	13.541-15.493
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.088
Tranquilizantes	0.5	0.307-0.642
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.3	0.132-0.542
Mariguana	3.5	3.027-4.033
Cocaína	1.5	1.065-1.862
Crack	0.3	0.135-0.413
Alucinógenos	0.3	0.130-0.482
Inhalables	0.3	0.182-0.486
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.285-0.586
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	5.0	4.347-5.582
Drogas Médicas	0.8	0.530-1.049
Drogas Ilegales	4.6	3.992-5.205

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICD6

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.034-0.118
Tranquilizantes	0.6	0.501-0.797
Sedantes	0.1	0.018-0.125
Anfetaminas	0.3	0.166-0.342
Mariguana	6.1	5.534-6.722
Cocaína	3.0	2.622-3.294
Crack	0.6	0.456-0.722
Alucinógenos	0.4	0.270-0.509
Inhalables	0.6	0.408-0.736
Heroína, opio	0.1	0.021-0.216
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.278-0.477
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	***	0.012-0.065
Cualquier droga	7.5	6.891-8.132
Drogas Médicas	0.9	0.775-1.122
Drogas Ilegales	7.0	6.426-7.648
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.028
Tranquilizantes	0.2	0.088-0.214
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.018-0.129
Mariguana	0.7	0.510-0.831
Cocaína	0.3	0.168-0.378
Crack	0.1	0.011-0.090
Alucinógenos	***	---
Inhalables	***	0.013-0.073
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.034-0.101
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	1.0	0.847-1.225
Drogas Médicas	0.2	0.146-0.309
Drogas Ilegales	0.8	0.666-1.004

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICD7

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.023-0.239
Tranquilizantes	0.8	0.640-1.060
Sedantes	0.1	0.057-0.202
Anfetaminas	0.4	0.172-0.606
Mariguana	10.9	10.017-11.706
Cocaína	3.2	2.693-3.692
Crack	0.9	0.668-1.151
Alucinógenos	1.0	0.636-1.293
Inhalables	1.7	1.346-2.020
Heroína, opio	0.2	0.047-0.278
Estimulantes tipo anfetamínico	1.2	0.884-1.426
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.6	0.419-0.808
Cualquier droga	12.4	11.467-13.343
Drogas Médicas	1.3	1.001-1.624
Drogas Ilegales	12.2	11.246-13.117
Consumo último año		
Opiáceos	***	0.001-0.095
Tranquilizantes	0.3	0.211-0.445
Sedantes	0.1	0.007-0.113
Anfetaminas	0.3	0.075-0.484
Mariguana	4.0	3.486-4.504
Cocaína	1.3	0.951-1.687
Crack	0.3	0.182-0.500
Alucinógenos	0.3	0.135-0.506
Inhalables	0.5	0.369-0.698
Heroína, opio	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.264-0.515
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	5.1	4.478-5.677
Drogas Médicas	0.6	0.396-0.858
Drogas Ilegales	4.9	4.260-5.451

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICD8

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.032-0.398
Tranquilizantes	1.5	1.093-1.946
Sedantes	0.1	0.021-0.177
Anfetaminas	0.5	0.271-0.762
Mariguana	10.0	8.934-11.095
Cocaína	5.4	4.595-6.274
Crack	1.4	1.015-1.764
Alucinógenos	0.8	0.538-1.059
Inhalables	1.2	0.724-1.732
Heroína, opio	0.3	0.080-0.524
Estimulantes tipo anfetamínico	1.4	0.970-1.891
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.1	0.023-0.185
Cualquier droga	12.5	11.278-13.669
Drogas Médicas	2.0	1.505-2.484
Drogas Ilegales	11.8	10.614-12.989
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.6	0.293-0.873
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.2	0.062-0.434
Mariguana	1.8	1.336-2.315
Cocaína	1.0	0.538-1.428
Crack	0.1	0.062-0.215
Alucinógenos	0.2	0.061-0.263
Inhalables	0.2	0.005-0.309
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.127-0.584
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	3.1	2.426-3.742
Drogas Médicas	0.8	0.446-1.103
Drogas Ilegales	2.6	2.000-3.233

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 17 años

Cuadro ICD9

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.4	0.167-0.535
Sedantes	0.1	0.003-0.143
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	5.8	4.965-6.681
Cocaína	1.0	0.733-1.284
Crack	0.4	0.201-0.571
Alucinógenos	0.4	0.184-0.582
Inhalables	1.2	0.725-1.675
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.227-0.606
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.5	0.282-0.661
Cualquier droga	6.6	5.567-7.697
Drogas Médicas	0.5	0.288-0.747
Drogas Ilegales	6.6	5.507-7.633
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.065-0.272
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	3.1	2.492-3.696
Cocaína	0.6	0.396-0.840
Crack	0.3	0.113-0.445
Alucinógenos	0.3	0.098-0.408
Inhalables	0.6	0.390-0.822
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.079-0.324
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	3.4	2.822-4.058
Drogas Médicas	0.3	0.127-0.418
Drogas Ilegales	3.4	2.810-4.046

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población masculina de 18 a 34 años

Cuadro ICD10

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.4	0.098-0.636
Tranquilizantes	1.7	1.278-2.090
Sedantes	0.2	0.083-0.324
Anfetaminas	0.8	0.384-1.250
Mariguana	20.0	18.381-21.597
Cocaína	8.9	7.697-10.083
Crack	2.4	1.877-2.974
Alucinógenos	1.6	1.048-2.127
Inhalables	2.6	1.918-3.253
Heroína, opio	0.6	0.256-0.880
Estimulantes tipo anfetamínico	2.5	2.004-3.009
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.9	0.514-1.232
Cualquier droga	22.8	21.102-24.581
Drogas Médicas	2.5	1.943-3.145
Drogas Ilegales	22.6	20.824-24.299
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.6	0.364-0.843
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.5	0.106-0.914
Mariguana	5.9	4.973-6.847
Cocaína	2.6	1.836-3.434
Crack	0.5	0.205-0.765
Alucinógenos	0.4	0.197-0.561
Inhalables	0.6	0.319-0.921
Heroína, opio	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.7	0.453-1.023
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	8.2	7.022-9.352
Drogas Médicas	1.1	0.643-1.564
Drogas Ilegales	7.8	6.644-8.957

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población masculina de 35 a 65 años

Cuadro ICD11

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.023-0.174
Tranquilizantes	0.9	0.658-1.199
Sedantes	0.1	0.014-0.234
Anfetaminas	0.4	0.212-0.521
Mariguana	11.7	10.494-12.870
Cocaína	5.8	5.085-6.446
Crack	1.2	0.916-1.475
Alucinógenos	0.7	0.463-0.907
Inhalables	1.1	0.769-1.429
Heroína, opio	0.3	0.044-0.457
Estimulantes tipo anfetamínico	0.7	0.518-0.898
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.1	0.025-0.138
Cualquier droga	13.8	12.581-15.034
Drogas Médicas	1.3	1.029-1.664
Drogas Ilegales	13.4	12.160-14.601
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.062-0.241
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.006-0.197
Mariguana	1.3	0.966-1.612
Cocaína	0.5	0.326-0.765
Crack	0.1	0.019-0.184
Alucinógenos	***	---
Inhalables	0.1	0.028-0.154
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.072-0.213
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	1.8	1.461-2.189
Drogas Médicas	0.3	0.137-0.403
Drogas Ilegales	1.6	1.268-1.952

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 17 años

Cuadro ICD12

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.004-0.129
Tranquilizantes	0.5	0.207-0.839
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	---
Mariguana	4.8	3.659-5.931
Cocaína	1.1	0.676-1.610
Crack	0.4	0.088-0.655
Alucinógenos	0.3	0.058-0.467
Inhalables	1.5	0.818-2.094
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	0.094-1.478
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.3	0.035-0.534
Cualquier droga	6.1	4.632-7.527
Drogas Médicas	0.7	0.342-1.014
Drogas Ilegales	5.8	4.380-7.266
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.4	0.104-0.657
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	---
Mariguana	2.1	1.526-2.674
Cocaína	0.6	0.202-0.922
Crack	0.3	---
Alucinógenos	0.1	0.010-0.166
Inhalables	0.5	0.240-0.844
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.3	0.031-0.530
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	2.7	2.030-3.278
Drogas Médicas	0.6	0.226-0.879
Drogas Ilegales	2.3	1.750-2.923

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población femenina de 18 a 34 años

Cuadro ICD13

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	1.0	0.658-1.413
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.3	0.145-0.501
Mariguana	6.1	5.182-6.934
Cocaína	1.7	1.283-2.112
Crack	0.4	0.203-0.549
Alucinógenos	0.7	0.367-1.131
Inhalables	0.7	0.397-1.010
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.6	0.318-0.889
Otras drogas	0.1	---
Mariguana sintética	0.1	0.022-0.146
Cualquier droga	7.6	6.696-8.591
Drogas Médicas	1.4	0.965-1.805
Drogas Ilegales	7.0	6.082-7.915
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.4	0.117-0.591
Sedantes	--	---
Anfetaminas	0.2	0.058-0.293
Mariguana	1.3	0.874-1.738
Cocaína	0.4	0.190-0.547
Crack	0.1	0.015-0.139
Alucinógenos	0.2	---
Inhalables	0.1	---
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.034-0.274
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	2.0	1.443-2.464
Drogas Médicas	0.5	0.236-0.756
Drogas Ilegales	1.6	1.146-2.066

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población femenina de 35 a 65 años

Cuadro ICD14

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.014-0.097
Tranquilizantes	0.4	0.256-0.538
Sedantes	***	0.003-0.048
Anfetaminas	0.2	0.063-0.242
Mariguana	1.1	0.869-1.385
Cocaína	0.4	0.277-0.583
Crack	***	0.016-0.070
Alucinógenos	0.1	0.015-0.232
Inhalables	0.1	0.003-0.193
Heroína, opio	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.023-0.138
Otras drogas	--	---
Mariguana sintética	--	---
Cualquier droga	1.8	1.517-2.169
Drogas Médicas	0.6	0.425-0.756
Drogas Ilegales	1.3	1.055-1.596
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.062-0.240
Sedantes	***	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	0.1	0.021-0.207
Cocaína	***	0.003-0.052
Crack	***	---
Alucinógenos	--	---
Inhalables	--	---
Heroína, opio	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	---
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	0.3	0.187-0.465
Drogas Médicas	0.2	0.090-0.289
Drogas Ilegales	0.1	0.041-0.233

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población masculina de 12 a 25 años

Cuadro ICD15

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.015-0.435
Tranquilizantes	1.0	0.727-1.260
Sedantes	0.2	0.058-0.271
Anfetaminas	0.6	0.162-0.972
Mariguana	14.5	13.143-15.834
Cocaína	4.7	3.794-5.576
Crack	1.4	0.963-1.840
Alucinógenos	1.2	0.728-1.759
Inhalables	2.0	1.487-2.492
Heroína, opio	0.3	0.081-0.532
Estimulantes tipo anfetamínico	1.5	1.146-1.825
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	1.0	0.643-1.372
Cualquier droga	16.2	14.705-17.618
Drogas Médicas	1.7	1.171-2.197
Drogas Ilegales	16.0	14.539-17.451
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.4	0.210-0.551
Sedantes	0.1	0.002-0.169
Anfetaminas	0.4	0.004-0.765
Mariguana	5.8	4.956-6.711
Cocaína	2.1	1.377-2.743
Crack	0.5	0.207-0.773
Alucinógenos	0.4	0.201-0.560
Inhalables	0.7	0.460-1.020
Heroína, opio	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.5	0.340-0.742
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	7.4	6.342-8.451
Drogas Médicas	0.8	0.397-1.226
Drogas Ilegales	7.2	6.137-8.239

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población masculina de 26 a 34 años

Cuadro ICD16

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.4	0.039-0.842
Tranquilizantes	1.9	1.189-2.587
Sedantes	0.2	0.017-0.308
Anfetaminas	0.6	0.234-1.005
Mariguana	18.2	16.001-20.355
Cocaína	10.4	8.725-11.998
Crack	2.7	1.895-3.439
Alucinógenos	1.2	0.716-1.616
Inhalables	2.5	1.454-3.612
Heroína, opio	0.6	0.143-1.117
Estimulantes tipo anfetamínico	2.7	1.853-3.533
Otras drogas	***	---
Mariguana sintética	0.2	0.021-0.365
Cualquier droga	21.6	19.301-23.910
Drogas Médicas	2.4	1.657-3.229
Drogas Ilegales	21.3	18.991-23.591
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.7	0.278-1.053
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.3	---
Mariguana	3.3	2.348-4.348
Cocaína	1.9	0.977-2.874
Crack	0.3	0.111-0.439
Alucinógenos	0.3	0.074-0.432
Inhalables	0.3	0.012-0.682
Heroína, opio	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.6	0.179-1.109
Otras drogas	--	---
Cualquier droga	5.3	3.990-6.611
Drogas Médicas	0.9	0.428-1.434
Drogas Ilegales	4.9	3.609-6.173

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población femenina de 12 a 25 años

Cuadro ICD17

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	0.005-0.063
Tranquilizantes	0.7	0.376-1.027
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	0.068-0.342
Mariguana	7.1	6.088-8.130
Cocaína	1.6	1.232-2.065
Crack	0.4	0.217-0.585
Alucinógenos	0.7	0.271-1.081
Inhalables	1.4	0.925-1.807
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	0.395-1.231
Otras drogas	0.1	---
Mariguana sintética	0.2	0.075-0.336
Cualquier droga	8.5	7.389-9.647
Drogas Médicas	0.9	0.583-1.273
Drogas Ilegales	8.2	7.110-9.360
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.113-0.435
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.2	0.038-0.304
Mariguana	2.1	1.582-2.604
Cocaína	0.6	0.317-0.788
Crack	0.2	0.047-0.327
Alucinógenos	0.3	---
Inhalables	0.3	0.153-0.486
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.084-0.382
Otras drogas	***	---
Cualquier droga	2.7	2.125-3.231
Drogas Médicas	0.4	0.242-0.631
Drogas Ilegales	2.4	1.903-2.979

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS

Consumo de drogas en la población femenina de 26 a 34 años

Cuadro ICD18

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	1.2	0.679-1.747
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.4	0.114-0.748
Mariguana	3.2	2.510-3.970
Cocaína	1.3	0.838-1.855
Crack	0.3	0.081-0.577
Alucinógenos	0.5	0.193-0.795
Inhalables	0.1	0.019-0.271
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.109-0.658
Otras drogas	--	---
Mariguana sintética	***	---
Cualquier droga	4.9	3.973-5.818
Drogas Médicas	1.6	1.021-2.224
Drogas Ilegales	3.9	3.138-4.716
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.5	0.089-0.940
Sedantes	--	---
Anfetaminas	0.2	0.007-0.384
Mariguana	0.6	0.238-0.887
Cocaína	0.2	0.019-0.383
Crack	***	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	--	---
Heroína, opio	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otras drogas	---	---
Cualquier droga	1.2	0.717-1.772
Drogas Médicas	0.6	0.206-1.082
Drogas Ilegales	0.7	0.381-1.077

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 5: INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Listado de Tablas

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (1)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años (2)
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (1)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años (2)
Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años (2)

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años (2)

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años (1)

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años (2)

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED1

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	11.8	9.723-13.932	11.1	9.072-13.124	2.0	1.258-2.786
Baja California	13.8	11.803-15.754	13.5	11.538-15.514	1.9	1.083-2.802
Baja California Sur	11.1	9.099-13.201	10.9	8.874-13.000	1.1	0.604-1.694
Campeche	11.8	9.328-14.337	11.5	8.981-13.972	0.7	0.154-1.225
Chiapas	5.8	4.170-7.455	5.8	4.134-7.404	0.2	---
Chihuahua	12.2	10.149-14.174	11.7	9.738-13.725	2.1	1.251-3.047
Ciudad de México	10.6	8.355-12.906	10.3	8.021-12.543	0.7	0.282-1.047
Coahuila	11.4	9.215-13.499	10.8	8.615-12.924	1.4	0.682-2.125
Colima	12.4	10.185-14.700	12.0	9.761-14.142	2.0	0.994-3.015
Durango	10.5	8.583-12.396	9.5	7.706-11.305	2.0	1.214-2.784
Estado de México	10.0	7.936-12.150	9.7	7.597-11.859	0.9	0.305-1.582
Guanajuato	10.0	8.091-11.836	9.6	7.764-11.476	1.3	0.646-1.968
Guerrero	7.8	5.930-9.586	7.5	5.656-9.293	0.8	0.227-1.292
Hidalgo	7.9	6.155-9.710	7.6	5.848-9.341	0.8	0.310-1.390
Jalisco	16.0	12.831-19.255	15.3	12.124-18.537	2.2	1.173-3.290
Michoacán	9.2	7.500-10.892	9.0	7.256-10.644	1.5	0.808-2.120
Morelos	7.5	5.556-9.518	7.5	5.493-9.449	0.7	---
Nayarit	13.2	10.916-15.512	12.3	10.053-14.453	2.6	1.066-4.206
Nuevo León	11.4	9.002-13.719	10.6	8.313-12.894	1.6	0.548-2.610
Oaxaca	6.9	5.319-8.572	6.6	4.964-8.156	0.7	0.087-1.242
Puebla	7.9	5.608-10.126	7.5	5.243-9.720	1.3	0.470-2.220
Querétaro	12.3	10.105-14.490	12.1	9.921-14.262	1.2	0.514-1.793
Quintana Roo	15.5	12.315-18.719	14.9	11.800-17.917	1.4	0.835-1.996
San Luis Potosí	7.7	6.112-9.340	7.5	5.927-9.146	0.7	0.202-1.260
Sinaloa	9.4	7.726-11.170	9.4	7.657-11.094	1.5	0.785-2.122
Sonora	10.9	8.849-12.866	10.3	8.349-12.226	1.3	0.606-2.000
Tabasco	10.8	8.957-12.544	10.4	8.624-12.192	0.8	0.376-1.243
Tamaulipas	10.3	8.662-11.942	10.0	8.319-11.604	1.4	0.775-2.035
Tlaxcala	7.1	5.385-8.893	6.8	5.071-8.521	0.6	0.186-1.011
Veracruz	9.2	7.329-11.142	8.5	6.666-10.295	1.9	0.997-2.704
Yucatán	11.4	8.814-13.897	10.8	8.281-13.296	1.7	0.438-3.005
Zacatecas	9.9	7.749-11.971	9.5	7.433-11.614	1.4	0.368-2.522
Nacional	10.3	9.788-10.813	9.9	9.372-10.391	1.3	1.119-1.455

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED2

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	18.7	15.009-22.370	17.9	14.279-21.425	2.9	1.517-4.327
Baja California	22.0	18.778-25.194	21.8	18.564-24.990	3.3	1.585-4.959
Baja California Sur	17.3	13.601-20.936	17.3	13.601-20.936	1.6	0.609-2.523
Campeche	19.5	15.452-23.617	19.0	14.979-23.115	0.7	---
Chiapas	8.7	6.090-11.410	8.7	6.090-11.410	0.1	---
Chihuahua	18.9	15.178-22.664	18.4	14.645-22.249	2.4	1.256-3.611
Ciudad de México	17.5	13.499-21.543	17.3	13.315-21.298	0.7	0.134-1.281
Coahuila	17.1	13.339-20.839	16.8	13.081-20.568	1.9	0.755-3.074
Colima	18.7	14.803-22.541	18.4	14.599-22.274	1.7	0.636-2.730
Durango	16.7	13.307-20.175	15.3	12.041-18.520	3.5	1.927-5.126
Estado de México	15.5	11.697-19.357	15.4	11.565-19.230	1.3	0.184-2.494
Guanajuato	15.7	12.498-18.940	15.3	12.076-18.475	1.7	0.687-2.700
Guerrero	13.6	10.013-17.118	13.5	9.920-17.022	0.8	---
Hidalgo	12.3	9.156-15.500	12.0	8.836-15.110	1.3	0.281-2.402
Jalisco	22.8	17.297-28.261	22.1	16.644-27.608	2.3	0.888-3.635
Michoacán	14.3	11.283-17.327	14.1	11.091-17.103	2.2	0.981-3.335
Morelos	12.3	8.473-16.034	12.3	8.473-16.034	1.4	---
Nayarit	21.1	16.944-25.276	20.2	16.165-24.215	3.5	0.392-6.528
Nuevo León	16.6	12.616-20.502	16.3	12.399-20.285	1.5	0.177-2.784
Oaxaca	9.6	6.782-12.379	9.4	6.662-12.144	0.7	---
Puebla	12.4	7.964-16.910	11.8	7.390-16.274	2.4	0.599-4.151
Querétaro	19.2	15.433-22.996	19.1	15.366-22.907	1.7	0.620-2.834
Quintana Roo	23.3	17.959-28.645	23.1	17.781-28.471	1.1	0.428-1.833
San Luis Potosí	12.9	9.824-15.878	12.7	9.697-15.750	1.1	0.052-2.049
Sinaloa	16.7	13.557-19.845	16.6	13.476-19.777	2.4	1.107-3.664
Sonora	16.4	12.746-19.982	15.7	12.262-19.210	1.8	0.562-3.089
Tabasco	19.0	15.642-22.440	18.9	15.516-22.341	1.0	0.339-1.700
Tamaulipas	15.8	12.879-18.700	15.4	12.497-18.347	2.0	0.972-3.114
Tlaxcala	11.6	8.347-14.877	11.1	7.937-14.282	1.0	0.216-1.863
Veracruz	15.0	11.489-18.557	14.7	11.191-18.269	2.2	0.817-3.587
Yucatán	19.3	14.627-23.988	18.9	14.228-23.643	2.4	---
Zacatecas	16.3	12.294-20.208	16.2	12.262-20.171	1.7	---
Nacional	16.2	15.240-17.062	15.8	14.938-16.757	1.7	1.402-1.955

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED3

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.5	3.883-7.164	4.9	3.360-6.426	1.2	0.433-1.957
Baja California	5.4	3.522-7.284	5.1	3.250-6.963	0.6	0.110-1.062
Baja California Sur	4.7	3.255-6.134	4.3	2.856-5.658	0.7	0.210-1.209
Campeche	4.5	2.555-6.422	4.3	2.336-6.180	0.7	0.105-1.339
Chiapas	3.1	1.496-4.724	3.0	1.413-4.638	0.4	---
Chihuahua	5.6	3.599-7.565	5.2	3.328-7.063	1.9	0.496-3.248
Ciudad de México	4.3	2.678-5.972	3.9	2.251-5.460	0.6	0.102-1.149
Coahuila	5.8	3.716-7.794	4.9	2.984-6.718	0.9	---
Colima	6.3	3.623-8.970	5.6	2.942-8.163	2.3	0.473-4.171
Durango	4.6	3.022-6.269	4.1	2.581-5.632	0.6	0.170-0.970
Estado de México	5.0	3.208-6.716	4.5	2.753-6.197	0.6	---
Guanajuato	4.8	3.205-6.395	4.5	2.998-6.094	1.0	0.071-1.849
Guerrero	2.4	1.203-3.684	2.0	0.782-3.192	0.7	0.105-1.296
Hidalgo	4.0	2.343-5.586	3.6	2.044-5.242	0.4	---
Jalisco	9.7	6.127-13.215	8.9	5.361-12.444	2.2	0.689-3.719
Michoacán	4.5	2.841-6.232	4.3	2.592-5.922	0.8	0.116-1.546
Morelos	3.3	1.492-5.028	3.1	1.368-4.900	0.2	---
Nayarit	5.5	3.945-7.114	4.5	3.078-5.977	1.8	0.892-2.776
Nuevo León	6.3	4.135-8.427	5.0	3.095-6.902	1.7	0.517-2.834
Oaxaca	4.6	2.547-6.682	4.0	2.111-5.978	0.6	---
Puebla	3.8	1.977-5.707	3.7	1.810-5.493	0.4	---
Querétaro	6.0	3.971-8.010	5.7	3.662-7.673	0.6	0.036-1.225
Quintana Roo	7.5	5.368-9.573	6.3	4.432-8.192	1.7	0.708-2.713
San Luis Potosí	3.0	1.884-4.114	2.8	1.685-3.821	0.4	---
Sinaloa	2.3	1.044-3.639	2.3	1.005-3.538	0.5	---
Sonora	5.4	3.596-7.148	4.9	3.116-6.604	0.8	0.194-1.370
Tabasco	3.0	1.772-4.241	2.4	1.366-3.533	0.6	0.069-1.158
Tamaulipas	5.0	3.016-6.993	4.7	2.766-6.615	0.8	0.064-1.513
Tlaxcala	3.1	1.563-4.587	2.9	1.378-4.376	0.2	---
Veracruz	3.9	2.509-5.287	2.7	1.699-3.734	1.5	0.513-2.540
Yucatán	3.8	2.168-5.497	3.1	1.575-4.588	1.1	0.353-1.887
Zacatecas	4.0	2.492-5.604	3.4	1.978-4.897	1.2	0.334-2.079
Nacional	4.8	4.382-5.293	4.3	3.869-4.753	0.9	0.732-1.111

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED4

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	8.1	5.248-11.046	8.0	5.186-10.907	0.9	---
Baja California	5.2	2.848-7.630	5.1	2.710-7.497	0.5	---
Baja California Sur	6.2	3.238-9.218	5.5	2.686-8.387	1.0	---
Campeche	6.6	3.931-9.289	6.6	3.931-9.289	0.9	---
Chiapas	2.4	0.998-3.890	2.4	0.998-3.890	0.3	---
Chihuahua	5.9	3.335-8.491	5.9	3.335-8.491	0.4	---
Ciudad de México	7.2	3.963-10.473	7.2	3.963-10.473	--	---
Coahuila	7.1	3.905-10.216	7.1	3.905-10.216	0.3	---
Colima	6.7	1.919-11.565	6.5	1.719-11.369	3.3	---
Durango	5.5	3.004-7.899	5.3	2.933-7.568	0.7	---
Estado de México	10.1	3.974-16.155	9.7	3.616-15.831	0.3	---
Guanajuato	5.9	3.125-8.762	5.9	3.125-8.762	1.8	---
Guerrero	5.9	3.000-8.788	5.7	2.858-8.627	0.7	---
Hidalgo	8.3	4.848-11.711	8.2	4.773-11.619	1.1	---
Jalisco	8.0	4.068-11.920	7.8	3.954-11.591	0.7	---
Michoacán	6.5	3.095-9.809	6.5	3.095-9.809	1.6	---
Morelos	6.6	2.709-10.543	6.6	2.709-10.543	--	---
Nayarit	6.3	3.153-9.438	6.2	3.057-9.335	0.5	---
Nuevo León	5.5	3.179-7.868	5.5	3.179-7.868	0.3	---
Oaxaca	4.6	1.317-7.904	4.6	1.317-7.904	0.5	---
Puebla	4.4	2.173-6.534	3.8	1.783-5.830	0.8	---
Querétaro	8.8	5.377-12.153	8.8	5.377-12.153	0.8	---
Quintana Roo	5.7	2.879-8.599	5.6	2.762-8.450	0.1	---
San Luis Potosí	5.8	3.228-8.285	5.8	3.228-8.285	0.6	---
Sinaloa	4.2	2.108-6.352	4.2	2.108-6.352	--	---
Sonora	6.7	3.205-10.272	6.1	2.759-9.348	0.7	---
Tabasco	3.3	1.776-4.869	3.2	1.658-4.726	0.3	---
Tamaulipas	5.1	2.405-7.798	5.1	2.405-7.798	--	---
Tlaxcala	6.3	3.509-8.999	6.3	3.509-8.999	--	---
Veracruz	4.7	2.476-6.865	4.5	2.318-6.666	0.5	---
Yucatán	5.6	3.263-8.030	5.1	2.805-7.338	1.0	0.140-1.943
Zacatecas	6.1	3.689-8.545	5.8	3.386-8.162	0.6	0.055-1.176
Nacional	6.4	5.365-7.352	6.2	5.211-7.191	0.6	0.386-0.807

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED5

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	17.1	13.005-21.162	16.2	12.217-20.233	2.8	1.232-4.355
Baja California	18.7	14.616-22.780	18.6	14.539-22.698	2.8	0.905-4.679
Baja California Sur	13.2	9.937-16.463	13.1	9.872-16.402	1.2	0.222-2.103
Campeche	15.3	10.630-20.059	15.2	10.457-19.847	0.6	---
Chiapas	8.8	5.323-12.242	8.8	5.323-12.242	0.3	---
Chihuahua	17.2	13.380-21.039	16.5	12.692-20.354	3.8	1.702-5.803
Ciudad de México	16.7	11.841-21.498	16.5	11.648-21.315	0.5	0.002-1.068
Coahuila	18.4	14.064-22.647	17.5	13.175-21.885	2.1	0.550-3.643
Colima	17.5	13.346-21.638	17.1	13.051-21.173	2.1	0.514-3.717
Durango	14.5	10.811-18.177	13.8	10.270-17.231	2.3	0.813-3.738
Estado de México	12.8	9.272-16.333	12.2	8.661-15.746	1.7	0.235-3.263
Guanajuato	13.8	10.458-17.119	13.3	10.111-16.576	1.4	0.314-2.497
Guerrero	10.1	6.674-13.532	10.0	6.534-13.372	1.1	---
Hidalgo	11.7	8.464-15.026	11.2	7.911-14.425	1.4	0.156-2.555
Jalisco	25.1	18.633-31.596	24.9	18.434-31.408	3.6	1.267-5.937
Michoacán	11.8	8.564-15.053	11.8	8.564-15.053	2.2	0.825-3.547
Morelos	11.0	6.951-15.040	11.0	6.951-15.040	1.7	---
Nayarit	16.7	12.603-20.707	14.9	11.173-18.583	3.2	0.816-5.665
Nuevo León	17.3	12.910-21.662	16.4	11.915-20.792	2.6	0.686-4.424
Oaxaca	11.0	7.353-14.604	10.1	6.613-13.667	1.3	---
Puebla	13.9	9.001-18.774	13.8	8.876-18.654	2.3	0.314-4.192
Querétaro	17.1	13.241-21.022	16.8	12.956-20.716	1.6	0.429-2.828
Quintana Roo	20.7	15.783-25.642	20.3	15.357-25.197	1.4	0.534-2.268
San Luis Potosí	11.6	8.337-14.902	11.4	8.110-14.617	1.2	---
Sinaloa	14.0	10.478-17.516	13.9	10.379-17.426	2.4	0.883-3.870
Sonora	13.9	10.500-17.321	13.3	9.934-16.579	2.2	0.618-3.746
Tabasco	14.9	11.143-18.562	14.6	10.879-18.266	1.1	0.228-1.927
Tamaulipas	14.3	11.025-17.571	13.8	10.568-17.112	1.8	0.689-2.912
Tlaxcala	9.5	5.866-13.160	8.9	5.369-12.384	1.0	0.150-1.931
Veracruz	15.7	11.698-19.717	14.4	10.651-18.236	3.1	1.310-4.980
Yucatán	15.4	11.076-19.653	14.6	10.334-18.865	1.5	0.503-2.484
Zacatecas	14.4	10.040-18.734	14.1	9.712-18.392	2.4	---
Nacional	15.0	14.007-15.964	14.5	13.541-15.493	1.9	1.583-2.306

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED6

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	13.8	10.588-17.107	13.3	10.124-16.563	1.9	0.872-3.022
Baja California	13.6	9.976-17.234	13.5	9.905-17.183	2.2	0.386-3.952
Baja California Sur	10.5	7.709-13.360	10.2	7.330-12.996	1.2	0.329-2.090
Campeche	13.9	9.070-18.806	13.9	9.070-18.806	0.5	---
Chiapas	6.7	3.971-9.509	6.7	3.971-9.509	0.3	---
Chihuahua	12.3	8.832-15.792	11.5	8.044-15.018	2.5	0.907-4.123
Ciudad de México	15.8	10.496-21.114	15.8	10.496-21.114	0.3	---
Coahuila	14.4	10.540-18.216	14.0	10.092-17.814	1.4	0.230-2.643
Colima	13.5	9.227-17.791	13.4	9.133-17.709	2.5	0.066-4.931
Durango	10.4	7.637-13.140	10.2	7.457-12.955	0.9	0.153-1.653
Estado de México	12.6	8.721-16.444	12.3	8.473-16.208	1.2	---
Guanajuato	11.1	8.197-13.904	11.1	8.197-13.904	1.2	0.122-2.281
Guerrero	8.5	5.233-11.853	8.3	5.028-11.660	1.0	0.019-1.937
Hidalgo	11.5	8.452-14.578	11.3	8.218-14.346	0.9	0.024-1.855
Jalisco	19.4	13.441-25.317	19.2	13.279-25.149	2.4	0.513-4.341
Michoacán	11.4	8.383-14.328	11.4	8.383-14.328	2.6	1.093-4.127
Morelos	11.1	7.014-15.113	11.1	7.014-15.113	1.6	---
Nayarit	14.0	10.001-17.901	12.2	8.674-15.735	2.9	0.332-5.523
Nuevo León	13.7	9.824-17.595	13.7	9.824-17.595	0.9	---
Oaxaca	10.5	6.914-14.144	10.5	6.914-14.144	0.7	---
Puebla	12.9	8.272-17.591	12.7	8.018-17.348	2.0	0.053-3.877
Querétaro	13.6	10.233-16.940	13.3	9.955-16.568	0.9	---
Quintana Roo	17.0	12.075-21.969	17.0	12.026-21.919	0.6	0.027-1.259
San Luis Potosí	9.5	6.561-12.522	9.3	6.392-12.274	1.4	0.119-2.679
Sinaloa	10.1	7.201-12.915	10.0	7.098-12.820	1.6	0.301-2.968
Sonora	11.6	7.885-15.372	11.2	7.462-14.916	1.3	---
Tabasco	11.1	8.002-14.286	11.0	7.860-14.080	0.7	---
Tamaulipas	11.5	8.518-14.519	11.5	8.518-14.519	0.5	---
Tlaxcala	9.7	6.315-13.144	9.7	6.315-13.144	0.3	---
Veracruz	9.9	6.503-13.199	9.1	5.976-12.286	1.0	0.015-1.960
Yucatán	10.4	7.264-13.600	9.7	6.605-12.732	1.5	0.578-2.469
Zacatecas	12.5	7.870-17.087	12.1	7.528-16.651	2.3	---
Nacional	12.4	11.467-13.343	12.2	11.246-13.117	1.3	1.001-1.624

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED7

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	15.5	9.823-21.230	14.6	9.010-20.234	2.8	0.286-5.308
Baja California	17.2	11.818-22.508	17.0	11.682-22.348	2.2	---
Baja California Sur	12.7	7.983-17.456	12.7	7.983-17.456	1.0	---
Campeche	10.6	6.536-14.593	10.2	6.312-14.022	1.0	---
Chiapas	6.6	2.646-10.605	6.6	2.646-10.605	0.5	---
Chihuahua	16.4	11.130-21.665	16.4	11.130-21.665	3.2	0.265-6.081
Ciudad de México	12.3	7.183-17.327	11.9	6.822-17.012	0.6	---
Coahuila	16.4	11.395-21.440	15.5	10.490-20.510	1.8	0.028-3.578
Colima	16.1	10.762-21.468	15.4	10.196-20.538	2.3	0.611-4.047
Durango	14.5	9.301-19.681	13.0	8.241-17.855	3.7	0.851-6.649
Estado de México	11.0	6.699-15.291	9.9	5.673-14.211	1.6	---
Guanajuato	12.0	6.887-17.023	11.0	6.194-15.867	2.2	0.175-4.173
Guerrero	8.8	4.700-12.865	8.7	4.640-12.804	0.9	---
Hidalgo	9.1	4.970-13.264	8.3	4.360-12.324	1.9	---
Jalisco	22.0	13.652-30.273	21.7	13.354-30.000	3.5	0.037-6.958
Michoacán	7.5	4.188-10.833	7.5	4.188-10.833	0.8	---
Morelos	6.9	3.424-10.280	6.9	3.424-10.280	0.3	---
Nayarit	12.9	8.474-17.282	12.5	8.069-16.835	1.5	0.241-2.845
Nuevo León	15.0	8.321-21.698	12.8	6.077-19.519	4.3	0.548-8.105
Oaxaca	5.3	1.922-8.658	3.6	1.244-6.001	1.7	---
Puebla	6.4	2.002-10.703	6.1	1.750-10.410	1.4	0.100-2.691
Querétaro	16.6	10.789-22.466	16.6	10.789-22.466	2.2	0.235-4.204
Quintana Roo	16.8	11.233-22.363	15.8	10.381-21.242	2.0	0.396-3.547
San Luis Potosí	10.1	6.106-14.142	10.0	6.012-14.046	0.1	---
Sinaloa	13.1	8.291-17.930	13.1	8.291-17.930	1.7	0.038-3.409
Sonora	12.2	8.266-16.090	11.1	7.488-14.713	2.5	0.876-4.086
Tabasco	12.2	7.421-16.989	11.8	7.120-16.555	1.2	---
Tamaulipas	12.2	7.790-16.660	11.1	6.677-15.525	3.1	0.799-5.403
Tlaxcala	5.9	2.566-9.233	4.5	1.429-7.472	1.8	0.104-3.467
Veracruz	16.5	10.949-22.045	15.2	9.837-20.582	4.7	1.686-7.670
Yucatán	16.9	10.517-23.296	16.3	9.947-22.654	1.0	0.019-2.078
Zacatecas	10.4	6.025-14.698	10.1	5.865-14.396	0.9	---
Nacional	12.5	11.278-13.669	11.8	10.614-12.989	2.0	1.505-2.484

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED8

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	8.2	5.885-10.514	7.3	5.060-9.592	1.8	0.779-2.722
Baja California	12.2	9.416-14.944	11.7	8.990-14.445	1.6	0.696-2.581
Baja California Sur	10.8	7.387-14.260	10.6	7.197-14.060	1.2	0.387-1.995
Campeche	10.5	7.627-13.386	9.8	7.018-12.671	0.7	---
Chiapas	4.3	2.397-6.300	4.2	2.308-6.158	0.1	---
Chihuahua	10.0	7.601-12.412	9.6	7.424-11.866	1.4	0.617-2.124
Ciudad de México	6.8	4.714-8.860	6.2	4.191-8.256	0.9	0.259-1.616
Coahuila	6.6	4.553-8.554	6.0	4.037-7.881	1.2	0.468-1.946
Colima	9.9	7.233-12.468	9.2	6.638-11.663	1.4	0.405-2.495
Durango	8.9	6.512-11.270	7.3	5.177-9.515	2.3	0.996-3.581
Estado de México	7.5	4.510-10.478	7.4	4.463-10.437	0.4	0.004-0.840
Guanajuato	8.0	5.399-10.547	7.6	5.037-10.118	1.0	0.164-1.825
Guerrero	6.5	4.036-8.950	6.0	3.578-8.454	0.5	0.025-0.930
Hidalgo	4.4	2.557-6.200	4.2	2.338-5.969	0.3	---
Jalisco	10.4	6.869-14.014	9.0	5.563-12.509	1.5	0.422-2.624
Michoacán	7.9	5.507-10.326	7.3	4.932-9.727	0.7	0.187-1.217
Morelos	4.9	2.096-7.636	4.7	1.975-7.460	0.2	---
Nayarit	12.8	9.342-16.162	12.2	8.806-15.596	2.9	---
Nuevo León	8.1	5.480-10.741	7.3	4.946-9.583	1.1	0.173-2.089
Oaxaca	4.4	2.577-6.285	4.3	2.430-6.111	0.2	---
Puebla	3.5	1.931-5.047	2.9	1.481-4.353	0.7	0.101-1.306
Querétaro	8.9	6.110-11.777	8.7	5.915-11.566	0.8	0.215-1.414
Quintana Roo	13.3	9.618-16.917	12.1	8.825-15.450	1.9	0.785-3.095
San Luis Potosí	5.0	3.451-6.599	4.8	3.248-6.379	0.4	---
Sinaloa	7.4	5.532-9.244	7.3	5.451-9.164	1.2	0.360-2.012
Sonora	9.7	6.814-12.501	9.2	6.684-11.723	0.8	0.041-1.461
Tabasco	9.7	7.117-12.295	9.2	6.692-11.733	0.8	0.175-1.365
Tamaulipas	8.5	6.463-10.566	8.2	6.124-10.198	1.5	0.495-2.584
Tlaxcala	5.1	2.874-7.366	4.9	2.703-7.152	0.4	---
Veracruz	5.6	3.795-7.313	5.0	3.288-6.724	1.3	0.322-2.214
Yucatán	9.7	5.404-14.044	9.3	5.007-13.686	2.2	---
Zacatecas	7.2	4.696-9.737	6.9	4.359-9.405	0.9	---
Nacional	7.5	6.891-8.132	7.0	6.426-7.648	0.9	0.775-1.122

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED9

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Marihuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	9.9	8.020-11.842	2.7	1.618-3.735	0.9	0.317-1.413
Baja California	12.8	10.904-14.722	4.6	3.136-5.984	3.1	1.955-4.241
Baja California Sur	9.8	7.736-11.800	4.1	3.172-5.107	1.5	0.788-2.278
Campeche	9.9	7.442-12.264	4.0	2.438-5.621	0.1	---
Chiapas	5.0	3.577-6.472	1.7	0.903-2.517	0.3	0.008-0.644
Chihuahua	10.2	8.316-12.174	6.1	4.407-7.794	1.3	0.447-2.117
Ciudad de México	9.1	6.983-11.302	3.0	1.916-4.166	0.8	0.250-1.292
Coahuila	9.2	7.240-11.194	3.7	2.377-4.962	0.4	0.019-0.812
Colima	10.8	8.678-12.855	4.9	3.322-6.471	2.4	1.377-3.460
Durango	7.8	6.241-9.277	4.2	2.878-5.459	1.3	0.508-2.000
Estado de México	9.0	6.991-10.919	2.2	1.225-3.163	0.3	---
Guanajuato	8.3	6.576-10.020	3.4	2.253-4.585	1.0	0.388-1.711
Guerrero	6.0	4.392-7.566	3.4	2.148-4.702	0.6	0.084-1.044
Hidalgo	6.9	5.242-8.625	2.3	1.340-3.300	0.3	---
Jalisco	12.2	9.614-14.872	6.9	4.572-9.301	2.0	0.749-3.295
Michoacán	8.0	6.395-9.593	3.7	2.518-4.884	1.6	0.833-2.429
Morelos	6.9	4.889-8.853	2.1	0.939-3.306	0.3	0.007-0.523
Nayarit	10.9	8.755-13.082	5.7	3.953-7.391	1.8	1.158-2.521
Nuevo León	9.5	7.371-11.716	3.1	1.980-4.246	0.6	0.087-1.025
Oaxaca	5.2	3.701-6.623	2.6	1.471-3.720	0.3	---
Puebla	6.3	4.319-8.209	3.0	1.673-4.373	0.7	0.227-1.152
Querétaro	10.3	8.328-12.203	4.0	2.838-5.228	1.0	0.467-1.630
Quintana Roo	13.8	10.772-16.745	5.8	4.258-7.244	0.6	0.222-0.948
San Luis Potosí	6.1	4.652-7.472	2.1	1.274-2.953	0.7	0.097-1.361
Sinaloa	8.1	6.430-9.741	4.7	3.455-5.871	2.0	1.181-2.752
Sonora	9.4	7.636-11.231	4.3	2.920-5.614	1.4	0.512-2.342
Tabasco	8.8	7.054-10.457	4.8	3.480-6.213	0.5	0.003-0.996
Tamaulipas	8.7	7.168-10.208	3.8	2.623-5.040	0.4	0.037-0.775
Tlaxcala	6.1	4.382-7.755	1.3	0.648-1.865	0.6	0.161-0.962
Veracruz	7.5	5.758-9.324	3.2	2.211-4.093	0.5	0.108-0.961
Yucatán	10.0	7.476-12.461	3.5	1.963-5.083	0.4	0.022-0.700
Zacatecas	8.3	6.298-10.314	4.1	2.647-5.510	1.2	0.146-2.225
Nacional	8.6	8.184-9.114	3.5	3.231-3.819	0.9	0.731-1.013

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED10

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	16.0	12.731-19.325	4.8	2.666-6.939	1.4	0.412-2.352
Baja California	20.7	17.508-23.907	7.6	5.099-10.081	5.3	3.231-7.326
Baja California Sur	15.5	11.916-19.141	7.4	5.553-9.306	2.3	0.912-3.605
Campeche	16.4	12.633-20.182	7.2	4.201-10.273	0.2	---
Chiapas	8.2	5.589-10.891	2.7	1.275-4.169	0.7	0.011-1.348
Chihuahua	16.1	12.456-19.838	9.7	6.478-12.826	1.4	0.301-2.441
Ciudad de México	15.4	11.552-19.348	5.6	3.501-7.685	1.4	0.435-2.353
Coahuila	14.4	10.927-17.918	6.7	4.052-9.252	0.8	0.041-1.642
Colima	16.4	12.782-19.939	8.4	5.530-11.306	3.8	2.150-5.538
Durango	12.2	9.547-14.926	7.0	4.730-9.365	2.1	0.715-3.535
Estado de México	14.4	10.750-17.985	4.2	2.360-6.129	0.2	---
Guanajuato	13.0	10.045-15.869	5.6	3.588-7.636	1.4	0.542-2.350
Guerrero	10.7	7.532-13.773	6.7	4.217-9.159	1.2	0.176-2.185
Hidalgo	11.2	8.181-14.309	4.0	2.022-5.939	0.6	---
Jalisco	17.1	12.941-21.162	11.8	7.458-16.160	3.2	1.316-5.024
Michoacán	12.8	9.784-15.857	6.4	4.194-8.592	2.2	0.972-3.398
Morelos	11.3	7.517-15.045	3.6	1.217-5.922	0.5	---
Nayarit	18.1	14.105-22.003	9.8	6.546-12.989	2.9	1.715-4.076
Nuevo León	14.7	11.001-18.371	5.1	3.033-7.069	0.3	---
Oaxaca	7.8	5.217-10.392	3.9	2.024-5.762	0.5	---
Puebla	10.7	6.773-14.629	5.4	2.588-8.311	1.1	0.193-1.947
Querétaro	15.8	12.173-19.349	7.0	4.575-9.422	1.8	0.664-3.010
Quintana Roo	21.4	16.164-26.728	8.4	5.803-11.073	0.7	0.132-1.197
San Luis Potosí	10.6	7.761-13.487	4.0	2.437-5.581	1.5	0.210-2.828
Sinaloa	14.5	11.462-17.502	8.3	6.028-10.623	3.7	2.112-5.211
Sonora	14.6	11.402-17.857	7.1	4.619-9.577	2.3	0.588-3.981
Tabasco	15.8	12.578-19.096	9.1	6.354-11.821	1.0	0.022-2.046
Tamaulipas	13.4	10.667-16.047	6.2	4.011-8.319	0.7	---
Tlaxcala	10.2	7.083-13.283	2.4	1.128-3.633	0.8	0.111-1.552
Veracruz	13.2	9.595-16.802	5.7	3.852-7.576	1.0	0.121-1.886
Yucatán	17.6	12.890-22.244	6.8	3.662-9.966	0.7	---
Zacatecas	14.0	10.169-17.776	8.2	5.311-11.099	2.3	0.141-4.425
Nacional	14.0	13.130-14.804	6.2	5.624-6.727	1.4	1.154-1.595

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED11

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.3	2.829-5.832	0.7	0.096-1.352	0.4	---
Baja California	4.8	3.008-6.507	1.5	0.633-2.302	0.9	0.283-1.463
Baja California Sur	3.7	2.399-4.981	0.7	0.166-1.171	0.8	0.221-1.315
Campeche	3.6	1.740-5.466	1.0	0.263-1.678	--	---
Chiapas	2.1	0.845-3.286	0.8	0.129-1.430	--	---
Chihuahua	4.5	2.712-6.289	2.6	1.153-4.133	1.2	---
Ciudad de México	3.4	1.830-4.913	0.7	0.088-1.324	0.2	---
Coahuila	4.1	2.341-5.918	0.8	0.172-1.336	--	---
Colima	5.2	2.645-7.848	1.4	0.180-2.664	1.0	---
Durango	3.6	2.188-4.958	1.5	0.565-2.389	0.4	0.043-0.837
Estado de México	3.9	2.458-5.422	0.3	---	0.4	---
Guanajuato	4.1	2.594-5.644	1.5	0.483-2.420	0.7	---
Guerrero	1.7	0.727-2.680	0.4	---	--	---
Hidalgo	3.0	1.504-4.581	0.8	0.099-1.542	0.1	---
Jalisco	7.7	4.228-11.160	2.3	0.584-4.072	0.9	---
Michoacán	3.6	2.109-5.076	1.2	0.203-2.288	1.1	0.213-2.039
Morelos	2.9	1.114-4.631	0.8	0.128-1.492	***	---
Nayarit	4.0	2.654-5.294	1.7	0.565-2.808	0.8	0.091-1.533
Nuevo León	4.5	2.656-6.383	1.2	0.129-2.310	0.8	---
Oaxaca	2.8	1.150-4.498	1.4	---	***	---
Puebla	2.4	0.860-3.856	0.9	0.304-1.467	0.4	---
Querétaro	5.3	3.260-7.250	1.3	0.659-1.999	0.3	---
Quintana Roo	5.8	3.983-7.641	3.0	1.745-4.202	0.5	---
San Luis Potosí	1.9	1.061-2.649	0.4	---	--	---
Sinaloa	1.8	0.624-3.014	1.1	0.258-1.892	0.3	---
Sonora	4.3	2.596-5.918	1.4	0.579-2.313	0.6	0.028-1.118
Tabasco	2.1	1.131-3.149	0.9	0.078-1.690	--	---
Tamaulipas	4.2	2.287-6.076	1.6	0.557-2.602	0.1	---
Tlaxcala	2.3	0.958-3.701	0.2	---	0.3	---
Veracruz	2.3	1.390-3.254	0.8	0.130-1.449	0.1	---
Yucatán	2.8	1.307-4.253	0.4	---	0.1	---
Zacatecas	3.2	1.701-4.604	0.3	0.004-0.650	0.2	---
Nacional	3.7	3.276-4.091	1.1	0.856-1.244	0.4	0.243-0.562

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED12

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	7.9	5.045-10.753	0.8	0.004-1.533	--	---
Baja California	5.1	2.710-7.497	0.5	---	0.2	---
Baja California Sur	4.6	1.959-7.317	0.2	---	0.1	---
Campeche	4.9	2.424-7.464	2.1	0.636-3.600	--	---
Chiapas	2.0	0.644-3.315	0.8	---	--	---
Chihuahua	5.5	3.070-8.000	2.4	0.715-4.018	1.0	---
Ciudad de México	6.0	3.200-8.857	1.4	---	0.2	---
Coahuila	5.8	3.009-8.640	0.4	---	0.6	---
Colima	6.4	1.539-11.173	1.0	0.139-1.771	3.2	---
Durango	5.1	2.825-7.454	1.0	0.143-1.925	0.6	0.004-1.143
Estado de México	7.4	3.321-11.553	0.4	---	1.2	---
Guanajuato	5.2	2.531-7.861	1.9	---	2.1	---
Guerrero	5.4	2.532-8.281	1.6	---	1.1	---
Hidalgo	7.3	3.940-10.618	2.6	0.530-4.609	0.5	---
Jalisco	7.8	3.954-11.591	--	---	--	---
Michoacán	5.9	2.569-9.241	1.9	0.006-3.821	1.7	---
Morelos	6.2	2.324-10.173	1.2	---	0.1	---
Nayarit	5.1	2.103-8.022	1.4	0.039-2.759	1.1	---
Nuevo León	5.5	3.128-7.805	1.0	0.202-1.811	0.3	---
Oaxaca	3.2	0.161-6.206	2.0	---	0.1	---
Puebla	2.6	0.807-4.306	1.1	---	0.2	---
Querétaro	7.8	4.669-10.886	1.7	0.692-2.801	0.2	---
Quintana Roo	4.9	2.187-7.557	2.3	0.551-4.012	0.6	---
San Luis Potosí	4.9	2.509-7.347	0.2	---	0.2	---
Sinaloa	4.1	1.954-6.183	0.9	---	0.2	---
Sonora	5.8	2.564-9.099	1.1	---	0.6	---
Tabasco	2.8	1.349-4.154	1.0	0.091-1.907	--	---
Tamaulipas	4.3	1.710-6.900	0.8	0.001-1.655	0.2	---
Tlaxcala	5.1	2.645-7.615	0.2	---	0.1	---
Veracruz	3.6	1.597-5.540	0.8	0.061-1.501	0.2	---
Yucatán	4.2	2.053-6.358	1.6	0.340-2.858	0.6	---
Zacatecas	4.8	2.670-6.862	0.6	---	1.0	---
Nacional	5.3	4.562-6.068	1.1	0.805-1.345	0.6	0.243-0.955

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED13

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	14.5	10.820-18.227	3.9	1.730-6.120	1.5	0.234-2.668
Baja California	18.1	14.080-22.162	6.6	3.835-9.357	5.0	2.404-7.606
Baja California Sur	12.0	8.833-15.094	3.7	1.936-5.371	2.8	1.200-4.358
Campeche	13.1	8.598-17.611	5.9	2.672-9.174	0.3	---
Chiapas	7.4	4.519-10.223	2.8	1.245-4.437	0.8	0.014-1.544
Chihuahua	14.5	10.864-18.150	8.1	4.894-11.219	2.8	0.771-4.784
Ciudad de México	15.7	10.984-20.493	3.4	1.395-5.392	1.2	0.055-2.373
Coahuila	15.5	11.606-19.459	6.5	3.549-9.378	0.8	---
Colima	16.1	12.142-19.981	7.5	4.399-10.698	3.2	1.465-4.876
Durango	11.0	8.331-13.754	6.1	3.895-8.382	2.5	0.788-4.302
Estado de México	11.6	8.227-14.903	3.5	1.157-5.774	0.1	---
Guanajuato	11.5	8.637-14.358	4.4	2.312-6.452	1.5	0.235-2.822
Guerrero	7.3	4.400-10.125	5.3	2.707-7.795	0.6	---
Hidalgo	10.3	7.099-13.548	3.0	1.163-4.770	0.6	---
Jalisco	18.8	13.347-24.299	11.8	6.562-16.991	4.5	1.442-7.491
Michoacán	10.6	7.547-13.635	3.5	1.762-5.272	1.8	0.675-2.999
Morelos	10.1	6.091-14.080	3.8	0.927-6.627	0.4	---
Nayarit	13.8	10.278-17.353	5.9	3.049-8.741	1.9	0.652-3.073
Nuevo León	14.7	10.447-18.948	4.8	2.294-7.397	1.0	---
Oaxaca	8.6	5.274-11.885	3.5	1.382-5.585	0.3	---
Puebla	11.4	7.201-15.532	5.6	2.613-8.564	1.5	0.382-2.594
Querétaro	15.1	11.300-18.823	5.4	3.497-7.376	2.2	0.867-3.573
Quintana Roo	19.6	14.737-24.474	7.2	4.623-9.856	0.8	0.140-1.389
San Luis Potosí	8.9	6.052-11.691	3.3	1.486-5.134	1.8	0.172-3.403
Sinaloa	12.5	9.084-15.994	6.9	4.301-9.449	4.0	2.233-5.821
Sonora	12.4	9.183-15.654	5.3	2.837-7.677	2.0	0.404-3.663
Tabasco	11.7	8.286-15.040	7.6	4.509-10.615	1.0	---
Tamaulipas	12.1	9.187-14.998	5.3	3.040-7.652	0.8	---
Tlaxcala	7.9	4.511-11.315	1.6	0.406-2.704	0.7	0.019-1.291
Veracruz	13.1	9.271-16.946	5.3	3.197-7.468	1.3	0.146-2.367
Yucatán	12.9	8.782-17.071	3.8	1.815-5.843	0.4	---
Zacatecas	12.4	8.221-16.654	6.7	3.472-9.840	2.5	0.339-4.711
Nacional	12.8	11.891-13.684	5.2	4.542-5.801	1.5	1.219-1.826

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED14

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	12.3	9.111-15.503	1.9	0.715-3.123	1.3	0.099-2.547
Baja California	13.3	9.670-16.893	2.8	0.968-4.700	2.7	0.743-4.639
Baja California Sur	9.7	6.871-12.562	2.2	0.583-3.792	1.7	0.315-3.176
Campeche	11.7	7.082-16.253	4.9	1.620-8.164	0.3	---
Chiapas	5.3	2.840-7.804	2.3	0.829-3.674	--	---
Chihuahua	11.3	7.780-14.732	3.0	1.453-4.633	1.7	0.300-3.047
Ciudad de México	14.8	9.549-19.981	3.1	0.718-5.398	1.0	---
Coahuila	12.8	9.310-16.371	3.4	1.239-5.650	1.1	0.046-2.111
Colima	12.4	8.174-16.545	5.8	2.501-9.076	3.8	1.310-6.289
Durango	8.7	6.446-11.053	3.2	1.605-4.731	1.8	0.276-3.275
Estado de México	11.3	7.944-14.624	1.5	0.050-3.007	0.7	---
Guanajuato	9.8	7.226-12.432	2.6	1.219-4.071	1.5	0.282-2.669
Guerrero	7.0	3.938-10.156	2.8	0.936-4.702	0.6	---
Hidalgo	10.2	7.234-13.199	2.7	1.137-4.166	0.2	---
Jalisco	15.7	10.692-20.770	5.5	1.320-9.588	1.8	0.028-3.664
Michoacán	10.4	7.588-13.248	3.4	1.644-5.142	2.7	1.244-4.087
Morelos	10.5	6.439-14.510	3.2	0.324-6.095	0.4	---
Nayarit	11.5	7.910-15.017	3.7	1.501-5.806	1.6	0.444-2.669
Nuevo León	12.7	8.906-16.498	3.5	1.115-5.923	1.2	---
Oaxaca	8.4	5.098-11.698	3.9	1.371-6.347	0.4	---
Puebla	10.7	6.483-14.857	5.2	2.325-8.052	1.2	0.154-2.203
Querétaro	11.9	8.659-15.154	3.5	1.852-5.104	1.1	0.188-1.926
Quintana Roo	16.3	11.392-21.219	5.0	2.958-7.138	1.0	0.191-1.791
San Luis Potosí	7.7	4.995-10.417	1.8	0.386-3.146	1.6	0.063-3.043
Sinaloa	9.5	6.693-12.379	4.2	1.833-6.577	2.5	0.911-4.032
Sonora	11.0	7.276-14.685	3.6	1.129-6.009	1.6	---
Tabasco	8.7	5.944-11.470	5.6	2.949-8.247	0.7	---
Tamaulipas	10.4	7.659-13.087	3.1	1.275-4.989	0.5	---
Tlaxcala	8.5	5.093-11.877	1.3	0.170-2.379	0.2	---
Veracruz	7.7	4.839-10.585	2.3	0.888-3.702	0.7	---
Yucatán	8.9	5.860-11.860	2.2	0.831-3.522	0.7	---
Zacatecas	11.4	7.064-15.737	4.8	1.809-7.851	2.8	0.166-5.443
Nacional	10.9	10.017-11.706	3.2	2.693-3.692	1.2	0.884-1.426

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED15

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	13.0	8.244-17.692	5.3	1.014-9.533	0.3	---
Baja California	16.5	11.186-21.813	8.2	4.132-12.247	5.2	1.734-8.756
Baja California Sur	10.6	5.964-15.232	3.6	1.260-5.985	2.6	0.688-4.585
Campeche	8.9	5.177-12.575	4.6	2.192-7.101	--	---
Chiapas	6.2	2.823-9.485	2.1	0.376-3.737	1.6	0.025-3.093
Chihuahua	12.8	8.084-17.565	11.8	6.926-16.653	3.2	---
Ciudad de México	11.3	6.258-16.384	2.7	0.766-4.628	1.0	---
Coahuila	12.3	7.629-17.012	7.3	3.959-10.694	--	---
Colima	15.0	9.915-20.092	5.5	2.311-8.719	2.1	0.066-4.195
Durango	10.2	6.199-14.163	7.6	3.953-11.229	2.3	0.452-4.078
Estado de México	8.7	4.634-12.854	4.6	1.513-7.709	--	---
Guanajuato	9.0	5.030-12.882	5.6	1.974-9.150	2.2	---
Guerrero	5.8	3.007-8.598	6.1	2.430-9.834	1.1	---
Hidalgo	7.8	3.895-11.785	3.2	0.610-5.781	1.2	---
Jalisco	15.4	9.010-21.799	15.0	7.237-22.776	6.2	0.553-11.842
Michoacán	6.4	3.166-9.557	2.2	0.415-3.999	--	---
Morelos	5.8	2.608-8.935	2.5	0.666-4.428	0.1	---
Nayarit	10.7	6.822-14.668	6.2	2.835-9.557	1.8	0.258-3.277
Nuevo León	11.1	4.509-17.668	4.5	1.686-7.234	--	---
Oaxaca	3.4	1.001-5.713	1.2	0.041-2.419	--	---
Puebla	4.0	1.346-6.624	2.0	0.138-3.790	0.8	---
Querétaro	14.7	9.037-20.454	5.9	2.944-8.902	2.7	0.368-4.971
Quintana Roo	15.1	9.680-20.487	7.9	3.863-11.952	0.2	---
San Luis Potosí	7.4	3.909-10.802	3.5	1.000-5.958	0.6	---
Sinaloa	10.9	6.425-15.446	6.8	3.370-10.310	3.7	1.094-6.247
Sonora	9.6	6.195-13.022	4.9	2.558-7.275	1.6	0.254-2.858
Tabasco	9.8	6.132-13.479	5.7	2.370-9.120	0.7	---
Tamaulipas	8.8	4.942-12.678	6.4	2.562-10.178	0.9	---
Tlaxcala	4.0	1.070-6.852	0.9	---	1.2	---
Veracruz	14.4	9.049-19.700	6.7	3.250-10.241	1.3	---
Yucatán	13.6	7.420-19.763	5.2	1.782-8.660	--	---
Zacatecas	7.2	3.622-10.778	4.6	1.314-7.900	0.5	---
Nacional	10.0	8.934-11.095	5.4	4.595-6.274	1.4	0.970-1.891

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED16

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	6.2	4.111-8.387	2.3	1.070-3.454	0.7	0.058-1.256
Baja California	10.5	7.984-13.088	4.1	2.373-5.824	2.3	1.248-3.402
Baja California Sur	9.4	5.980-12.757	6.0	4.250-7.798	0.8	0.076-1.466
Campeche	8.7	5.911-11.399	2.9	1.286-4.603	--	---
Chiapas	4.1	2.153-5.997	0.9	---	--	---
Chihuahua	8.2	6.136-10.293	5.8	3.747-7.763	***	---
Ciudad de México	4.8	3.006-6.567	3.2	1.773-4.587	0.6	0.004-1.146
Coahuila	4.7	2.935-6.455	2.3	1.178-3.503	--	---
Colima	7.5	5.177-9.782	3.9	2.252-5.504	1.4	0.339-2.513
Durango	5.8	3.879-7.724	3.7	2.099-5.225	0.3	---
Estado de México	7.1	4.111-10.098	1.7	0.706-2.617	0.1	---
Guanajuato	6.5	4.061-8.975	3.1	1.626-4.653	0.1	---
Guerrero	5.1	2.859-7.259	2.6	0.652-4.587	0.3	---
Hidalgo	3.8	2.003-5.517	1.6	0.143-3.137	--	---
Jalisco	7.6	4.354-10.933	5.0	2.457-7.512	0.5	0.022-0.889
Michoacán	6.4	4.095-8.790	4.7	2.608-6.710	1.4	---
Morelos	4.3	1.587-7.022	1.0	0.442-1.637	0.2	---
Nayarit	10.5	7.101-13.983	7.1	3.991-10.253	2.1	1.017-3.202
Nuevo León	6.4	4.199-8.595	2.3	1.386-3.194	0.3	---
Oaxaca	3.0	1.537-4.525	2.1	0.603-3.515	0.2	---
Puebla	2.9	1.449-4.322	1.3	0.370-2.298	0.1	---
Querétaro	6.5	3.846-9.187	3.6	1.861-5.302	0.2	---
Quintana Roo	10.4	7.313-13.463	5.4	2.986-7.755	0.4	0.003-0.718
San Luis Potosí	4.0	2.515-5.460	1.9	0.984-2.736	--	---
Sinaloa	5.7	3.998-7.307	4.1	2.597-5.678	0.8	0.197-1.443
Sonora	8.1	5.795-10.415	4.5	2.889-6.207	1.2	0.241-2.143
Tabasco	8.3	5.841-10.802	3.7	2.221-5.198	0.2	---
Tamaulipas	7.2	5.255-9.045	3.5	2.034-5.002	0.1	---
Tlaxcala	4.6	2.401-6.811	1.4	0.447-2.387	0.7	---
Veracruz	4.4	2.758-6.022	2.2	1.081-3.374	0.1	---
Yucatán	9.3	5.007-13.686	4.0	0.928-6.985	0.3	---
Zacatecas	5.9	3.622-8.271	3.1	1.479-4.818	--	---
Nacional	6.1	5.534-6.722	3.0	2.622-3.294	0.4	0.278-0.477

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED17

Estado	Encuesta Nacional					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.7	2.596-4.876	3.5	2.406-4.587	0.7	0.235-1.152
Baja California	4.5	3.119-5.826	4.4	3.070-5.774	0.8	0.144-1.394
Baja California Sur	3.3	2.161-4.461	3.3	2.141-4.444	0.2	---
Campeche	2.1	1.355-2.935	1.7	1.036-2.425	0.4	---
Chiapas	1.1	0.396-1.863	1.1	0.340-1.793	0.1	---
Chihuahua	3.8	2.686-4.925	3.4	2.283-4.480	1.0	0.295-1.691
Ciudad de México	2.9	1.710-4.107	2.7	1.561-3.929	0.2	---
Coahuila	4.0	2.723-5.340	3.6	2.325-4.881	0.6	0.104-0.999
Colima	3.1	1.933-4.170	2.9	1.821-4.011	0.7	---
Durango	3.2	2.104-4.206	2.7	1.722-3.698	0.7	0.183-1.241
Estado de México	2.3	1.397-3.232	2.1	1.224-2.999	0.5	---
Guanajuato	2.7	1.741-3.661	2.6	1.683-3.561	0.5	0.036-0.986
Guerrero	2.6	1.656-3.477	2.3	1.453-3.176	0.4	---
Hidalgo	2.3	1.453-3.199	2.3	1.396-3.133	0.1	---
Jalisco	5.2	3.034-7.300	4.9	2.752-6.973	0.5	0.050-1.010
Michoacán	3.8	2.663-4.928	3.4	2.334-4.468	0.7	0.141-1.243
Morelos	2.1	1.130-3.040	2.1	1.130-3.040	0.1	---
Nayarit	3.4	1.773-5.107	2.8	1.382-4.292	0.9	---
Nuevo León	3.1	1.903-4.339	2.8	1.575-3.967	0.5	0.059-0.935
Oaxaca	1.5	0.623-2.380	1.4	0.524-2.224	0.2	---
Puebla	3.2	1.727-4.619	3.0	1.581-4.433	0.5	0.049-0.904
Querétaro	3.5	2.319-4.610	3.4	2.203-4.502	0.3	0.012-0.631
Quintana Roo	4.2	2.921-5.498	3.8	2.520-5.039	0.4	0.109-0.752
San Luis Potosí	2.2	1.313-3.131	2.0	1.154-2.822	0.4	---
Sinaloa	3.2	2.180-4.277	2.9	1.936-3.944	0.6	0.040-1.080
Sonora	3.1	2.103-4.102	3.0	1.977-3.949	0.5	---
Tabasco	3.1	2.105-4.143	2.9	1.865-3.876	0.4	0.100-0.687
Tamaulipas	2.4	1.441-3.263	2.0	1.249-2.755	0.4	0.043-0.788
Tlaxcala	2.1	1.188-2.942	2.0	1.088-2.833	0.1	---
Veracruz	2.5	1.505-3.427	1.7	0.927-2.522	1.0	0.392-1.576
Yucatán	1.9	1.028-2.820	1.7	0.825-2.566	0.3	0.072-0.569
Zacatecas	3.0	1.884-4.062	2.6	1.635-3.634	0.7	---
Nacional	2.9	2.670-3.216	2.7	2.417-2.947	0.5	0.370-0.596

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED18

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.8	3.754-7.840	5.4	3.430-7.371	1.1	0.219-1.989
Baja California	7.6	5.116-10.026	7.5	5.058-9.968	1.4	0.185-2.639
Baja California Sur	5.2	3.135-7.274	5.2	3.135-7.274	0.2	---
Campeche	3.1	1.656-4.613	2.7	1.348-4.024	0.4	---
Chiapas	1.7	0.394-2.982	1.7	0.394-2.982	0.1	---
Chihuahua	5.0	3.250-6.821	4.8	3.010-6.578	0.4	0.027-0.792
Ciudad de México	4.9	2.623-7.208	4.7	2.448-6.997	0.3	---
Coahuila	6.3	3.823-8.732	5.9	3.540-8.360	0.6	---
Colima	4.2	2.591-5.840	4.1	2.489-5.732	0.5	---
Durango	6.0	3.908-8.120	5.1	3.131-7.091	1.5	0.361-2.547
Estado de México	3.6	1.874-5.403	3.6	1.805-5.331	0.6	---
Guanajuato	4.3	2.563-5.986	4.2	2.498-5.829	0.6	---
Guerrero	4.3	2.467-6.088	3.8	2.142-5.491	0.7	---
Hidalgo	3.8	2.220-5.357	3.7	2.106-5.211	0.1	---
Jalisco	7.8	3.871-11.679	7.7	3.809-11.615	0.5	---
Michoacán	6.0	3.911-8.166	5.6	3.543-7.673	0.9	0.006-1.849
Morelos	2.9	1.413-4.393	2.9	1.413-4.393	0.2	---
Nayarit	5.9	2.622-9.128	4.9	2.016-7.700	1.4	---
Nuevo León	4.3	2.113-6.525	4.2	2.004-6.403	0.4	---
Oaxaca	1.6	0.610-2.620	1.3	0.477-2.208	0.4	---
Puebla	5.5	2.493-8.555	5.3	2.306-8.356	0.6	---
Querétaro	5.7	3.403-7.952	5.5	3.270-7.811	0.6	---
Quintana Roo	6.5	4.213-8.802	6.1	3.810-8.387	0.4	---
San Luis Potosí	3.4	1.613-5.163	3.0	1.369-4.569	0.5	---
Sinaloa	5.6	3.643-7.502	5.1	3.255-6.868	0.7	---
Sonora	5.3	3.373-7.256	5.3	3.340-7.206	0.8	---
Tabasco	5.5	3.531-7.558	5.4	3.370-7.403	0.4	0.029-0.868
Tamaulipas	3.0	1.556-4.369	2.6	1.268-3.954	0.4	---
Tlaxcala	3.1	1.489-4.671	3.1	1.489-4.671	--	---
Veracruz	4.0	2.244-5.840	3.2	1.544-4.858	1.3	0.271-2.337
Yucatán	3.1	1.357-4.805	3.0	1.293-4.736	0.3	---
Zacatecas	4.8	2.748-6.860	4.2	2.393-6.062	1.2	---
Nacional	4.6	4.139-5.160	4.4	3.897-4.906	0.6	0.410-0.796

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED19

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.8	0.878-2.805	1.7	0.815-2.680	0.3	---
Baja California	1.3	0.429-2.192	1.3	0.387-2.148	0.1	---
Baja California Sur	1.3	0.453-2.174	1.3	0.415-2.134	0.1	---
Campeche	1.2	0.407-1.996	0.8	0.215-1.423	0.4	---
Chiapas	0.6	---	0.5	---	0.1	---
Chihuahua	2.6	1.139-4.078	2.0	0.631-3.382	1.6	0.221-2.902
Ciudad de México	1.1	0.289-1.856	0.9	0.194-1.676	0.1	---
Coahuila	1.8	0.863-2.809	1.3	0.537-2.080	0.5	---
Colima	1.9	0.108-3.698	1.7	0.019-3.456	1.0	---
Durango	0.5	0.134-0.832	0.5	0.117-0.813	***	---
Estado de México	1.1	0.299-1.877	0.8	0.196-1.328	0.3	---
Guanajuato	1.3	0.307-2.273	1.2	0.258-2.221	0.4	---
Guerrero	1.0	0.246-1.755	0.9	0.189-1.690	0.1	---
Hidalgo	1.0	0.210-1.803	1.0	0.210-1.803	0.1	---
Jalisco	2.7	0.670-4.730	2.2	0.202-4.131	0.5	0.060-1.008
Michoacán	1.8	0.724-2.776	1.4	0.548-2.231	0.5	---
Morelos	1.3	0.200-2.484	1.3	0.200-2.484	--	---
Nayarit	1.1	0.436-1.704	0.9	0.284-1.457	0.4	0.015-0.763
Nuevo León	2.0	0.635-3.268	1.4	0.241-2.502	0.6	---
Oaxaca	1.4	---	1.4	---	--	---
Puebla	1.1	0.252-1.953	1.0	0.188-1.734	0.3	---
Querétaro	1.4	0.721-2.173	1.4	0.637-2.077	0.1	---
Quintana Roo	1.8	0.963-2.706	1.4	0.652-2.112	0.5	---
San Luis Potosí	1.1	0.455-1.839	1.1	0.397-1.770	0.3	---
Sinaloa	0.9	0.139-1.725	0.9	0.077-1.647	0.4	---
Sonora	0.9	0.244-1.554	0.7	0.069-1.254	0.2	---
Tabasco	0.9	0.263-1.463	0.5	0.113-0.929	0.3	---
Tamaulipas	1.8	0.776-2.748	1.4	0.563-2.266	0.5	---
Tlaxcala	1.1	0.353-1.931	0.9	0.209-1.678	0.2	---
Veracruz	1.0	0.282-1.744	0.4	0.008-0.716	0.7	0.031-1.347
Yucatán	0.8	0.200-1.459	0.4	---	0.4	---
Zacatecas	1.3	0.563-2.054	1.2	0.474-1.899	0.3	---
Nacional	1.3	1.113-1.585	1.1	0.867-1.286	0.4	0.247-0.494

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED20

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.8	3.449-8.152	5.7	3.402-7.998
Baja California	3.2	1.246-5.117	3.0	1.114-4.979
Baja California Sur	2.5	0.822-4.200	2.5	0.822-4.200
Campeche	3.8	1.505-6.165	3.2	1.222-5.081
Chiapas	1.2	0.244-2.063	0.8	0.126-1.566
Chihuahua	4.1	1.935-6.223	4.1	1.935-6.223
Ciudad de México	3.5	1.278-5.626	3.5	1.278-5.626
Coahuila	3.9	1.415-6.355	3.9	1.415-6.355
Colima	4.9	0.246-9.460	4.9	0.246-9.460
Durango	2.7	1.253-4.131	2.7	1.253-4.131
Estado de México	2.3	0.606-3.987	2.1	0.464-3.805
Guanajuato	3.4	0.954-5.806	3.2	0.822-5.647
Guerrero	4.6	2.058-7.074	4.4	1.919-6.910
Hidalgo	4.8	1.932-7.630	4.8	1.932-7.630
Jalisco	2.2	0.829-3.599	2.0	0.668-3.317
Michoacán	5.1	1.819-8.403	4.1	1.233-6.931
Morelos	4.9	1.274-8.564	4.9	1.274-8.564
Nayarit	2.7	0.851-4.492	2.6	0.761-4.384
Nuevo León	2.9	0.972-4.802	2.9	0.972-4.802
Oaxaca	2.4	---	2.4	---
Puebla	2.5	0.797-4.259	2.1	0.571-3.672
Querétaro	5.4	2.911-7.864	5.4	2.911-7.864
Quintana Roo	3.0	1.229-4.858	3.0	1.229-4.858
San Luis Potosí	3.8	1.703-5.822	3.8	1.703-5.822
Sinaloa	3.2	1.462-4.982	3.2	1.462-4.982
Sonora	3.4	1.297-5.412	3.2	1.181-5.273
Tabasco	1.9	0.764-3.044	1.8	0.656-2.891
Tamaulipas	3.1	1.268-4.911	3.1	1.268-4.911
Tlaxcala	4.2	1.804-6.655	4.2	1.804-6.655
Veracruz	1.6	0.551-2.574	1.4	0.432-2.336
Yucatán	2.8	0.973-4.532	2.4	0.789-3.989
Zacatecas	3.8	1.793-5.821	3.8	1.793-5.821
Nacional	3.1	2.619-3.483	2.9	2.469-3.308

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED21

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.0	2.827-7.262	4.7	2.609-6.849
Baja California	7.6	4.724-10.553	7.6	4.724-10.553
Baja California Sur	5.3	2.910-7.727	5.3	2.910-7.727
Campeche	2.3	0.862-3.651	2.1	0.713-3.416
Chiapas	2.0	0.475-3.618	2.0	0.475-3.618
Chihuahua	5.8	3.303-8.319	5.3	2.838-7.689
Ciudad de México	5.0	2.092-7.916	5.0	2.092-7.916
Coahuila	7.2	4.257-10.057	6.5	3.603-9.421
Colima	3.8	1.755-5.819	3.6	1.650-5.512
Durango	5.3	2.942-7.717	4.7	2.489-6.945
Estado de México	3.8	1.859-5.819	3.4	1.501-5.297
Guanajuato	4.2	2.220-6.083	4.0	2.164-5.881
Guerrero	3.4	1.540-5.316	2.9	1.172-4.540
Hidalgo	3.5	1.674-5.405	3.5	1.674-5.405
Jalisco	10.6	5.690-15.507	10.4	5.469-15.304
Michoacán	5.4	3.155-7.580	4.9	2.741-7.061
Morelos	2.3	0.837-3.754	2.3	0.837-3.754
Nayarit	4.3	1.575-7.107	3.0	1.204-4.865
Nuevo León	6.2	3.277-9.073	5.5	2.674-8.309
Oaxaca	2.4	0.606-4.252	2.1	0.382-3.800
Puebla	6.2	3.024-9.332	6.0	2.794-9.116
Querétaro	4.8	2.612-7.031	4.8	2.612-7.031
Quintana Roo	7.4	4.898-9.953	6.9	4.435-9.390
San Luis Potosí	3.2	1.088-5.314	2.7	0.787-4.582
Sinaloa	5.4	3.154-7.641	4.8	2.670-6.836
Sonora	4.4	2.199-6.566	4.2	2.056-6.393
Tabasco	5.1	2.892-7.232	4.9	2.749-7.043
Tamaulipas	3.9	1.865-5.960	3.3	1.597-4.912
Tlaxcala	2.6	0.826-4.314	2.5	0.761-4.260
Veracruz	4.5	2.236-6.692	3.5	1.408-5.497
Yucatán	2.5	0.845-4.123	2.4	0.738-3.997
Zacatecas	4.9	2.398-7.410	4.1	1.792-6.309
Nacional	5.0	4.347-5.582	4.6	3.992-5.205

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED22

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	6.7	4.651-8.659	6.4	4.491-8.398
Baja California	6.8	4.103-9.501	6.7	4.036-9.446
Baja California Sur	5.2	3.012-7.369	5.2	3.012-7.369
Campeche	3.6	1.876-5.264	3.3	1.677-4.855
Chiapas	2.4	0.696-4.146	2.3	0.560-3.977
Chihuahua	5.3	3.037-7.605	5.0	2.735-7.288
Ciudad de México	7.0	3.301-10.762	7.0	3.301-10.762
Coahuila	7.5	4.512-10.503	7.5	4.512-10.503
Colima	5.6	2.665-8.515	5.6	2.665-8.515
Durango	4.4	2.606-6.269	4.3	2.519-6.174
Estado de México	3.4	1.539-5.348	3.3	1.378-5.182
Guanajuato	4.0	2.240-5.797	4.0	2.170-5.732
Guerrero	4.7	2.739-6.595	4.5	2.545-6.391
Hidalgo	4.5	2.547-6.486	4.5	2.547-6.486
Jalisco	8.1	3.564-12.593	7.8	3.315-12.359
Michoacán	7.5	4.988-9.915	6.7	4.310-9.054
Morelos	3.9	1.724-6.013	3.9	1.724-6.013
Nayarit	4.9	1.926-7.869	3.5	1.555-5.396
Nuevo León	6.0	3.319-8.777	5.6	2.975-8.214
Oaxaca	3.5	1.211-5.792	3.2	0.967-5.373
Puebla	6.8	3.559-10.118	6.7	3.382-9.927
Querétaro	5.8	3.482-8.099	5.8	3.482-8.099
Quintana Roo	7.7	4.828-10.516	7.7	4.828-10.516
San Luis Potosí	4.7	2.490-6.894	4.2	2.163-6.204
Sinaloa	5.6	3.342-7.773	4.9	2.800-6.965
Sonora	4.9	2.501-7.397	4.9	2.444-7.340
Tabasco	4.6	2.370-6.868	4.6	2.312-6.813
Tamaulipas	3.7	2.090-5.293	3.7	2.090-5.293
Tlaxcala	3.9	2.086-5.727	3.9	2.086-5.727
Veracruz	2.7	1.322-4.062	2.4	1.085-3.730
Yucatán	2.7	1.172-4.270	2.4	0.988-3.893
Zacatecas	6.0	3.445-8.558	5.1	2.833-7.431
Nacional	5.1	4.478-5.677	4.9	4.260-5.451

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED23

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.2	---	1.9	---
Baja California	5.8	1.950-9.618	5.8	1.950-9.618
Baja California Sur	3.7	0.210-7.104	3.7	0.210-7.104
Campeche	1.1	---	0.7	---
Chiapas	0.4	---	0.4	---
Chihuahua	5.3	1.881-8.645	4.8	1.496-8.010
Ciudad de México	1.3	0.088-2.419	1.3	0.088-2.419
Coahuila	3.4	0.902-5.891	2.0	0.017-3.929
Colima	1.5	0.260-2.683	1.1	0.120-2.011
Durango	4.6	1.336-7.962	3.5	0.959-6.032
Estado de México	3.3	0.881-5.765	2.6	0.459-4.732
Guanajuato	3.7	0.436-6.958	3.4	0.373-6.486
Guerrero	2.3	0.163-4.371	1.4	0.013-2.831
Hidalgo	2.8	0.199-5.477	2.8	0.199-5.477
Jalisco	8.4	2.626-14.172	8.2	2.470-14.019
Michoacán	0.7	---	0.3	---
Morelos	1.5	---	1.5	---
Nayarit	1.9	0.593-3.264	1.8	0.517-3.175
Nuevo León	3.6	0.034-7.120	3.0	---
Oaxaca	0.2	---	0.2	---
Puebla	1.0	---	0.5	---
Querétaro	3.5	0.556-6.535	3.5	0.556-6.535
Quintana Roo	3.6	1.227-5.961	2.4	0.444-4.421
San Luis Potosí	0.5	---	0.5	---
Sinaloa	3.1	0.594-5.612	3.1	0.594-5.612
Sonora	2.5	0.582-4.373	2.2	0.372-3.945
Tabasco	3.1	0.779-5.476	2.8	0.609-4.910
Tamaulipas	3.7	0.968-6.355	2.0	0.135-3.957
Tlaxcala	1.2	---	1.0	---
Veracruz	5.1	1.560-8.597	3.5	0.273-6.744
Yucatán	2.2	---	2.2	---
Zacatecas	1.6	0.013-3.185	1.6	0.013-3.185
Nacional	3.1	2.426-3.742	2.6	2.000-3.233

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED24

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.5	0.313-2.771	1.3	0.123-2.514
Baja California	1.9	0.918-2.884	1.8	0.859-2.807
Baja California Sur	1.6	0.623-2.530	1.5	0.580-2.484
Campeche	1.3	0.191-2.500	0.8	---
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	1.9	0.983-2.859	1.4	0.602-2.294
Ciudad de México	1.1	0.402-1.856	0.8	0.223-1.367
Coahuila	1.2	0.358-2.050	0.8	0.168-1.451
Colima	1.7	0.648-2.792	1.6	0.545-2.657
Durango	1.3	0.426-2.206	0.8	0.112-1.561
Estado de México	0.9	0.082-1.752	0.9	0.082-1.752
Guanajuato	1.0	0.116-1.813	1.0	0.116-1.813
Guerrero	0.7	0.013-1.446	0.7	0.013-1.446
Hidalgo	0.3	---	0.1	---
Jalisco	1.1	0.189-1.976	0.7	0.128-1.182
Michoacán	1.7	0.619-2.831	1.7	0.573-2.783
Morelos	0.8	---	0.8	---
Nayarit	2.9	---	2.8	---
Nuevo León	0.6	0.123-1.000	0.4	0.022-0.751
Oaxaca	0.2	---	0.2	---
Puebla	0.5	---	0.5	---
Querétaro	1.3	0.123-2.507	1.0	---
Quintana Roo	0.9	0.283-1.486	0.4	0.047-0.716
San Luis Potosí	0.7	0.185-1.121	0.6	0.131-1.021
Sinaloa	1.3	0.478-2.121	1.2	0.410-2.028
Sonora	1.9	0.871-2.891	1.8	0.793-2.713
Tabasco	1.7	0.682-2.675	1.3	0.359-2.214
Tamaulipas	0.7	0.063-1.301	0.5	---
Tlaxcala	0.6	0.015-1.256	0.4	---
Veracruz	1.1	0.347-1.929	0.4	---
Yucatán	1.1	0.174-1.997	0.8	---
Zacatecas	0.8	0.140-1.452	0.8	0.140-1.452
Nacional	1.0	0.847-1.225	0.8	0.666-1.004

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED25

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.0	2.042-4.047	0.5	0.041-0.981
Baja California	3.8	2.608-5.035	0.6	0.055-1.107
Baja California Sur	2.9	1.757-4.012	0.3	---
Campeche	1.2	0.683-1.812	0.7	0.196-1.169
Chiapas	0.8	0.156-1.529	0.2	---
Chihuahua	2.8	1.808-3.876	1.1	0.376-1.754
Ciudad de México	2.5	1.365-3.692	0.6	---
Coahuila	3.2	1.982-4.488	1.0	0.206-1.704
Colima	2.3	1.279-3.327	0.3	---
Durango	1.9	1.121-2.700	0.8	0.308-1.209
Estado de México	2.1	1.202-2.978	0.6	0.118-1.015
Guanajuato	1.9	1.104-2.789	0.9	0.327-1.463
Guerrero	1.6	0.879-2.296	1.1	0.423-1.706
Hidalgo	1.8	1.000-2.605	0.5	0.104-0.944
Jalisco	2.9	1.569-4.299	1.9	0.151-3.651
Michoacán	3.0	1.922-3.987	0.9	0.297-1.531
Morelos	1.9	0.992-2.880	0.3	0.029-0.635
Nayarit	2.3	0.907-3.757	0.7	0.043-1.315
Nuevo León	2.2	1.150-3.179	0.9	0.122-1.592
Oaxaca	1.0	0.349-1.722	0.7	---
Puebla	1.5	0.627-2.441	1.3	0.356-2.316
Querétaro	2.8	1.688-3.832	1.0	0.418-1.608
Quintana Roo	2.9	1.749-4.012	1.6	0.802-2.402
San Luis Potosí	1.5	0.801-2.238	0.2	0.002-0.423
Sinaloa	2.5	1.556-3.414	0.8	0.271-1.315
Sonora	2.8	1.812-3.783	0.9	0.226-1.559
Tabasco	1.9	1.127-2.686	1.4	0.600-2.185
Tamaulipas	1.6	0.940-2.319	0.6	0.184-0.943
Tlaxcala	1.7	0.924-2.516	0.2	---
Veracruz	1.3	0.533-2.011	0.5	0.125-0.870
Yucatán	1.6	0.717-2.421	0.6	0.057-1.049
Zacatecas	2.0	1.113-2.946	0.9	0.307-1.561
Nacional	2.1	1.911-2.362	0.8	0.632-0.971

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED26

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.5	2.678-6.309	1.0	0.046-2.014
Baja California	6.3	4.177-8.470	1.0	---
Baja California Sur	4.6	2.574-6.627	0.6	---
Campeche	1.7	0.711-2.778	1.0	0.098-1.952
Chiapas	1.2	0.030-2.413	0.4	---
Chihuahua	4.1	2.484-5.762	1.1	0.342-1.820
Ciudad de México	4.3	2.055-6.556	1.3	---
Coahuila	5.7	3.245-8.063	1.7	0.150-3.152
Colima	2.9	1.590-4.255	0.5	---
Durango	3.5	1.934-5.118	1.4	0.450-2.277
Estado de México	3.5	1.761-5.286	1.1	0.167-2.014
Guanajuato	2.9	1.581-4.267	1.2	0.334-2.115
Guerrero	2.4	1.115-3.668	2.0	0.702-3.219
Hidalgo	3.0	1.581-4.411	1.0	0.131-1.820
Jalisco	3.7	1.729-5.760	3.9	0.353-7.467
Michoacán	4.8	2.808-6.788	1.6	0.360-2.790
Morelos	2.6	1.178-4.081	0.2	---
Nayarit	3.9	1.122-6.679	1.2	---
Nuevo León	3.8	1.819-5.802	1.0	---
Oaxaca	1.3	0.477-2.208	0.3	---
Puebla	2.5	0.656-4.279	2.5	0.471-4.612
Querétaro	4.6	2.498-6.703	1.9	0.714-3.166
Quintana Roo	4.7	2.722-6.777	2.4	0.945-3.928
San Luis Potosí	2.3	0.904-3.639	0.4	---
Sinaloa	4.4	2.756-6.139	1.3	0.334-2.317
Sonora	5.0	3.095-6.946	1.5	0.245-2.787
Tabasco	3.5	1.939-5.036	2.8	1.147-4.377
Tamaulipas	1.9	0.775-3.108	0.5	---
Tlaxcala	2.8	1.240-4.302	0.3	---
Veracruz	2.4	0.875-3.960	1.0	0.255-1.819
Yucatán	2.9	1.161-4.576	0.9	---
Zacatecas	3.3	1.512-5.081	1.9	0.657-3.236
Nacional	3.5	3.032-3.871	1.4	1.055-1.729

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED27

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.7	0.782-2.644	***	---
Baja California	1.3	0.387-2.148	0.2	---
Baja California Sur	1.1	0.260-1.889	***	---
Campeche	0.8	0.173-1.374	0.4	---
Chiapas	0.5	---	--	---
Chihuahua	1.6	0.283-2.907	1.1	---
Ciudad de México	0.9	0.163-1.641	--	---
Coahuila	0.9	0.244-1.498	0.3	---
Colima	1.7	---	0.1	---
Durango	0.4	0.108-0.694	0.2	0.020-0.365
Estado de México	0.8	0.196-1.328	0.1	---
Guanajuato	1.1	0.107-2.033	0.6	---
Guerrero	0.9	0.117-1.586	0.2	---
Hidalgo	0.7	0.037-1.414	0.1	---
Jalisco	2.2	0.202-4.131	--	---
Michoacán	1.3	0.454-2.093	0.3	---
Morelos	1.3	0.167-2.449	0.4	---
Nayarit	0.8	0.230-1.381	0.2	---
Nuevo León	0.6	0.053-1.059	0.7	---
Oaxaca	0.8	---	1.1	---
Puebla	0.7	---	0.3	---
Querétaro	1.1	0.422-1.741	0.2	---
Quintana Roo	0.9	0.329-1.569	0.7	0.209-1.270
San Luis Potosí	0.8	0.189-1.461	0.1	---
Sinaloa	0.6	0.002-1.124	0.3	---
Sonora	0.6	0.007-1.159	0.3	---
Tabasco	0.4	0.041-0.819	0.1	---
Tamaulipas	1.3	0.477-2.179	0.6	0.059-1.154
Tlaxcala	0.8	0.110-1.420	--	---
Veracruz	0.2	---	--	---
Yucatán	0.3	---	0.2	---
Zacatecas	0.9	0.357-1.398	***	---
Nacional	0.9	0.710-1.107	0.2	0.157-0.342

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro ICED28

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	5.3	3.056-7.600	0.6	---
Baja California	3.0	1.114-4.979	0.3	---
Baja California Sur	2.2	0.621-3.772	--	---
Campeche	3.0	1.088-4.940	1.3	0.095-2.521
Chiapas	0.7	0.027-1.351	--	---
Chihuahua	3.3	1.445-5.254	1.3	0.047-2.499
Ciudad de México	3.2	1.082-5.361	0.2	---
Coahuila	3.6	1.301-5.881	0.4	---
Colima	4.7	0.067-9.264	0.2	---
Durango	2.3	0.953-3.557	0.6	0.004-1.143
Estado de México	2.1	0.464-3.805	0.4	---
Guanajuato	2.9	0.511-5.255	1.6	---
Guerrero	3.8	1.417-6.185	1.6	---
Hidalgo	4.1	1.500-6.635	0.8	---
Jalisco	2.0	0.668-3.317	--	---
Michoacán	3.9	1.188-6.631	0.2	---
Morelos	4.8	1.168-8.454	1.2	---
Nayarit	2.2	0.471-4.001	0.5	---
Nuevo León	2.9	0.972-4.802	0.6	---
Oaxaca	2.4	---	1.5	---
Puebla	1.5	0.138-2.921	0.5	---
Querétaro	4.4	2.178-6.720	0.4	---
Quintana Roo	2.3	0.695-3.839	1.0	---
San Luis Potosí	2.8	0.920-4.602	0.2	---
Sinaloa	3.0	1.260-4.656	0.4	---
Sonora	3.2	1.181-5.273	0.9	---
Tabasco	1.2	0.248-2.250	0.4	---
Tamaulipas	2.3	0.732-3.854	0.5	---
Tlaxcala	3.9	1.657-6.192	0.1	---
Veracruz	1.3	0.349-2.216	0.7	---
Yucatán	2.0	0.513-3.574	0.9	0.004-1.885
Zacatecas	2.8	1.217-4.381	0.4	---
Nacional	2.6	2.194-3.011	0.6	0.381-0.800

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro ICED29

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.4	2.303-6.518	0.8	---
Baja California	6.3	3.839-8.855	1.0	---
Baja California Sur	4.8	2.485-7.161	0.5	---
Campeche	1.3	0.237-2.382	0.8	---
Chiapas	1.6	0.165-3.092	0.4	---
Chihuahua	4.9	2.504-7.326	1.7	0.101-3.308
Ciudad de México	4.6	1.747-7.481	1.1	---
Coahuila	6.0	3.119-8.874	1.9	0.048-3.665
Colima	2.9	1.139-4.675	0.6	---
Durango	2.9	1.236-4.565	1.1	0.235-2.030
Estado de México	3.3	1.448-5.243	0.8	---
Guanajuato	2.9	1.290-4.431	0.9	0.100-1.602
Guerrero	1.6	0.450-2.714	1.6	0.273-2.936
Hidalgo	2.7	0.919-4.430	1.0	0.150-1.852
Jalisco	5.9	2.703-9.069	4.3	0.119-8.535
Michoacán	4.2	2.124-6.353	1.7	0.329-3.087
Morelos	2.2	0.722-3.609	0.3	---
Nayarit	2.6	0.986-4.309	1.2	---
Nuevo León	4.1	1.832-6.405	1.8	0.030-3.558
Oaxaca	1.2	0.235-2.158	1.1	---
Puebla	2.9	0.986-4.770	2.7	0.518-4.975
Querétaro	3.8	1.751-5.805	2.2	0.763-3.586
Quintana Roo	5.3	3.072-7.502	3.0	1.379-4.694
San Luis Potosí	2.0	0.350-3.563	0.3	---
Sinaloa	3.9	2.041-5.802	1.3	0.087-2.420
Sonora	3.9	1.715-6.034	1.7	0.112-3.323
Tabasco	3.1	1.435-4.694	2.7	0.885-4.418
Tamaulipas	2.8	1.254-4.256	1.0	0.135-1.815
Tlaxcala	2.3	0.576-3.994	0.1	---
Veracruz	2.4	0.486-4.230	0.9	0.008-1.887
Yucatán	2.4	0.738-3.997	0.8	---
Zacatecas	3.6	1.367-5.762	1.6	0.173-3.061
Nacional	3.5	3.027-4.033	1.5	1.065-1.862

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro ICED30

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	6.0	3.950-7.963	0.6	---
Baja California	6.5	3.776-9.180	1.1	---
Baja California Sur	5.0	2.812-7.176	0.4	---
Campeche	2.6	1.178-3.932	1.2	0.202-2.261
Chiapas	1.9	0.295-3.569	0.4	---
Chihuahua	4.7	2.429-6.897	1.3	0.312-2.198
Ciudad de México	6.6	2.933-10.241	1.5	---
Coahuila	7.1	4.166-10.037	1.6	---
Colima	5.0	2.151-7.788	0.6	---
Durango	2.7	1.502-3.918	0.9	0.170-1.713
Estado de México	3.2	1.320-5.123	0.5	0.009-0.895
Guanajuato	3.0	1.308-4.677	1.3	0.154-2.493
Guerrero	3.1	1.545-4.692	2.2	0.734-3.714
Hidalgo	4.0	2.170-5.842	0.8	---
Jalisco	5.8	2.804-8.858	2.0	---
Michoacán	5.9	3.642-8.225	1.8	0.395-3.213
Morelos	3.7	1.547-5.821	0.8	---
Nayarit	3.3	1.400-5.240	1.3	---
Nuevo León	4.6	2.252-6.913	1.6	---
Oaxaca	2.3	0.568-4.128	1.8	---
Puebla	3.5	1.438-5.515	2.8	0.535-5.041
Querétaro	4.5	2.494-6.496	1.9	0.583-3.214
Quintana Roo	6.1	3.444-8.753	3.1	1.355-4.837
San Luis Potosí	3.0	1.254-4.739	0.3	---
Sinaloa	4.6	2.618-6.669	1.0	0.157-1.887
Sonora	4.7	2.264-7.157	1.7	---
Tabasco	2.8	1.218-4.439	2.4	0.523-4.183
Tamaulipas	3.2	1.626-4.710	0.6	0.055-1.182
Tlaxcala	3.5	1.799-5.293	0.2	---
Veracruz	1.4	0.423-2.359	1.4	0.301-2.430
Yucatán	2.3	0.894-3.690	0.7	0.008-1.471
Zacatecas	4.2	1.971-6.394	1.4	---
Nacional	4.0	3.486-4.504	1.3	0.951-1.687

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro ICED31

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.9	---	1.0	---
Baja California	3.8	1.396-6.174	0.4	---
Baja California Sur	2.8	---	0.4	---
Campeche	0.4	---	0.3	---
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	4.1	0.911-7.306	2.1	---
Ciudad de México	1.0	---	0.1	---
Coahuila	1.4	---	1.2	---
Colima	0.7	---	0.3	---
Durango	2.7	0.374-4.969	1.0	---
Estado de México	2.6	0.459-4.732	1.3	---
Guanajuato	2.6	0.181-5.051	0.6	---
Guerrero	1.0	---	0.5	---
Hidalgo	1.5	---	1.1	---
Jalisco	2.3	0.036-4.629	5.5	0.183-10.835
Michoacán	0.3	---	--	---
Morelos	1.5	---	0.1	---
Nayarit	1.1	0.232-1.928	0.4	---
Nuevo León	2.0	---	1.2	---
Oaxaca	0.1	---	0.1	---
Puebla	0.2	---	0.3	---
Querétaro	3.0	0.129-5.953	1.2	---
Quintana Roo	1.3	---	1.4	---
San Luis Potosí	0.5	---	0.1	---
Sinaloa	1.6	0.151-3.027	0.9	---
Sonora	1.8	0.144-3.428	1.0	---
Tabasco	1.9	---	1.3	0.005-2.548
Tamaulipas	1.3	---	1.3	---
Tlaxcala	1.0	---	--	---
Veracruz	3.1	---	--	---
Yucatán	2.2	---	1.1	---
Zacatecas	1.6	0.007-3.116	0.9	---
Nacional	1.8	1.336-2.315	1.0	0.538-1.428

Cocaína también incluye crack.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro ICED32

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.7	0.079-1.320	0.2	---
Baja California	1.7	0.715-2.634	0.3	---
Baja California Sur	1.2	0.302-2.058	0.2	---
Campeche	0.5	---	0.4	---
Chiapas	0.1	---	***	---
Chihuahua	0.8	0.215-1.404	0.4	---
Ciudad de México	0.7	0.162-1.271	0.3	---
Coahuila	0.6	---	0.3	---
Colima	0.9	0.243-1.536	--	---
Durango	0.8	0.112-1.561	0.5	---
Estado de México	0.9	0.082-1.752	0.4	---
Guanajuato	0.6	---	0.6	---
Guerrero	0.5	---	0.3	---
Hidalgo	0.1	---	--	---
Jalisco	0.5	0.024-0.882	0.3	---
Michoacán	1.3	0.304-2.328	0.5	---
Morelos	0.7	---	***	---
Nayarit	2.1	---	0.3	---
Nuevo León	0.2	---	0.1	---
Oaxaca	0.2	---	--	---
Puebla	0.2	---	0.3	---
Querétaro	1.0	---	0.1	---
Quintana Roo	0.3	0.004-0.576	0.2	---
San Luis Potosí	0.6	0.131-1.021	0.2	---
Sinaloa	1.0	0.307-1.744	0.5	---
Sonora	1.7	0.734-2.648	0.2	---
Tabasco	1.0	0.228-1.800	0.5	---
Tamaulipas	0.4	---	0.2	---
Tlaxcala	0.2	---	0.2	---
Veracruz	0.4	---	***	---
Yucatán	0.6	---	0.2	---
Zacatecas	0.3	---	0.5	---
Nacional	0.7	0.510-0.831	0.3	0.168-0.378

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED33

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.9	1.006-2.783	1.8	0.901-2.641
Baja California	3.0	1.785-4.266	3.0	1.785-4.266
Baja California Sur	1.7	0.958-2.443	1.7	0.958-2.443
Campeche	1.0	0.428-1.588	0.8	0.251-1.278
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	2.5	1.454-3.466	2.3	1.327-3.301
Ciudad de México	1.6	0.810-2.435	1.5	0.674-2.245
Coahuila	2.6	1.462-3.813	2.6	1.404-3.711
Colima	1.7	0.926-2.507	1.6	0.804-2.358
Durango	1.8	1.073-2.508	1.6	0.947-2.349
Estado de México	1.2	0.393-1.908	1.1	0.361-1.873
Guanajuato	1.2	0.628-1.790	1.2	0.620-1.693
Guerrero	0.9	0.326-1.396	0.8	0.296-1.363
Hidalgo	0.5	0.150-0.897	0.5	0.123-0.861
Jalisco	3.0	1.207-4.817	2.9	1.120-4.731
Michoacán	2.5	1.516-3.474	2.3	1.339-3.187
Morelos	0.9	0.358-1.472	0.9	0.358-1.472
Nayarit	2.8	1.132-4.466	2.3	0.835-3.726
Nuevo León	1.9	0.991-2.887	1.9	0.911-2.807
Oaxaca	0.5	0.104-0.855	0.5	0.104-0.855
Puebla	1.3	0.457-2.199	1.2	0.313-2.012
Querétaro	1.8	1.010-2.570	1.7	0.965-2.525
Quintana Roo	2.2	1.304-3.035	1.9	1.070-2.714
San Luis Potosí	0.6	0.251-0.985	0.6	0.251-0.985
Sinaloa	1.9	1.054-2.706	1.8	0.982-2.633
Sonora	2.3	1.394-3.126	2.2	1.345-3.061
Tabasco	1.2	0.653-1.777	1.1	0.523-1.595
Tamaulipas	1.0	0.427-1.558	0.9	0.388-1.490
Tlaxcala	1.1	0.366-1.821	1.1	0.340-1.798
Veracruz	1.1	0.512-1.692	0.7	0.207-1.131
Yucatán	1.4	0.696-2.192	1.4	0.617-2.114
Zacatecas	1.3	0.591-2.082	1.3	0.591-2.082
Nacional	1.5	1.336-1.754	1.4	1.230-1.642

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICED34

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	3.0	1.443-4.650	2.8	1.198-4.379
Baja California	5.5	3.237-7.861	5.5	3.237-7.861
Baja California Sur	2.9	1.576-4.315	2.9	1.576-4.315
Campeche	1.4	0.378-2.423	1.3	0.296-2.309
Chiapas	0.1	---	0.1	---
Chihuahua	3.2	1.685-4.636	3.2	1.685-4.636
Ciudad de México	2.8	1.232-4.288	2.6	1.076-4.058
Coahuila	5.1	2.777-7.389	5.1	2.777-7.389
Colima	2.7	1.391-3.926	2.6	1.294-3.813
Durango	3.6	2.093-5.020	3.3	1.851-4.708
Estado de México	2.4	0.853-3.933	2.3	0.785-3.860
Guanajuato	2.3	1.186-3.510	2.2	1.153-3.322
Guerrero	1.5	0.421-2.616	1.5	0.421-2.616
Hidalgo	1.0	0.230-1.717	0.9	0.175-1.640
Jalisco	5.0	1.421-8.565	4.9	1.358-8.501
Michoacán	4.4	2.491-6.364	4.0	2.154-5.839
Morelos	1.8	0.639-2.953	1.8	0.639-2.953
Nayarit	5.0	1.784-8.293	4.0	1.191-6.852
Nuevo León	2.9	1.210-4.506	2.7	1.105-4.380
Oaxaca	0.9	0.136-1.691	0.9	0.136-1.691
Puebla	2.4	0.556-4.171	2.2	0.391-3.949
Querétaro	3.0	1.414-4.503	2.9	1.358-4.441
Quintana Roo	3.4	1.859-4.993	3.1	1.572-4.656
San Luis Potosí	0.6	0.211-1.022	0.6	0.211-1.022
Sinaloa	3.5	1.940-5.038	3.4	1.867-4.961
Sonora	4.0	2.332-5.593	4.0	2.332-5.593
Tabasco	2.1	1.013-3.181	2.1	0.968-3.135
Tamaulipas	1.3	0.343-2.335	1.3	0.343-2.335
Tlaxcala	2.1	0.651-3.645	2.1	0.651-3.645
Veracruz	2.0	0.862-3.201	1.4	0.401-2.303
Yucatán	2.5	1.083-4.004	2.5	1.020-3.934
Zacatecas	2.2	0.640-3.663	2.2	0.640-3.663
Nacional	2.7	2.301-3.121	2.6	2.166-2.975

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICED35

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.8	0.239-1.433	0.8	0.239-1.433
Baja California	0.5	0.079-0.821	0.5	0.079-0.821
Baja California Sur	0.4	---	0.4	---
Campeche	0.6	0.002-1.266	0.3	---
Chiapas	---	---	--	---
Chihuahua	1.8	0.436-3.120	1.5	0.191-2.789
Ciudad de México	0.6	---	0.4	---
Coahuila	0.2	---	0.1	---
Colima	0.8	---	0.6	---
Durango	0.1	---	0.1	---
Estado de México	--	---	--	---
Guanajuato	0.2	---	0.2	---
Guerrero	0.3	---	0.2	---
Hidalgo	0.1	---	0.1	---
Jalisco	1.1	0.152-2.125	1.0	0.052-2.007
Michoacán	0.7	0.135-1.331	0.7	0.109-1.255
Morelos	0.1	---	0.1	---
Nayarit	0.6	0.096-1.141	0.6	0.067-1.106
Nuevo León	1.0	0.073-2.010	1.0	0.029-1.962
Oaxaca	0.1	---	0.1	---
Puebla	0.4	---	0.3	---
Querétaro	0.7	0.212-1.239	0.7	0.183-1.204
Quintana Roo	0.9	0.315-1.426	0.6	0.144-1.115
San Luis Potosí	0.6	0.012-1.226	0.6	0.012-1.226
Sinaloa	0.3	---	0.2	---
Sonora	0.6	---	0.5	---
Tabasco	0.4	---	0.1	---
Tamaulipas	0.7	0.061-1.255	0.6	0.018-1.088
Tlaxcala	0.1	---	0.1	---
Veracruz	0.2	---	***	---
Yucatán	0.4	---	0.3	---
Zacatecas	0.6	0.161-1.029	0.6	0.161-1.029
Nacional	0.5	0.339-0.574	0.4	0.265-0.487

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE DROGAS POR ESTADO**

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro ICED36

Estado	Encuesta Nacional 2016			
	Mariguana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	0.723-1.997	0.3	---
Baja California	2.4	1.397-3.477	0.3	---
Baja California Sur	1.5	0.772-2.237	0.2	---
Campeche	0.6	0.166-1.030	0.3	---
Chiapas	0.1	---	***	---
Chihuahua	2.0	1.047-2.901	0.8	0.167-1.473
Ciudad de México	1.4	0.616-2.186	0.4	---
Coahuila	2.3	1.127-3.423	0.4	0.102-0.788
Colima	1.3	0.563-2.041	0.2	---
Durango	1.3	0.665-1.976	0.6	0.175-0.977
Estado de México	1.1	0.361-1.873	0.3	---
Guanajuato	1.0	0.490-1.512	0.2	---
Guerrero	0.6	0.178-1.022	0.4	---
Hidalgo	0.4	0.045-0.726	0.1	---
Jalisco	1.3	0.579-2.067	1.5	---
Michoacán	2.1	1.213-3.035	0.3	---
Morelos	0.8	0.303-1.390	0.1	---
Nayarit	2.0	0.610-3.448	0.2	---
Nuevo León	1.5	0.716-2.293	0.6	0.002-1.236
Oaxaca	0.5	0.104-0.855	0.1	---
Puebla	0.7	0.101-1.310	0.4	---
Querétaro	1.4	0.732-2.135	0.5	0.052-0.975
Quintana Roo	1.7	0.916-2.538	0.7	0.195-1.160
San Luis Potosí	0.6	0.199-0.915	0.1	---
Sinaloa	1.5	0.746-2.241	0.3	0.014-0.501
Sonora	2.0	1.193-2.888	0.4	0.048-0.821
Tabasco	0.8	0.331-1.290	0.5	0.170-0.907
Tamaulipas	0.7	0.226-1.262	0.3	0.036-0.629
Tlaxcala	1.0	0.283-1.694	0.1	---
Veracruz	0.5	0.081-0.898	0.3	0.001-0.502
Yucatán	1.2	0.520-1.972	0.4	---
Zacatecas	1.2	0.448-1.863	0.4	---
Nacional	1.2	1.000-1.331	0.4	0.267-0.552

Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 6: CUADROS DE TRATAMIENTO DE DROGAS



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO DE DROGAS

Listado de Tablas

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo (1)

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo (2)

Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud por su consumo de drogas según sexo

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTD1

N por subgrupo	Hombres 319 058		Mujeres 57 680		Total 376 738	
	N	%	N	%	N	%
Tratamiento de desintoxicación	123 909	38.8	23 630	41.4	147 538	39.2
Tratamiento residencial	100 704	31.6	17 554	30.4	118 258	31.4
Tratamiento ambulatorio	58 004	18.2	12 987	22.5	70 992	18.8
Tratamiento por internet	31 089	9.7	807	1.4	31 896	8.5
Tratamiento en una clínica de metadona	21 629	6.8	7 109	12.3	28 739	7.6
Tratamiento en un anexo	138 976	43.6	21 391	37.1	160 367	42.6

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su uso de drogas según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTD2

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	556 647		146 852		703 499	
	N	%	N	%	N	%
Completo con profesionalista	127 107	23.5	35 476	24.8	162 583	23.8
Parcial con profesionalista	292 545	54.1	88 888	62.1	381 433	55.8
Autoayuda	113 153	20.9	18 454	12.9	131 608	19.3
Otro tipo	7 572	1.4	403	0.3	7 975	1.2

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su uso de drogas según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO

Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud
por su consumo de drogas según sexo

Cuadro CTD3

	Hombres		Mujeres		Total	
N por subgrupo	556 647		146 852		703 499	
Profesional al que acudió:	N	%	N	%	N	%
Psiquiatra	203 536	36.6	50 450	34.4	253 986	36.1
Médico familiar o general	167 223	30.0	38 577	26.3	205 800	29.3
Otro médico especialista	75 757	13.6	35 335	24.1	111 093	15.8
Psicólogo	297 935	53.5	110 342	75.1	408 278	58.0
Trabajadora Social	177 163	31.8	24 635	16.8	201 798	28.7
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	140 243	25.2	19 721	13.4	159 964	22.7
Psicoterapeuta u otro/a profesional de la salud de forma independiente	85 286	15.3	8 912	6.1	94 197	13.4
Consejero espiritual	194 253	34.9	35 219	24.0	229 473	32.6
Grupo de autoayuda	327 516	58.8	53 853	36.7	381 369	54.2
Un curandero/ yerbero	81 088	14.6	3 001	2.0	84 089	12.0
Consultó a algún otro especialista	33 517	6.0	--	--	33 517	4.8

Porcentajes obtenidos de los usuarios de drogas para cada tipo de profesional según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017

CUADROS DE TRATAMIENTO

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CTD4

N por subgrupo	Hombres 6 170 259		Mujeres 2 001 112		Total 8 171 371	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	1 657 198	27.6	529 058	27.0	2 186 256	27.4
Pensó que podría resolverlo solo	1 661 614	27.4	343 966	17.5	2 005 580	25.0
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	657 523	10.9	124 130	6.4	781 653	9.8
No sabe a dónde acudir	785 885	13.0	147 792	7.6	933 677	11.7
No acudió por vergüenza	539 594	8.8	123 227	6.2	662 822	8.2
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	542 965	9.4	111 455	5.9	654 419	8.5
No cuenta con suficientes recursos económicos	647 114	10.8	120 210	6.2	767 324	9.6
Su seguro médico no cubre este tratamiento	379 917	6.5	80 694	4.3	460 610	6.0
El problema se acabó solo	1 452 548	24.4	582 627	29.9	2 035 175	25.8
Pensó que el problema mejoraría solo	1 538 263	25.4	476 157	24.6	2 014 420	25.2
Le preocupa lo que la gente piense de usted	429 654	7.0	132 807	6.8	562 460	7.0
Pensó que le tomaría mucho tiempo	584 434	9.7	119 241	6.1	703 675	8.8
No podía conseguir una cita	261 509	4.4	42 018	2.2	303 526	3.8
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	693 321	11.4	163 709	8.3	857 030	10.6
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	499 528	8.4	88 364	4.6	587 893	7.5
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	185 339	3.1	28 983	1.5	214 322	2.7
El problema no le molesta mucho	491 304	8.1	131 760	6.8	623 064	7.8
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	277 705	4.6	66 767	3.5	344 472	4.3
Cualquier otra	215 876	3.6	38 641	2.0	254 517	3.2

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas, según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro CTD5

N por subgrupo	12-25 años 3 696 738		26-34 años 1 893 080		35-65 años 2 581 553	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	965 324	26.8	538 349	29.2	682 583	26.9
Pensó que podría resolverlo solo	864 025	23.9	415 297	22.2	726 257	28.6
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	301 846	8.4	203 727	11.0	276 079	11.0
No sabe a dónde acudir	416 372	11.6	197 739	10.6	319 566	12.6
No acudió por vergüenza	275 876	7.6	153 554	8.2	233 392	9.1
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	319 015	9.2	155 114	8.7	180 291	7.4
No cuenta con suficientes recursos económicos	320 326	9.0	195 078	10.5	251 920	9.9
Su seguro médico no cubre este tratamiento	228 654	6.6	88 977	5.0	142 980	5.8
El problema se acabó solo	1 022 706	29.1	409 008	22.2	603 460	23.7
Pensó que el problema mejoraría solo	983 730	27.3	387 595	20.9	643 095	25.4
Le preocupa lo que la gente piense de usted	257 938	7.1	138 732	7.4	165 790	6.5
Pensó que le tomaría mucho tiempo	326 059	9.0	173 593	9.4	204 023	8.1
No podía conseguir una cita	147 747	4.1	79 140	4.3	76 639	3.1
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	437 687	12.0	192 168	10.3	227 175	8.9
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	240 231	6.8	135 913	7.5	211 749	8.5
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	78 618	2.2	69 586	3.7	66 118	2.6
El problema no le molesta mucho	313 885	8.7	121 012	6.5	188 166	7.4
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	161 562	4.5	80 173	4.4	102 737	4.1
Cualquier otra	89 928	2.5	50 124	2.7	114 466	4.6

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro CTD6

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	2 436 653		1 488 658		2 244 948	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	647 939	27.4	421 883	29.1	587 376	26.7
Pensó que podría resolverlo solo	671 265	28.2	354 162	24.1	636 188	28.8
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	226 242	9.5	175 975	12.1	255 306	11.6
No sabe a dónde acudir	330 877	14.0	177 820	12.1	277 188	12.5
No acudió por vergüenza	190 780	8.0	143 492	9.7	205 322	9.2
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	246 864	10.8	138 482	9.9	157 619	7.4
No cuenta con suficientes recursos económicos	256 211	10.9	177 056	12.2	213 847	9.6
Su seguro médico no cubre este tratamiento	177 686	7.9	85 304	6.1	116 926	5.4
El problema se acabó solo	621 668	27.3	318 309	21.9	512 571	23.1
Pensó que el problema mejoraría solo	668 497	28.1	309 788	21.3	559 978	25.3
Le preocupa lo que la gente piense de usted	164 591	6.9	129 663	8.8	135 400	6.1
Pensó que le tomaría mucho tiempo	232 976	9.8	166 454	11.4	185 005	8.4
No podía conseguir una cita	120 096	5.1	75 629	5.3	65 784	3.0
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	318 762	13.3	172 235	11.8	202 324	9.0
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	182 527	7.9	125 456	8.7	191 545	8.8
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	65 131	2.7	69 586	4.7	50 623	2.3
El problema no le molesta mucho	234 707	9.9	100 954	6.9	155 643	7.0
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	113 282	4.8	71 575	4.9	92 849	4.3
Cualquier otra	63 919	2.7	45 381	3.1	106 577	4.9

Porcentajes obtenidos de la población masculina que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Secretaría de Salud

Comisión Nacional Contra las Adicciones

Instituto Nacional de Salud Pública

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE TRATAMIENTO

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro CTD7

N por subgrupo	12-25 años 1 260 085		26-34 años 404 422		35-65 años 336 605	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	317 386	25.7	116 465	29.4	95 207	28.6
Pensó que podría resolverlo solo	192 761	15.7	61 136	15.3	90 069	27.1
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	75 604	6.2	27 752	7.1	20 773	6.4
No sabe a dónde acudir	85 494	7.0	19 919	5.1	42 378	13.0
No acudió por vergüenza	85 095	6.8	10 062	2.5	28 070	8.4
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	72 151	6.0	16 632	4.2	22 672	7.6
No cuenta con suficientes recursos económicos	64 116	5.2	18 021	4.5	38 073	11.8
Su seguro médico no cubre este tratamiento	50 968	4.3	3 673	0.9	26 053	8.5
El problema se acabó solo	401 039	32.4	90 699	23.4	90 889	28.4
Pensó que el problema mejoraría solo	315 233	25.8	77 807	19.5	83 118	26.6
Le preocupa lo que la gente piense de usted	93 347	7.5	9 069	2.3	30 390	9.5
Pensó que le tomaría mucho tiempo	93 083	7.5	7 139	1.8	19 019	6.0
No podía conseguir una cita	27 651	2.2	3 512	0.9	10 855	3.5
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	118 926	9.6	19 934	4.9	24 850	7.7
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	57 704	4.7	10 456	2.7	20 203	6.4
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	13 487	1.1	--	--	15 496	4.8
El problema no le molesta mucho	79 179	6.5	20 058	5.0	32 523	10.2
Le resulta difícil llegar al sitio donde lo atenderán	48 281	4.0	8 598	2.2	9 888	3.1
Cualquier otra	26 008	2.1	4 743	1.2	7 890	2.5

Porcentajes obtenidos de la población femenina que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 7: TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad (1)
Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad (2)
Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según sexo
Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según edad
Conducta antisocial y delincuencia en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Conducta antisocial y delincuencia en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo
Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según edad
Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo
Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según edad

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad

Cuadro TI1

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales			
	2011		2016	
	N	%	N	%
Hombres				
12-17	4 364 306	64.1	4 591 123	63.3
18-34	5 979 126	39.0	7 514 596	45.7
35-65	5 372 598	32.8	6 315 595	36.1
Subtotal	15 716 030	40.8	18 421 314	44.7
Mujeres				
12-17	4 667 989	70.4	5 054 925	71.3
18-34	7 538 271	46.0	8 911 656	50.7
35-65	6 588 652	36.4	7 799 269	40.2
Subtotal	18 794 912	45.7	21 765 849	49.4
Nacional	34 510 942	43.3	40 187 163	47.1

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad

Cuadro TI2

Sexo/Edad	Encuestas Nacionales			
	2011		2016	
	N	%	N	%
Hombres				
12-25	8 158 484	54.5	9 201 770	56.8
26-34	2 184 948	30.6	2 903 949	38.8
35-65	5 372 598	32.8	6 315 595	36.1
Subtotal	15 716 030	40.8	18 421 314	44.7
Mujeres				
12-25	8 769 328	59.4	9 866 982	63.0
26-34	3 436 933	41.7	4 099 598	45.5
35-65	6 588 652	36.4	7 799 269	40.2
Subtotal	18 794 912	45.7	21 765 849	49.4
Nacional	34 510 942	43.3	40 187 163	47.1

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TI3

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	760 892	2.0	405 673	1.0	1 166 565	1.5	768 877	1.9	293 997	0.7	1 062 874	1.2
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	363 945	0.9	153 652	0.4	517 597	0.7	463 151	1.1	233 641	0.5	696 792	0.8
Vendido drogas	132 092	0.3	11 887	***	143 979	0.2	197 205	0.5	30 002	0.1	227 207	0.3
Tomado parte en riñas o peleas	2 243 135	5.8	737 812	1.8	2 980 947	3.7	2 632 464	6.4	740 825	1.7	3 373 289	4.0
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	135 942	0.4	20 094	***	156 036	0.2	136 940	0.3	15 284	***	152 223	0.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL

Conducta antisocial y delincuencia en la población de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI4

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	13 437 575		31 705 578		34 478 059		14 335 079		34 025 391		36 901 588	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	558 571	4.2	449 458	1.4	158 535	0.5	442 126	3.1	419 555	1.2	201 193	0.5
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	147 463	1.1	291 896	0.9	78 238	0.2	157 944	1.1	288 640	0.8	250 208	0.7
Vendido drogas	17 176	0.1	118 825	0.4	7 978	***	43 362	0.3	120 387	0.4	63 458	0.2
Tomado parte en riñas o peleas	1 176 200	8.8	1 415 007	4.5	389 741	1.1	816 449	5.7	1 568 910	4.6	987 931	2.7
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	67 222	0.5	77 493	0.2	11 322	***	17 193	0.1	71 291	0.2	63 739	0.2

Porcentajes obtenidos según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población masculina de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI5

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	6 807 478		15 321 907		16 378 428		7 247 914		16 437 032		17 483 670	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	343 717	5.1	320 187	2.1	96 988	0.6	305 830	4.2	314 929	1.9	148 118	0.8
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	88 649	1.3	244 894	1.6	30 401	0.2	77 936	1.1	190 325	1.2	194 889	1.1
Vendido drogas	14 829	0.2	112 886	0.7	4 377	***	32 566	0.4	110 836	0.7	53 804	0.3
Tomado parte en riñas o peleas	841 180	12.4	1 115 351	7.3	286 604	1.8	550 581	7.6	1 287 088	7.8	794 795	4.5
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	57 627	0.8	76 744	0.5	1 571	***	15 520	0.2	63 548	0.4	57 872	0.3

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Conducta antisocial y delincuencia en la población femenina de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI6

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	214 854	3.2	129 272	0.8	61 547	0.3	136 296	1.9	104 626	0.6	53 075	0.3
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja etc.	58 814	0.9	47 002	0.3	47 837	0.3	80 008	1.1	98 314	0.6	55 319	0.3
Vendido drogas	2 347	***	5 939	***	3 601	***	10 796	0.2	9 551	0.1	9 654	***
Tomado parte en riñas o peleas	335 019	5.1	299 655	1.8	103 137	0.6	265 868	3.8	281 822	1.6	193 136	1.0
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	9 595	0.1	748	***	9 751	0.1	1 673	***	7 742	***	5 868	***

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo

Cuadro TI7

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Considera que estas sustancias producen adicción:												
Mariguana	34 524 521	89.7	37 237 357	90.6	71 761 878	90.1	33 469 463	81.3	36 617 046	83.0	70 086 509	82.2
Alucinógenos	29 270 979	76.0	30 689 928	74.6	59 960 907	75.3	24 046 824	58.4	25 410 222	57.6	49 457 046	58.0
Cocaína	34 930 828	90.7	37 027 476	90.1	71 958 304	90.4	32 317 865	78.5	34 035 228	77.2	66 353 093	77.8
Heroína	32 817 043	85.2	34 585 849	84.1	67 402 892	84.7	28 311 859	68.8	29 771 144	67.5	58 083 003	68.1
Inhalables	31 543 112	81.9	33 694 244	82.0	65 237 356	81.9	25 896 208	62.9	27 460 101	62.3	53 356 309	62.6
Alcohol	33 196 957	86.2	35 496 487	86.3	68 693 444	86.3	30 692 090	74.6	33 600 826	76.2	64 292 916	75.4
Tabaco	32 607 959	84.7	34 517 125	84.0	67 125 084	84.3	30 020 347	72.9	32 470 841	73.6	62 491 188	73.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según edad

Cuadro TI8

Encuestas Nacionales													
N por subgrupo	2011						2016						
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años		
	29 754 276		15 388 877		34 478 059		31 861 406		16 499 064		36 901 588		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Considera que estas sustancias producen adicción:													
Mariguana	26 751 923	89.9	14 067 386	91.4	30 942 569	89.7	25 959 258	81.5	13 566 411	82.2	30 560 840	82.8	
Alucinógenos	21 419 939	72.0	12 264 511	79.7	26 276 457	76.2	17 445 708	54.8	10 030 150	60.8	21 981 188	59.6	
Cocaína	26 667 864	89.6	14 225 386	92.4	31 065 054	90.1	24 243 485	76.1	13 280 274	80.5	28 829 335	78.1	
Heroína	24 694 318	83.0	13 516 867	87.8	29 191 707	84.7	21 255 819	66.7	11 558 222	70.1	25 268 962	68.5	
Inhalables	24 007 602	80.7	13 142 495	85.4	28 087 259	81.5	19 305 571	60.6	10 753 313	65.2	23 297 426	63.1	
Alcohol	25 408 791	85.4	13 535 589	88.0	29 749 064	86.3	23 581 593	74.0	12 652 696	76.7	28 058 627	76.0	
Tabaco	25 058 975	84.2	13 280 874	86.3	28 785 235	83.5	23 316 444	73.2	12 186 684	73.9	26 988 061	73.1	

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo

Cuadro TI9

N por subgrupo	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto:												
Que los metan en la cárcel	718 745	1.9	525 537	1.3	1 244 281	1.6	608 848	1.5	453 768	1.0	1 062 616	1.3
Que los internen en hospitales psiquiátricos	7 305 153	19.3	7 057 360	17.6	14 362 513	18.4	1 577 001	3.9	1 510 778	3.5	3 087 779	3.7
Que se curen en su propio ambiente	6 961 957	18.4	7 105 395	17.7	14 067 353	18.1	2 542 132	6.3	1 980 221	4.6	4 522 353	5.4
Que se curen por su propia cuenta	3 007 630	8.0	2 814 767	7.0	5 822 398	7.5	2 477 075	6.1	1 827 816	4.2	4 304 891	5.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN
Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según edad

Cuadro TI10

	Encuestas Nacionales											
	2011						2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
N por subgrupo	29 754 276		15 388 877		34 478 059		31 861 406		16 499 064		36 901 588	
Rehabilitación más efectiva para un adicto:												
Que los metan en la cárcel	593 226	2.0	194 727	1.3	456 329	1.4	574 928	1.8	140 608	0.9	347 080	1.0
Que los internen en hospitales psiquiátricos	7 068 680	24.3	2 273 070	15.1	5 020 762	14.9	1 624 039	5.2	367 706	2.3	1 096 034	3.0
Que se curen en su propio ambiente	5 656 008	19.4	2 630 446	17.5	5 780 898	17.2	1 732 351	5.5	837 781	5.1	1 952 222	5.4
Que se curen por su propia cuenta	2 125 997	7.3	1 163 560	7.7	2 532 841	7.5	1 567 566	5.0	953 231	5.8	1 784 094	4.9

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (1)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (1)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (2)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (2)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según edad (2)

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen según edad

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según sexo

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma según edad

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas según edad

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según sexo

Cuadro TRI1

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	24.6	25.5	25.0	47.6	48.3	48.0	41.7	44.4	43.1
Noroccidental	32.0	37.4	34.7	44.7	51.2	47.9	45.2	50.6	47.9
Nororiental	27.5	28.2	27.9	35.8	43.9	39.9	40.9	44.1	42.5
Occidental	29.1	31.4	30.3	35.6	38.7	37.2	45.3	46.5	46.0
Centro	28.2	35.3	31.9	40.5	45.5	43.1	45.7	50.5	48.2
Ciudad de México	30.0	31.4	30.7	34.6	40.4	37.7	39.0	44.5	41.9
Centro Sur	29.5	30.3	29.9	40.2	48.3	44.4	47.4	53.4	50.6
Sur	31.0	33.4	32.2	50.3	49.5	49.9	47.1	53.3	50.3
Nacional	28.9	32.4	30.7	40.8	45.7	43.3	44.7	49.4	47.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI2

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	53.1	22.6	15.5	76.1	47.4	37.6	65.0	43.9	33.8
Noroccidental	57.1	33.7	26.5	76.6	45.4	39.7	68.6	49.5	38.8
Nororiental	56.1	26.1	18.4	62.2	42.1	29.9	68.1	47.4	29.2
Occidental	58.5	26.4	21.3	61.5	36.3	28.3	62.5	47.9	37.5
Centro	55.3	30.0	23.0	67.0	43.5	33.1	70.3	48.3	39.3
Ciudad de México	52.3	32.6	22.5	70.0	37.0	29.9	71.1	43.8	32.8
Centro Sur	51.6	26.5	22.2	65.8	41.6	37.8	64.8	51.1	44.0
Sur	50.1	31.3	23.7	65.5	47.8	45.0	65.4	50.4	43.3
Nacional	54.3	28.9	22.0	67.2	42.6	34.7	67.3	48.3	38.3

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI3

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	51.0	22.3	14.9	72.3	49.4	36.2	60.7	41.5	34.1
Noroccidental	54.9	30.0	24.3	70.3	44.7	34.9	65.3	45.3	37.5
Nororiental	58.0	25.5	17.2	55.1	38.0	26.6	64.7	46.0	27.3
Occidental	55.4	25.4	20.4	59.5	32.6	28.4	61.1	46.3	37.6
Centro	48.4	26.2	20.6	68.2	38.1	30.6	66.2	46.7	35.9
Ciudad de México	45.5	30.2	24.8	69.5	32.5	26.7	69.8	38.0	30.7
Centro Sur	47.6	26.7	22.6	58.6	36.1	35.4	58.7	47.4	42.2
Sur	49.3	29.8	22.4	60.7	47.2	48.6	60.7	48.4	39.2
Nacional	50.4	26.9	21.0	64.1	39.0	32.8	63.3	45.7	36.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI4

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	55.3	22.9	16.0	80.0	45.5	39.0	69.5	46.3	33.5
Noroccidental	59.4	37.3	28.6	83.3	46.0	44.4	72.0	53.7	40.1
Nororiental	54.2	26.8	19.5	69.7	46.1	33.0	71.5	48.7	30.9
Occidental	61.7	27.3	22.2	63.5	39.8	28.1	64.0	49.4	37.4
Centro	61.9	33.5	25.1	65.9	48.3	35.4	74.4	49.7	42.4
Ciudad de México	58.7	34.9	20.6	70.5	41.4	32.6	72.4	49.4	34.5
Centro Sur	55.4	26.4	21.9	73.2	46.5	39.9	71.0	54.3	45.6
Sur	50.9	32.7	25.0	70.4	48.3	41.5	70.1	52.1	47.2
Nacional	58.0	30.7	22.9	70.4	46.0	36.4	71.3	50.7	40.2

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI5

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	39.4	17.5	15.5	62.6	41.8	37.6	56.9	37.4	33.8
Noroccidental	47.2	28.6	26.5	60.8	40.9	39.7	62.6	41.3	38.8
Nororiental	43.6	18.6	18.4	54.7	34.9	29.9	58.2	42.1	29.2
Occidental	43.1	22.8	21.3	48.4	33.6	28.3	57.4	41.1	37.5
Centro	43.8	26.5	23.0	60.0	34.3	33.1	62.2	40.5	39.3
Ciudad de México	45.3	24.9	22.5	53.5	32.6	29.9	57.2	41.3	32.8
Centro Sur	40.8	23.2	22.2	54.2	38.4	37.8	59.0	49.0	44.0
Sur	43.1	25.1	23.7	58.8	42.0	45.0	59.9	44.7	43.3
Nacional	43.2	24.2	22.0	56.9	36.5	34.7	59.8	42.4	38.3

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI6

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	38.3	17.5	14.9	61.2	44.2	36.2	52.0	37.8	34.1
Noroccidental	45.0	23.8	24.3	58.8	38.4	34.9	60.0	32.6	37.5
Nororiental	43.5	19.2	17.2	49.6	28.1	26.6	56.5	39.1	27.3
Occidental	40.3	23.5	20.4	43.9	33.4	28.4	53.8	44.0	37.6
Centro	39.3	21.0	20.6	61.7	23.4	30.6	59.8	36.4	35.9
Ciudad de México	39.3	24.3	24.8	52.6	26.7	26.7	51.4	38.5	30.7
Centro Sur	39.2	22.9	22.6	46.8	34.1	35.4	54.6	43.9	42.2
Sur	42.9	21.6	22.4	56.7	39.6	48.6	58.7	38.5	39.2
Nacional	40.6	21.7	21.0	54.5	30.6	32.8	56.8	38.8	36.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI7

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años	12-25 años	26-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	40.4	17.4	16.0	64.1	39.8	39.0	62.1	37.0	33.5
Noroccidental	49.3	33.4	28.6	62.7	43.6	44.4	65.6	48.7	40.1
Nororiental	43.6	18.1	19.5	60.5	40.4	33.0	59.9	44.8	30.9
Occidental	45.7	22.2	22.2	53.0	33.7	28.1	61.0	38.5	37.4
Centro	48.0	31.2	25.1	58.4	44.7	35.4	64.7	43.5	42.4
Ciudad de México	51.2	25.4	20.6	54.4	38.8	32.6	63.4	43.9	34.5
Centro Sur	42.3	23.5	21.9	62.1	41.3	39.9	63.4	53.0	45.6
Sur	43.3	28.3	25.0	60.9	44.0	41.5	61.1	50.2	47.2
Nacional	45.7	26.3	22.9	59.4	41.7	36.4	63.0	45.5	40.2

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según sexo

Cuadro TRI8

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.2	0.8	1.5	1.5	1.4	1.5	2.7	0.6	1.6
Noroccidental	1.8	0.5	1.2	1.9	0.7	1.3	2.1	0.5	1.3
Nororiental	2.5	0.4	1.4	2.9	0.7	1.8	1.4	0.3	0.8
Occidental	1.8	0.7	1.3	1.4	1.5	1.5	2.0	0.8	1.4
Centro	1.1	0.2	0.6	2.1	0.7	1.4	1.6	0.5	1.0
Ciudad de México	1.5	0.2	0.8	0.8	0.9	0.9	3.0	1.3	2.1
Centro Sur	1.1	0.8	0.9	2.4	1.3	1.8	1.8	0.8	1.3
Sur	1.2	0.4	0.8	1.9	1.2	1.5	1.4	0.8	1.1
Nacional	1.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.5	1.9	0.7	1.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI9

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	5.4	0.9	0.4	3.5	1.5	0.7	3.2	1.9	0.8
Noroccidental	3.7	1.2	0.1	3.5	0.9	0.9	2.1	1.8	0.5
Nororiental	3.0	1.0	1.3	4.9	1.8	0.5	2.3	0.8	0.3
Occidental	2.1	2.0	0.2	5.7	0.6	0.6	3.7	1.3	0.5
Centro	1.5	0.5	0.4	3.9	1.5	0.2	3.2	0.7	0.5
Ciudad de México	1.0	0.6	1.0	2.5	1.1	0.2	4.9	2.8	0.8
Centro Sur	2.3	0.6	0.5	4.4	2.3	0.3	3.3	1.1	0.6
Sur	1.5	0.6	0.5	4.1	0.9	1.0	2.1	1.2	0.6
Nacional	2.3	0.8	0.5	4.2	1.4	0.5	3.1	1.2	0.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI10

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.1	1.1	0.4	4.1	1.7	0.4	4.0	3.4	1.5
Noroccidental	5.6	1.8	0.1	5.3	1.2	1.4	2.9	3.1	0.9
Nororiental	5.0	1.6	2.6	8.9	2.9	0.5	3.6	1.6	0.4
Occidental	3.4	2.6	0.3	5.8	0.9	0.1	4.8	2.3	0.4
Centro	2.4	1.0	0.7	5.4	2.4	0.5	4.2	1.4	0.7
Ciudad de México	--	1.3	2.2	1.1	1.3	0.2	8.4	3.0	1.3
Centro Sur	3.1	0.8	0.2	5.0	3.6	0.1	4.2	1.5	1.1
Sur	2.1	1.0	0.9	3.0	1.0	2.1	2.9	1.2	1.0
Nacional	3.4	1.3	0.8	5.1	2.1	0.6	4.2	1.9	0.8

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI11

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.0	0.8	0.4	2.9	1.3	0.9	2.3	0.5	0.2
Noroccidental	1.7	0.6	--	1.7	0.7	0.4	1.3	0.4	0.2
Nororiental	1.2	0.3	0.1	0.8	0.8	0.5	1.1	0.1	0.2
Occidental	0.7	1.5	0.1	5.6	0.3	1.0	2.5	0.3	0.6
Centro	0.7	0.1	0.1	2.4	0.7	--	2.2	0.1	0.3
Ciudad de México	1.8	--	--	3.9	0.9	0.2	1.2	2.6	0.4
Centro Sur	1.5	0.4	0.9	3.8	1.1	0.5	2.4	0.8	0.1
Sur	0.9	0.3	0.2	5.3	0.7	--	1.2	1.3	0.2
Nacional	1.1	0.4	0.2	3.2	0.8	0.3	1.9	0.6	0.3

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según sexo

Cuadro TRI12

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.6	0.5	1.0	1.5	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0
Noroccidental	0.6	***	0.3	0.3	0.1	0.2	0.9	0.4	0.7
Nororiental	0.9	0.4	0.6	1.4	0.9	1.2	0.8	0.4	0.6
Occidental	1.0	0.3	0.6	0.7	0.1	0.4	3.1	0.9	2.0
Centro	1.3	0.2	0.7	1.0	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5
Ciudad de México	1.5	0.5	0.9	1.6	0.3	0.9	1.1	0.4	0.7
Centro Sur	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	1.1	0.8	1.0
Sur	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5	0.9	0.5	0.7
Nacional	1.0	0.3	0.6	0.9	0.4	0.7	1.1	0.5	0.8

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI13

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.8	1.1	0.6	0.7	1.9	0.4	1.1	1.0	1.0
Noroccidental	0.1	0.6	--	0.3	0.2	0.1	0.9	0.9	0.3
Nororiental	0.3	0.7	0.7	3.0	1.1	0.5	1.2	0.8	0.2
Occidental	0.7	0.6	0.6	0.7	0.2	0.4	2.4	0.9	2.9
Centro	0.8	1.1	0.2	0.8	1.2	0.1	0.7	0.6	0.3
Ciudad de México	1.7	0.4	1.2	2.7	1.4	***	0.9	1.3	0.3
Centro Sur	0.8	0.5	0.5	0.9	0.9	0.1	1.4	1.2	0.6
Sur	0.6	0.3	0.3	1.0	0.3	0.5	0.7	0.6	0.7
Nacional	0.8	0.7	0.4	1.1	0.9	0.2	1.1	0.8	0.7

Porcentajes obtenidos según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI14

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	3.0	2.1	0.3	0.8	3.3	0.3	1.5	1.6	1.3
Noroccidental	0.3	1.2	--	0.5	0.3	0.1	0.7	1.4	0.4
Nororiental	0.7	1.1	0.7	3.8	2.0	--	1.4	1.3	0.1
Occidental	0.5	1.3	0.9	1.2	0.3	0.8	1.4	1.4	5.6
Centro	1.1	2.4	0.1	1.0	2.0	--	0.8	0.7	0.4
Ciudad de México	--	0.8	2.7	4.9	2.2	0.1	1.2	1.9	0.5
Centro Sur	1.0	0.1	0.6	0.2	1.8	--	1.3	1.3	0.9
Sur	0.6	0.2	0.5	0.9	0.6	0.7	1.0	0.8	0.9
Nacional	0.9	1.3	0.6	1.3	1.6	0.2	1.1	1.2	1.1

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI15

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	0.2	0.2	0.8	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.8
Noroccidental	--	0.1	--	--	--	0.2	1.2	0.4	0.2
Nororiental	--	0.3	0.6	2.1	0.4	1.1	1.1	0.3	0.2
Occidental	0.8	***	0.2	0.2	--	0.1	3.4	0.4	0.4
Centro	0.4	--	0.2	0.6	0.5	0.2	0.6	0.5	0.1
Ciudad de México	3.0	0.1	--	0.5	0.7	--	0.6	0.6	0.1
Centro Sur	0.5	0.7	0.4	1.6	0.1	0.1	1.6	1.1	0.3
Sur	0.6	0.4	0.1	1.2	--	0.4	0.3	0.5	0.5
Nacional	0.6	0.2	0.3	0.9	0.3	0.3	1.1	0.6	0.3

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según sexo

Cuadro TRI16

Región	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	6.1	1.3	3.7	7.1	1.6	4.3	6.0	1.7	3.8
Noroccidental	3.8	1.1	2.4	5.1	1.3	3.2	4.1	1.2	2.6
Nororiental	5.1	1.8	3.4	6.1	2.2	4.2	6.5	2.0	4.2
Occidental	3.9	1.2	2.5	6.9	2.2	4.5	9.6	2.3	5.8
Centro	3.5	1.0	2.2	7.0	2.7	4.8	6.3	1.7	3.9
Ciudad de México	5.2	1.7	3.3	4.1	1.8	2.9	7.1	2.0	4.5
Centro Sur	3.7	1.0	2.3	5.6	0.6	3.0	6.2	1.6	3.8
Sur	1.9	0.4	1.1	2.5	0.6	1.5	5.2	0.9	3.0
Nacional	3.9	1.1	2.5	5.8	1.8	3.7	6.4	1.7	4.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI17

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.0	3.8	1.6	9.7	5.0	1.5	5.0	4.8	2.5
Noroccidental	4.2	3.3	0.7	7.8	3.4	1.2	4.1	3.6	1.2
Nororiental	8.9	2.9	1.7	10.8	5.4	0.6	6.4	5.3	2.5
Occidental	3.9	3.2	1.2	12.7	3.7	2.0	8.6	5.8	4.8
Centro	3.8	2.2	1.4	11.3	5.7	1.2	6.1	4.6	2.3
Ciudad de México	7.7	3.6	1.6	7.1	4.3	0.8	3.8	6.4	3.2
Centro Sur	4.8	2.3	1.0	4.6	4.3	1.1	6.2	3.7	2.8
Sur	3.2	0.8	0.3	3.9	1.5	0.5	3.1	3.6	2.4
Nacional	4.9	2.6	1.2	8.8	4.5	1.1	5.7	4.6	2.7

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI18

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	11.4	6.8	2.7	14.0	8.6	2.9	6.1	7.9	4.0
Noroccidental	6.9	5.0	0.9	11.5	6.1	1.7	5.1	6.3	1.6
Nororiental	14.1	4.5	2.4	16.1	7.8	0.8	9.1	8.6	3.6
Occidental	5.2	5.5	1.7	17.2	6.5	2.9	11.2	9.8	8.6
Centro	5.2	3.7	2.5	15.2	8.7	1.8	8.3	7.8	4.1
Ciudad de México	9.7	6.8	2.3	10.5	5.8	1.0	3.8	10.6	5.2
Centro Sur	8.0	3.1	1.9	7.6	8.6	1.9	8.3	6.2	5.1
Sur	4.7	1.7	0.5	5.1	2.7	1.0	4.4	6.6	4.1
Nacional	7.2	4.3	2.0	12.4	7.3	1.8	7.6	7.8	4.5

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
TENDENCIAS DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y
CONDUCTA ANTISOCIAL POR REGIÓN**


Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI19

	Encuestas Nacionales								
	2008			2011			2016		
	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años
Región	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norcentral	3.8	1.1	0.6	5.3	1.5	0.2	3.8	1.6	1.0
Noroccidental	1.4	1.6	0.4	3.9	0.8	0.8	3.0	1.0	0.7
Nororiental	4.5	1.4	1.1	5.4	3.1	0.4	3.6	2.1	1.4
Occidental	2.4	1.1	0.8	8.2	1.1	1.1	5.9	2.0	1.3
Centro	2.3	1.0	0.5	7.3	3.0	0.7	3.8	1.7	0.8
Ciudad de México	6.2	1.1	0.9	3.8	2.8	0.7	3.8	2.2	1.5
Centro Sur	1.7	1.7	0.1	1.5	0.5	0.4	4.1	1.5	0.8
Sur	1.8	0.1	0.2	2.6	0.3	--	1.7	0.7	0.7
Nacional	2.6	1.1	0.5	5.1	1.8	0.6	3.8	1.6	1.0

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 9: INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad (2)

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad (2)

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad (1)

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad (2)

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad (1)

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad (2)

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad

Cuadro ICI1

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-17	63.3	61.361-65.327
18-34	45.7	43.606-47.829
35-65	36.1	34.405-37.841
Subtotal	44.7	43.524-45.968
Mujeres		
12-17	71.3	69.479-73.171
18-34	50.7	48.895-52.441
35-65	40.2	38.904-41.427
Subtotal	49.4	48.365-50.361
Total 12-17	67.3	65.894-68.685
Total 18-34	48.3	46.882-49.671
Total 35-65	38.3	37.200-39.300
Total	47.1	46.334-47.933

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad

Cuadro ICI2

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-25	56.8	54.824-58.759
26-34	38.8	36.061-41.561
35-65	36.1	34.405-37.841
Subtotal	44.7	43.524-45.968
Mujeres		
12-25	63.0	61.441-64.584
26-34	45.5	43.067-47.866
35-65	40.2	38.904-41.427
Subtotal	49.4	48.365-50.361
Total 12-25	59.8	58.536-61.162
Total 26-34	42.4	40.633-44.263
Total 35-65	38.3	37.200-39.300
Total	47.1	46.334-47.933

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
 Secretaría de Salud
 Comisión Nacional Contra las Adicciones
 Instituto Nacional de Salud Pública
 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad

Cuadro ICI3

Sexo/Edad	Tomar dinero o cosas de valor		Atacar a alguien con algún objeto	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	4.2	3.433-5.006	1.1	0.751-1.400
18-34	1.9	1.401-2.431	1.2	0.791-1.525
35-65	0.8	0.603-1.091	1.1	0.025-2.204
Subtotal	1.9	1.599-2.136	1.1	0.636-1.614
Mujeres				
12-17	1.9	1.355-2.491	1.1	0.402-1.856
18-34	0.6	0.260-0.929	0.6	0.312-0.806
35-65	0.3	0.113-0.434	0.3	0.194-0.376
Subtotal	0.7	0.491-0.843	0.5	0.372-0.687
Total 12-17	3.1	2.600-3.569	1.1	0.710-1.494
Total 18-34	1.2	0.930-1.536	0.8	0.630-1.066
Total 35-65	0.5	0.403-0.687	0.7	0.157-1.199
Total	1.2	1.089-1.404	0.8	0.566-1.068

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad

Cuadro ICI4

Sexo/Edad	Tomar parte en riñas o peleas		Usar cuchillo o pistola para obtener objetos	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	7.6	6.590-8.602	0.2	0.083-0.345
18-34	7.8	6.726-8.935	0.4	0.131-0.642
35-65	4.5	3.338-5.754	0.3	0.133-0.529
Subtotal	6.4	5.704-7.085	0.3	0.199-0.467
Mujeres				
12-17	3.8	2.838-4.665	***	---
18-34	1.6	1.195-2.009	***	0.004-0.084
35-65	1.0	0.736-1.253	***	0.002-0.058
Subtotal	1.7	1.431-1.929	***	0.014-0.055
Total 12-17	5.7	5.023-6.367	0.1	0.052-0.188
Total 18-34	4.6	4.024-5.198	0.2	0.084-0.335
Total 35-65	2.7	2.082-3.272	0.2	0.078-0.268
Total	4.0	3.588-4.325	0.2	0.113-0.244

***Porcentaje obtenido menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad

Cuadro IC15

Sexo/Edad	Mariguana		Alucinógenos		Cocaína		Heroína	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	81.3	80.337-82.260	58.4	57.098-59.723	78.5	77.498-79.504	68.8	67.499-70.042
Mujeres	83.0	82.246-83.843	57.6	56.540-58.716	77.2	76.312-78.066	67.5	66.464-68.573
Total	82.2	81.514-82.888	58.0	57.029-58.983	77.8	77.078-78.567	68.1	67.173-69.073
Total 12-25	81.5	80.362-82.590	54.8	53.242-56.268	76.1	74.960-77.221	66.7	65.377-68.049
Total 26-34	82.2	80.873-83.577	60.8	58.995-62.589	80.5	79.069-81.913	70.1	68.210-71.897
Total 35-65	82.8	81.922-83.712	59.6	58.384-60.750	78.1	77.194-79.056	68.5	67.322-69.631

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre el potencial adictivo de diferentes sustancias según sexo y edad

Cuadro ICI6

Sexo/Edad	Inhalables		Alcohol		Tabaco	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	62.9	61.536-64.270	74.6	73.336-75.769	72.9	71.668-74.173
Mujeres	62.3	61.123-63.431	76.2	75.244-77.163	73.6	72.631-74.651
Total	62.6	61.545-63.613	75.4	74.535-76.277	73.3	72.374-74.212
Total 12-25	60.6	59.100-62.085	74.0	72.800-75.226	73.2	71.909-74.452
Total 26-34	65.2	63.319-67.032	76.7	75.043-78.332	73.9	72.150-75.576
Total 35-65	63.1	61.932-64.336	76.0	74.945-77.128	73.1	72.028-74.243

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad

Cuadro ICI7

Sexo/Edad	Que los metan en la cárcel		Que los internen en hospitales psiquiátricos		Curarles en su propio ambiente	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	1.5	1.280-1.762	3.9	3.548-4.266	6.3	5.594-7.029
Mujeres	1.0	0.895-1.220	3.5	3.145-3.848	4.6	4.144-5.017
Total	1.3	1.127-1.421	3.7	3.433-3.940	5.4	4.975-5.832
Total 12-25	1.8	1.567-2.152	5.2	4.737-5.679	5.5	4.931-6.205
Total 26-34	0.9	0.636-1.169	2.3	1.854-2.745	5.1	4.317-6.113
Total 35-65	1.0	0.796-1.145	3.0	2.668-3.407	5.4	4.725-6.101

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad

Cuadro ICI8

	Que se curen por su propia cuenta		Que los internen en un centro de rehabilitación		Que los internen en un anexo		Otra	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	6.1	5.504-6.783	71.5	70.345-72.713	8.0	7.236-8.785	2.7	2.391-3.047
Mujeres	4.2	3.857-4.592	75.8	74.906-76.661	8.2	7.654-8.853	2.7	2.366-3.030
Total	5.1	4.756-5.528	73.7	72.966-74.504	8.1	7.631-8.615	2.7	2.459-2.940
Total 12-25	5.0	4.459-5.620	72.0	70.693-73.217	8.8	7.888-9.908	1.6	1.300-2.005
Total 26-34	5.8	4.836-7.060	75.3	73.608-76.994	8.2	7.399-9.116	2.3	1.887-2.881
Total 35-65	4.9	4.455-5.406	74.6	73.518-75.556	7.4	6.882-8.011	3.8	3.391-4.194

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 10: INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

Listado de Tablas

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (1)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (1)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (1)

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (2)

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (2)

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por estado según edad (2)

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por estado según edad

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por estado según edad

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según sexo

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según edad

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según edad

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por estado según edad

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según sexo**

Cuadro ICEI1

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	40.7	35.816-45.485	47.1	43.910-50.339	44.0	40.829-47.220
Baja California	42.9	38.584-47.307	48.3	44.416-52.154	45.6	42.605-48.571
Baja California Sur	43.7	39.584-47.850	50.5	46.857-54.145	47.0	44.002-50.034
Campeche	54.3	49.518-59.053	51.9	48.224-55.637	53.1	50.124-56.036
Chiapas	44.4	39.525-49.344	56.9	53.243-60.512	50.9	47.650-54.179
Chihuahua	41.2	36.334-46.099	42.8	37.683-47.848	42.0	38.099-45.904
Ciudad de México	39.0	34.375-43.627	44.5	40.317-48.611	41.9	38.491-45.217
Coahuila	40.4	35.133-45.693	41.8	37.871-45.794	41.1	37.643-44.619
Colima	45.1	38.620-51.620	49.7	45.201-54.121	47.4	43.236-51.576
Durango	45.1	40.299-49.869	51.9	47.548-56.319	48.6	45.342-51.906
Estado de México	45.7	40.106-51.268	49.9	45.796-53.949	47.9	44.673-51.047
Guanajuato	46.8	42.663-50.874	46.8	43.386-50.297	46.8	44.121-49.493
Guerrero	46.5	42.341-50.719	52.2	48.467-55.890	49.5	46.328-52.631
Hidalgo	50.6	46.240-55.056	58.5	54.152-62.884	54.8	51.549-58.020
Jalisco	44.6	37.975-51.193	44.1	38.267-49.889	44.3	39.730-48.918
Michoacán	43.9	39.548-48.179	43.7	39.662-47.670	43.8	41.007-46.514
Morelos	42.5	38.171-46.800	44.6	39.967-49.220	43.6	40.136-47.046
Nayarit	50.8	46.460-55.078	48.3	44.304-52.267	49.5	46.640-52.380
Nuevo León	37.1	32.456-41.841	38.2	34.119-42.192	37.7	34.562-40.754
Oaxaca	45.4	39.838-50.931	56.7	52.689-60.768	51.4	47.436-55.371
Puebla	42.3	36.802-47.758	51.7	47.889-55.539	47.3	43.602-50.991
Querétaro	45.5	40.722-50.182	53.3	49.311-57.372	49.6	46.550-52.608
Quintana Roo	44.9	40.175-49.564	50.2	45.845-54.516	47.5	44.609-50.353
San Luis Potosí	43.6	37.489-49.708	54.5	50.768-58.330	49.3	45.481-53.110
Sinaloa	48.6	44.537-52.761	52.6	49.106-56.098	50.6	47.649-53.642
Sonora	44.6	40.028-49.246	51.2	47.240-55.220	47.9	44.820-51.058
Tabasco	49.7	44.703-54.629	54.4	50.989-57.748	52.1	49.175-55.019
Tamaulipas	44.5	39.338-49.665	45.1	40.658-49.505	44.8	41.325-48.268
Tlaxcala	50.5	45.682-55.330	56.6	52.466-60.775	53.7	50.133-57.286
Veracruz	50.6	46.012-55.221	57.8	53.900-61.674	54.3	51.157-57.536
Yucatán	48.3	42.881-53.690	47.0	41.412-52.494	47.6	43.850-51.352
Zacatecas	49.1	44.502-53.663	55.7	51.948-59.493	52.6	49.754-55.364
Nacional	44.7	43.524-45.968	49.4	48.365-50.361	47.1	46.334-47.933

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI2

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	59.5	53.553-65.415	45.6	39.982-51.287	35.7	31.617-39.856
Baja California	67.9	62.312-73.398	46.3	40.700-51.919	36.7	32.700-40.749
Baja California Sur	68.5	62.449-74.531	46.2	41.214-51.166	40.3	36.026-44.553
Campeche	72.8	68.248-77.445	54.2	49.224-59.121	43.9	38.909-48.969
Chiapas	64.0	58.071-69.974	49.1	44.054-54.060	45.9	41.659-50.118
Chihuahua	63.2	54.950-71.424	44.0	37.418-50.669	32.3	27.878-36.669
Ciudad de México	71.1	64.118-78.011	43.8	38.158-49.451	32.8	28.825-36.724
Coahuila	64.3	58.226-70.343	41.4	36.104-46.638	32.0	27.723-36.265
Colima	65.2	58.846-71.535	51.5	45.009-58.078	37.1	30.672-43.611
Durango	69.7	65.056-74.323	47.9	42.573-53.257	40.3	35.990-44.575
Estado de México	73.4	67.819-79.007	46.5	40.445-52.623	39.8	35.683-43.854
Guanajuato	64.9	59.276-70.435	46.7	42.434-50.945	38.9	35.407-42.349
Guerrero	62.9	57.567-68.193	48.7	41.797-55.594	43.4	38.140-48.611
Hidalgo	71.2	65.909-76.532	61.3	56.357-66.272	42.3	37.687-46.947
Jalisco	59.0	51.192-66.900	46.7	39.262-54.073	36.3	30.436-42.143
Michoacán	61.7	55.903-67.506	43.9	39.256-48.633	35.7	31.436-39.995
Morelos	66.8	60.966-72.689	48.0	42.131-53.887	31.1	26.824-35.298
Nayarit	72.2	66.178-78.299	49.8	44.510-55.011	40.5	35.988-44.993
Nuevo León	65.5	60.507-70.526	43.8	38.027-49.631	23.4	19.540-27.347
Oaxaca	63.4	56.586-70.117	47.1	40.336-53.808	49.7	44.491-54.940
Puebla	67.5	61.627-73.309	47.1	40.582-53.563	38.4	33.183-43.599
Querétaro	71.3	66.083-76.501	49.6	44.519-54.676	40.6	36.149-44.966
Quintana Roo	64.8	58.731-70.907	47.8	42.513-53.052	40.3	35.968-44.573
San Luis Potosí	74.0	68.763-79.240	52.5	46.467-58.470	35.6	30.279-40.900
Sinaloa	70.4	64.147-76.656	53.3	48.127-58.507	40.7	36.676-44.788
Sonora	67.5	62.086-72.924	50.3	44.945-55.661	38.8	34.988-42.514
Tabasco	63.5	58.405-68.637	54.4	48.922-59.785	45.1	41.060-49.093
Tamaulipas	66.3	61.123-71.511	49.0	42.713-55.199	33.5	29.468-37.502
Tlaxcala	73.9	68.440-79.262	54.6	49.000-60.219	44.2	38.604-49.891
Veracruz	68.3	62.301-74.337	58.0	52.827-63.265	46.0	41.718-50.225
Yucatán	68.4	62.585-74.128	49.1	42.053-56.124	38.4	33.742-43.079
Zacatecas	73.1	67.847-78.297	53.4	47.777-58.951	42.9	38.603-47.280
Nacional	67.3	65.894-68.685	48.3	46.882-49.671	38.3	37.200-39.300

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI3

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	54.5	44.912-64.141	40.5	31.869-49.076	34.4	28.465-40.373
Baja California	64.5	55.766-73.323	40.1	32.444-47.759	37.6	31.327-43.926
Baja California Sur	66.0	57.795-74.203	41.9	34.435-49.374	37.8	31.625-43.916
Campeche	67.0	59.903-73.999	57.0	49.953-64.041	46.3	37.974-54.638
Chiapas	58.6	50.573-66.574	42.3	33.344-51.248	38.8	32.322-45.197
Chihuahua	58.1	45.235-70.977	41.3	32.814-49.719	34.6	28.042-41.138
Ciudad de México	69.8	59.635-79.960	38.0	30.335-45.717	30.7	24.657-36.793
Coahuila	58.2	49.790-66.656	41.3	32.959-49.708	32.1	25.549-38.649
Colima	59.9	51.923-67.953	49.0	39.268-58.651	35.8	24.132-47.491
Durango	69.8	63.009-76.558	42.2	34.129-50.270	36.6	29.586-43.575
Estado de México	69.5	61.556-77.472	44.3	34.810-53.830	37.7	30.095-45.217
Guanajuato	60.2	51.385-69.002	51.9	45.440-58.417	35.2	29.394-41.019
Guerrero	62.0	53.812-70.251	46.4	36.392-56.347	38.2	31.632-44.762
Hidalgo	65.7	58.180-73.311	60.9	53.297-68.483	35.1	28.720-41.483
Jalisco	59.0	49.402-68.634	45.4	35.830-54.921	37.6	26.523-48.691
Michoacán	56.7	48.432-65.004	47.0	39.043-54.995	34.9	28.401-41.377
Morelos	66.3	58.209-74.357	48.9	41.026-56.784	27.2	21.099-33.247
Nayarit	74.4	67.097-81.641	50.9	43.005-58.846	41.1	35.059-47.121
Nuevo León	63.7	55.854-71.491	44.4	35.643-53.182	21.7	16.735-26.762
Oaxaca	59.6	49.438-69.670	36.6	26.846-46.423	45.8	38.052-53.501
Puebla	63.6	54.009-73.190	39.6	29.154-49.976	34.6	27.050-42.247
Querétaro	64.8	55.401-74.200	48.0	40.107-55.811	34.4	27.443-41.280
Quintana Roo	63.6	54.433-72.800	45.2	35.807-54.556	37.0	30.502-43.574
San Luis Potosí	71.8	63.131-80.435	41.8	33.724-49.789	32.2	22.873-41.546
Sinaloa	72.3	64.651-79.858	50.6	43.358-57.756	37.7	31.701-43.658
Sonora	58.6	49.695-67.405	47.2	39.299-55.141	37.1	31.036-43.067
Tabasco	58.3	51.070-65.536	53.4	44.584-62.282	42.1	36.346-47.794
Tamaulipas	59.6	51.118-68.023	51.4	42.650-60.216	32.6	26.593-38.686
Tlaxcala	70.8	63.401-78.181	53.2	44.968-61.415	38.4	31.715-45.128
Veracruz	57.8	49.853-65.708	52.7	43.764-61.724	45.9	39.637-52.148
Yucatán	64.6	56.656-72.449	54.8	45.902-63.796	35.7	28.523-42.945
Zacatecas	67.0	59.086-74.962	52.0	42.560-61.508	37.9	31.438-44.434
Nacional	63.3	61.361-65.327	45.7	43.606-47.829	36.1	34.405-37.841

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI4

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	64.4	57.688-71.109	50.5	44.784-56.152	36.9	32.036-41.735
Baja California	71.3	62.757-79.899	52.6	46.430-58.793	35.8	30.760-40.857
Baja California Sur	71.1	62.592-79.559	50.7	44.530-56.897	43.0	37.532-48.391
Campeche	78.8	72.872-84.786	51.5	45.236-57.847	41.7	35.885-47.491
Chiapas	69.5	61.562-77.490	54.9	49.756-60.097	52.5	46.906-58.171
Chihuahua	68.4	59.210-77.530	46.8	38.763-54.848	30.1	24.305-35.895
Ciudad de México	72.4	62.619-82.262	49.4	42.365-56.441	34.5	29.670-39.309
Coahuila	70.7	62.608-78.796	41.4	34.917-47.900	31.9	26.287-37.509
Colima	70.8	61.870-79.652	54.1	46.593-61.659	38.4	32.490-44.321
Durango	69.6	61.910-77.277	53.3	47.076-59.578	43.6	37.251-49.915
Estado de México	77.4	71.054-83.715	48.6	40.372-56.845	41.6	36.960-46.318
Guanajuato	69.5	62.493-76.487	42.1	36.543-47.572	42.1	38.008-46.130
Guerrero	63.7	55.695-71.764	50.8	43.351-58.290	47.9	41.488-54.325
Hidalgo	76.8	70.306-83.264	61.7	54.945-68.419	48.7	42.107-55.387
Jalisco	59.1	47.214-70.939	47.9	37.857-57.960	35.1	28.189-42.041
Michoacán	66.8	59.462-74.048	41.2	35.342-47.114	36.5	31.031-41.881
Morelos	67.4	58.793-75.968	47.2	39.138-55.263	34.5	28.712-40.194
Nayarit	70.0	61.502-78.539	48.6	41.077-56.192	39.9	33.968-45.870
Nuevo León	67.4	59.921-74.898	43.2	35.420-51.060	25.0	19.874-30.180
Oaxaca	67.2	57.984-76.338	55.5	48.620-62.338	53.3	47.135-59.443
Puebla	71.2	64.013-78.442	53.7	47.564-59.741	41.6	36.065-47.049
Querétaro	77.7	71.548-83.941	51.1	44.534-57.647	46.0	40.618-51.401
Quintana Roo	66.1	56.195-75.980	50.4	43.902-56.977	43.6	37.549-49.714
San Luis Potosí	76.2	70.048-82.447	62.2	54.826-69.488	38.6	33.180-44.090
Sinaloa	68.5	59.358-77.660	56.0	49.519-62.520	43.7	38.743-48.614
Sonora	76.7	69.963-83.370	53.5	46.196-60.760	40.4	35.929-44.830
Tabasco	68.8	61.860-75.769	55.2	49.132-61.274	47.8	42.215-53.435
Tamaulipas	73.1	67.207-79.052	46.5	38.021-55.059	34.3	29.166-39.395
Tlaxcala	77.0	68.855-85.099	55.9	49.623-62.145	49.3	42.241-56.436
Veracruz	79.2	69.642-88.846	62.9	57.235-68.524	46.0	40.743-51.342
Yucatán	72.1	63.442-80.851	43.7	33.807-53.494	40.9	34.820-46.978
Zacatecas	79.5	73.299-85.698	54.5	47.720-61.288	47.4	42.208-52.668
Nacional	71.3	69.479-73.171	50.7	48.895-52.441	40.2	38.904-41.427

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI5

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	55.0	50.148-59.924	38.4	32.227-44.573	35.7	31.617-39.856
Baja California	58.5	53.508-63.514	42.4	35.321-49.386	36.7	32.700-40.749
Baja California Sur	60.5	55.801-65.189	38.8	32.531-44.984	40.3	36.026-44.553
Campeche	68.3	63.951-72.726	42.9	36.866-48.928	43.9	38.909-48.969
Chiapas	58.6	53.859-63.300	44.9	37.861-51.845	45.9	41.659-50.118
Chihuahua	55.6	49.777-61.461	40.1	30.902-49.282	32.3	27.878-36.669
Ciudad de México	57.2	51.362-63.049	41.3	33.116-49.544	32.8	28.825-36.724
Coahuila	56.1	50.579-61.613	31.1	23.924-38.350	32.0	27.723-36.265
Colima	61.3	55.261-67.435	45.0	37.325-52.716	37.1	30.672-43.611
Durango	60.6	55.679-65.538	41.7	35.168-48.179	40.3	35.990-44.575
Estado de México	62.6	56.841-68.336	38.5	30.887-46.139	39.8	35.683-43.854
Guanajuato	57.7	53.624-61.785	41.5	35.715-47.360	38.9	35.407-42.349
Guerrero	61.2	56.941-65.401	39.7	31.316-48.148	43.4	38.140-48.611
Hidalgo	71.8	67.290-76.222	50.9	43.683-58.039	42.3	37.687-46.947
Jalisco	55.2	47.412-62.993	39.0	30.449-47.516	36.3	30.436-42.143
Michoacán	53.7	49.228-58.116	40.9	33.741-48.025	35.7	31.436-39.995
Morelos	62.1	56.659-67.564	36.3	29.253-43.379	31.1	26.824-35.298
Nayarit	63.8	58.753-68.762	43.2	35.908-50.444	40.5	35.988-44.993
Nuevo León	54.0	48.295-59.644	40.1	31.318-48.792	23.4	19.540-27.347
Oaxaca	56.0	50.164-61.881	45.8	36.386-55.229	49.7	44.491-54.940
Puebla	60.0	53.600-66.339	38.9	31.199-46.638	38.4	33.183-43.599
Querétaro	63.9	59.471-68.251	41.8	34.698-48.887	40.6	36.149-44.966
Quintana Roo	57.1	51.928-62.346	41.8	33.997-49.594	40.3	35.968-44.573
San Luis Potosí	63.6	58.496-68.752	50.2	41.715-58.682	35.6	30.279-40.900
Sinaloa	65.9	60.987-70.873	43.3	36.132-50.456	40.7	36.676-44.788
Sonora	64.2	59.254-69.229	38.8	31.682-45.851	38.8	34.988-42.514
Tabasco	60.6	56.117-65.120	49.4	42.888-56.008	45.1	41.060-49.093
Tamaulipas	60.2	54.372-65.953	38.5	31.570-45.483	33.5	29.468-37.502
Tlaxcala	65.7	60.801-70.587	48.3	40.317-56.191	44.2	38.604-49.891
Veracruz	62.8	57.673-68.014	58.5	52.508-64.401	46.0	41.718-50.225
Yucatán	60.7	52.614-68.860	42.3	34.816-49.794	38.4	33.742-43.079
Zacatecas	64.4	59.272-69.547	49.6	42.401-56.842	42.9	38.603-47.280
Nacional	59.8	58.536-61.162	42.4	40.633-44.263	38.3	37.200-39.300

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI6

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	49.0	40.845-57.178	34.8	24.432-45.107	34.4	28.465-40.373
Baja California	55.3	47.130-63.516	32.6	22.615-42.505	37.6	31.327-43.926
Baja California Sur	59.6	52.705-66.503	28.0	19.450-36.548	37.8	31.625-43.916
Campeche	68.0	61.711-74.276	41.9	31.779-52.075	46.3	37.974-54.638
Chiapas	55.9	49.032-62.756	32.4	20.954-43.768	38.8	32.322-45.197
Chihuahua	49.8	42.287-57.272	40.1	27.751-52.485	34.6	28.042-41.138
Ciudad de México	51.4	42.653-60.162	38.5	27.582-49.402	30.7	24.657-36.793
Coahuila	51.6	43.248-60.013	34.2	22.799-45.589	32.1	25.549-38.649
Colima	57.1	49.503-64.764	42.1	28.807-55.458	35.8	24.132-47.491
Durango	56.6	50.026-63.264	38.4	28.521-48.272	36.6	29.586-43.575
Estado de México	59.8	50.903-68.730	33.1	21.047-45.111	37.7	30.095-45.217
Guanajuato	59.0	52.902-65.017	44.9	34.030-55.709	35.2	29.394-41.019
Guerrero	59.0	52.581-65.341	38.8	24.884-52.678	38.2	31.632-44.762
Hidalgo	70.6	63.644-77.514	46.7	35.930-57.411	35.1	28.720-41.483
Jalisco	50.3	40.642-60.046	47.4	34.016-60.792	37.6	26.523-48.691
Michoacán	53.1	46.101-60.005	43.2	31.810-54.510	34.9	28.401-41.377
Morelos	60.8	53.496-68.170	37.9	27.160-48.730	27.2	21.099-33.247
Nayarit	67.4	60.383-74.448	39.4	29.255-49.578	41.1	35.059-47.121
Nuevo León	51.8	43.321-60.212	44.8	31.307-58.231	21.7	16.735-26.762
Oaxaca	51.6	43.307-59.842	31.5	18.567-44.364	45.8	38.052-53.501
Puebla	54.3	44.324-64.193	29.1	18.186-40.068	34.6	27.050-42.247
Querétaro	61.0	53.632-68.375	37.6	26.206-49.024	34.4	27.443-41.280
Quintana Roo	55.4	46.019-64.731	37.8	26.217-49.364	37.0	30.502-43.574
San Luis Potosí	58.0	50.366-65.659	36.2	23.864-48.595	32.2	22.873-41.546
Sinaloa	68.2	62.414-74.017	31.8	22.440-41.257	37.7	31.701-43.658
Sonora	56.8	49.798-63.832	35.2	24.863-45.499	37.1	31.036-43.067
Tabasco	59.4	52.032-66.778	43.7	32.007-55.419	42.1	36.346-47.794
Tamaulipas	62.2	53.805-70.588	32.3	22.472-42.065	32.6	26.593-38.686
Tlaxcala	64.3	56.970-71.714	42.8	30.979-54.596	38.4	31.715-45.128
Veracruz	55.2	46.709-63.732	52.6	42.557-62.599	45.9	39.637-52.148
Yucatán	62.7	54.227-71.114	47.4	34.934-59.799	35.7	28.523-42.945
Zacatecas	63.8	56.442-71.185	38.0	23.463-52.543	37.9	31.438-44.434
Nacional	56.8	54.824-58.759	38.8	36.061-41.561	36.1	34.405-37.841

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención
por estado según edad**

Cuadro ICEI7

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	61.1	55.976-66.192	41.5	34.652-48.310	36.9	32.036-41.735
Baja California	62.0	55.483-68.477	51.5	43.423-59.521	35.8	30.760-40.857
Baja California Sur	61.5	55.524-67.527	48.5	40.812-56.185	43.0	37.532-48.391
Campeche	68.7	62.783-74.626	43.7	36.347-50.960	41.7	35.885-47.491
Chiapas	61.0	55.185-66.833	56.4	48.967-63.911	52.5	46.906-58.171
Chihuahua	61.9	54.361-69.355	40.1	30.508-49.630	30.1	24.305-35.895
Ciudad de México	63.4	55.965-70.775	43.9	34.793-53.037	34.5	29.670-39.309
Coahuila	61.0	54.956-66.970	28.3	20.030-36.596	31.9	26.287-37.509
Colima	66.1	57.877-74.261	47.5	39.629-55.365	38.4	32.490-44.321
Durango	64.5	57.667-71.307	44.8	36.785-52.757	43.6	37.251-49.915
Estado de México	65.6	59.086-72.203	42.5	31.265-53.803	41.6	36.960-46.318
Guanajuato	56.5	50.347-62.601	38.9	31.645-46.086	42.1	38.008-46.130
Guerrero	63.3	56.634-69.958	40.6	32.168-49.029	47.9	41.488-54.325
Hidalgo	72.9	67.521-78.228	54.4	44.452-64.351	48.7	42.107-55.387
Jalisco	60.1	50.991-69.117	30.8	21.185-40.514	35.1	28.189-42.041
Michoacán	54.3	48.273-60.337	39.2	30.867-47.529	36.5	31.031-41.881
Morelos	63.5	56.631-70.308	35.1	25.857-44.435	34.5	28.712-40.194
Nayarit	59.9	53.098-66.686	46.5	36.378-56.551	39.9	33.968-45.870
Nuevo León	56.2	48.422-64.046	35.4	24.750-46.074	25.0	19.874-30.180
Oaxaca	60.0	53.073-66.873	57.7	49.247-66.178	53.3	47.135-59.443
Puebla	65.7	60.114-71.217	46.0	36.258-55.818	41.6	36.065-47.049
Querétaro	66.7	59.813-73.551	45.3	36.787-53.884	46.0	40.618-51.401
Quintana Roo	59.1	52.309-65.792	45.5	37.012-53.983	43.6	37.549-49.714
San Luis Potosí	69.3	63.562-75.120	61.1	51.423-70.802	38.6	33.180-44.090
Sinaloa	63.5	56.884-70.066	52.9	43.461-62.427	43.7	38.743-48.614
Sonora	73.4	67.497-79.363	41.4	30.954-51.801	40.4	35.929-44.830
Tabasco	61.9	56.278-67.498	53.9	46.660-61.056	47.8	42.215-53.435
Tamaulipas	58.1	50.561-65.632	44.3	34.778-53.729	34.3	29.166-39.395
Tlaxcala	67.1	61.110-73.138	52.1	43.189-61.019	49.3	42.241-56.436
Veracruz	71.2	65.167-77.248	62.8	55.583-69.960	46.0	40.743-51.342
Yucatán	58.8	45.083-72.604	37.7	28.400-46.908	40.9	34.820-46.978
Zacatecas	65.1	58.509-71.639	56.7	48.278-65.154	47.4	42.208-52.668
Nacional	63.0	61.441-64.584	45.5	43.067-47.866	40.2	38.904-41.427

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según sexo**

Cuadro ICEI8

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.0	0.805-3.131	1.2	0.461-1.890	1.6	0.854-2.256
Baja California	2.2	0.974-3.459	0.5	0.081-0.947	1.4	0.717-2.031
Baja California Sur	2.3	0.482-4.060	0.8	0.219-1.448	1.6	0.590-2.553
Campeche	3.3	1.549-5.034	0.3	---	1.8	0.930-2.642
Chiapas	0.6	0.155-1.097	1.0	---	0.8	0.193-1.424
Chihuahua	1.9	0.878-2.958	0.4	0.008-0.775	1.1	0.598-1.691
Ciudad de México	3.0	1.258-4.702	1.3	---	2.1	1.011-3.230
Coahuila	2.9	1.495-4.379	0.4	0.008-0.707	1.6	0.889-2.375
Colima	1.3	0.583-2.040	1.7	0.171-3.244	1.5	0.690-2.332
Durango	3.8	2.183-5.391	1.6	0.541-2.605	2.6	1.717-3.568
Estado de México	1.3	0.411-2.138	0.7	0.112-1.213	1.0	0.467-1.446
Guanajuato	2.6	1.119-4.146	0.2	---	1.3	0.594-2.082
Guerrero	1.0	0.156-1.868	0.6	---	0.8	0.270-1.344
Hidalgo	0.9	0.187-1.691	0.5	0.037-0.903	0.7	0.169-1.216
Jalisco	2.0	0.826-3.105	0.5	---	1.2	0.582-1.793
Michoacán	2.0	0.971-3.066	0.5	---	1.2	0.674-1.792
Morelos	1.5	0.179-2.834	0.7	0.102-1.293	1.1	0.392-1.773
Nayarit	1.5	0.643-2.416	1.3	0.356-2.224	1.4	0.676-2.140
Nuevo León	1.4	0.530-2.276	0.4	0.063-0.782	0.9	0.452-1.363
Oaxaca	2.0	0.529-3.387	1.5	0.024-2.974	1.7	0.693-2.736
Puebla	1.8	0.798-2.898	0.4	---	1.1	0.518-1.669
Querétaro	1.4	0.428-2.368	0.4	0.097-0.769	0.9	0.397-1.390
Quintana Roo	2.0	0.546-3.539	0.4	0.057-0.737	1.2	0.446-2.021
San Luis Potosí	1.7	0.237-3.263	0.5	0.019-0.895	1.1	0.328-1.827
Sinaloa	2.5	1.165-3.856	0.1	---	1.3	0.615-1.963
Sonora	1.6	0.176-2.980	0.7	0.044-1.389	1.1	0.379-1.914
Tabasco	1.7	0.760-2.666	0.6	0.013-1.188	1.1	0.607-1.668
Tamaulipas	1.1	0.225-2.042	--	---	0.6	0.106-1.007
Tlaxcala	1.9	0.763-3.091	0.7	0.039-1.314	1.3	0.642-1.902
Veracruz	2.0	0.687-3.259	0.6	---	1.3	0.532-2.022
Yucatán	1.6	0.603-2.632	1.2	0.255-2.062	1.4	0.723-2.039
Zacatecas	2.7	0.888-4.428	1.5	0.509-2.434	2.0	0.789-3.284
Nacional	1.9	1.599-2.136	0.7	0.491-0.843	1.2	1.089-1.404

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según edad**

Cuadro ICEI9

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.6	0.962-4.183	2.4	1.007-3.745	0.3	---
Baja California	1.2	0.080-2.309	1.9	0.435-3.341	0.9	0.304-1.587
Baja California Sur	2.5	0.552-4.357	1.8	---	1.0	0.250-1.732
Campeche	3.6	1.538-5.652	1.8	0.250-3.409	1.0	0.022-1.986
Chiapas	1.2	0.205-2.268	1.2	---	0.1	---
Chihuahua	3.0	1.001-4.979	1.5	0.482-2.502	0.1	---
Ciudad de México	4.9	1.607-8.212	2.8	0.316-5.337	0.8	0.016-1.676
Coahuila	2.7	1.056-4.265	2.4	0.757-4.101	0.5	0.017-0.985
Colima	5.6	0.915-10.203	0.9	0.109-1.789	0.6	0.011-1.113
Durango	4.3	1.519-7.011	1.9	0.668-3.102	2.7	1.244-4.074
Estado de México	3.3	1.433-5.119	0.7	---	0.3	---
Guanajuato	3.4	1.514-5.247	1.1	---	0.7	0.035-1.365
Guerrero	2.5	0.531-4.430	0.6	---	0.2	---
Hidalgo	2.9	0.819-5.076	0.2	---	0.2	---
Jalisco	3.5	1.143-5.853	1.1	0.010-2.175	0.4	---
Michoacán	3.8	1.627-5.879	0.7	0.059-1.383	0.6	---
Morelos	3.8	0.084-7.482	0.8	0.072-1.579	0.3	---
Nayarit	5.5	2.241-8.710	0.6	---	0.5	0.032-1.031
Nuevo León	3.2	1.346-5.137	0.5	---	0.5	0.065-0.958
Oaxaca	4.0	0.720-7.198	2.2	0.122-4.262	0.2	---
Puebla	3.0	0.598-5.376	0.4	---	0.9	0.195-1.689
Querétaro	2.8	1.121-4.433	0.7	---	0.3	---
Quintana Roo	3.1	1.273-4.886	1.0	---	0.8	---
San Luis Potosí	1.4	0.191-2.666	1.8	---	0.3	---
Sinaloa	2.8	0.638-5.059	1.8	0.357-3.306	0.2	---
Sonora	2.3	0.300-4.359	1.6	---	0.3	---
Tabasco	2.6	0.915-4.213	1.1	0.079-2.086	0.6	0.065-1.136
Tamaulipas	1.9	0.395-3.402	0.7	---	--	---
Tlaxcala	3.2	0.794-5.599	1.0	0.068-1.971	0.7	---
Veracruz	3.0	0.834-5.230	1.0	---	0.8	0.008-1.671
Yucatán	2.3	0.475-4.030	1.5	0.394-2.611	0.9	0.005-1.875
Zacatecas	3.5	1.730-5.265	2.1	0.061-4.158	1.3	0.419-2.254
Nacional	3.1	2.600-3.569	1.2	0.930-1.536	0.5	0.403-0.687

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según edad**

Cuadro ICEI10

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.5	0.339-4.751	3.6	0.925-6.311	---	---
Baja California	2.1	---	3.0	0.239-5.742	1.5	0.340-2.723
Baja California Sur	3.2	0.387-6.112	2.4	---	1.8	0.375-3.191
Campeche	5.6	1.996-9.231	3.6	0.301-6.802	2.1	0.049-4.070
Chiapas	2.0	0.118-3.973	0.2	---	0.3	---
Chihuahua	3.5	0.541-6.540	3.0	0.913-5.071	0.3	---
Ciudad de México	8.4	2.229-14.508	3.0	---	1.3	---
Coahuila	4.4	1.258-7.464	4.3	1.077-7.430	1.1	0.042-2.063
Colima	4.4	1.516-7.213	0.2	---	1.2	---
Durango	4.2	1.374-7.015	2.7	0.672-4.634	4.7	1.849-7.544
Estado de México	3.4	0.853-6.031	1.5	---	0.2	---
Guanajuato	5.8	2.084-9.432	2.3	---	1.5	0.069-2.942
Guerrero	2.4	0.164-4.723	0.9	---	0.3	---
Hidalgo	4.0	0.484-7.560	---	---	0.4	---
Jalisco	5.4	1.495-9.367	2.2	---	0.2	---
Michoacán	4.7	1.619-7.841	1.4	0.028-2.849	1.3	---
Morelos	6.5	---	0.7	---	0.2	---
Nayarit	5.4	2.047-8.685	0.7	---	0.7	---
Nuevo León	4.6	1.245-7.911	1.0	---	0.7	---
Oaxaca	3.8	0.735-6.829	3.0	---	0.2	---
Puebla	4.1	0.532-7.686	0.8	---	1.8	0.209-3.362
Querétaro	3.3	0.869-5.819	1.6	---	0.4	---
Quintana Roo	3.8	1.032-6.489	1.9	---	1.5	---
San Luis Potosí	1.9	---	3.1	---	0.4	---
Sinaloa	5.6	1.324-9.954	3.5	0.495-6.431	0.4	---
Sonora	0.9	---	3.2	---	0.4	---
Tabasco	4.4	1.218-7.536	1.3	---	0.9	---
Tamaulipas	3.8	0.794-6.763	1.3	---	---	---
Tlaxcala	5.3	0.803-9.861	1.5	---	0.8	0.004-1.555
Veracruz	4.9	0.925-8.879	1.0	---	1.6	---
Yucatán	1.9	0.193-3.516	1.8	---	1.4	---
Zacatecas	3.6	1.177-6.073	3.9	---	1.0	0.002-2.063
Nacional	4.2	3.433-5.006	1.9	1.401-2.431	0.8	0.603-1.091

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen
por estado según edad**

Cuadro ICEI11

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	2.6	0.113-5.087	1.2	0.280-2.146	0.6	---
Baja California	0.3	---	0.8	---	0.4	---
Baja California Sur	1.6	---	1.2	0.150-2.310	0.2	---
Campeche	1.5	---	0.2	---	--	---
Chiapas	0.4	---	2.1	---	--	---
Chihuahua	2.4	0.033-4.823	--	---	--	---
Ciudad de México	1.2	---	2.6	---	0.4	---
Coahuila	0.9	---	0.6	---	--	---
Colima	6.8	---	1.7	0.223-3.086	--	---
Durango	4.3	---	1.2	---	0.8	---
Estado de México	3.1	0.368-5.847	--	---	0.4	---
Guanajuato	1.0	---	--	---	--	---
Guerrero	2.5	---	0.3	---	***	---
Hidalgo	1.9	0.033-3.678	0.4	---	--	---
Jalisco	1.4	---	--	---	0.5	---
Michoacán	2.8	---	0.1	---	--	---
Morelos	1.0	---	1.0	---	0.3	---
Nayarit	5.6	0.595-10.585	0.6	---	0.4	---
Nuevo León	1.9	---	--	---	0.3	---
Oaxaca	4.1	---	1.5	---	0.3	---
Puebla	1.9	---	--	---	0.2	---
Querétaro	2.2	0.322-4.105	--	---	0.2	---
Quintana Roo	2.4	0.231-4.492	0.1	---	--	---
San Luis Potosí	0.9	---	0.5	---	0.2	---
Sinaloa	--	---	0.2	---	--	---
Sonora	3.8	---	--	---	0.2	---
Tabasco	0.7	---	0.9	---	0.3	---
Tamaulipas	--	---	--	---	--	---
Tlaxcala	1.0	---	0.6	---	0.6	---
Veracruz	1.1	---	1.0	---	0.2	---
Yucatán	2.6	---	1.2	---	0.5	---
Zacatecas	3.4	0.569-6.156	0.5	---	1.6	0.240-2.980
Nacional	1.9	1.355-2.491	0.6	0.260-0.929	0.3	0.113-0.434

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según sexo**

Cuadro ICEI12

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.0	0.132-1.951	0.3	---	0.7	0.154-1.175
Baja California	0.8	---	0.6	0.093-1.111	0.7	0.177-1.255
Baja California Sur	1.4	---	0.6	0.129-1.139	1.0	0.126-1.932
Campeche	1.6	0.182-2.944	0.4	0.082-0.739	1.0	0.290-1.656
Chiapas	0.5	---	0.2	---	0.3	0.056-0.581
Chihuahua	1.2	0.393-2.030	0.6	---	0.9	0.262-1.582
Ciudad de México	1.1	0.440-1.838	0.4	---	0.7	0.315-1.156
Coahuila	1.4	0.455-2.326	0.5	0.043-0.924	0.9	0.395-1.469
Colima	2.6	1.172-3.987	1.4	0.041-2.812	2.0	1.030-2.969
Durango	2.0	0.669-3.379	0.9	0.036-1.769	1.4	0.624-2.265
Estado de México	0.5	---	0.5	---	0.5	0.070-0.937
Guanajuato	0.7	0.087-1.220	0.4	---	0.5	0.166-0.831
Guerrero	0.9	---	0.4	0.088-0.783	0.7	---
Hidalgo	0.5	---	***	---	0.2	---
Jalisco	4.2	---	1.0	---	2.6	---
Michoacán	1.3	0.323-2.232	--	---	0.6	0.152-1.066
Morelos	0.8	0.163-1.459	0.3	---	0.5	0.182-0.858
Nayarit	0.9	0.082-1.758	0.9	0.011-1.758	0.9	0.299-1.505
Nuevo León	0.6	---	0.2	---	0.4	0.077-0.688
Oaxaca	0.5	0.001-0.947	2.1	0.520-3.725	1.3	0.483-2.215
Puebla	0.8	0.058-1.486	0.2	---	0.4	0.104-0.791
Querétaro	0.3	---	0.4	---	0.4	0.002-0.719
Quintana Roo	1.1	0.181-1.958	0.7	0.234-1.196	0.9	0.398-1.393
San Luis Potosí	1.0	---	0.2	---	0.6	0.010-1.161
Sinaloa	1.3	0.312-2.198	0.4	---	0.8	0.309-1.288
Sonora	0.4	0.024-0.751	0.3	---	0.3	0.043-0.619
Tabasco	1.3	0.381-2.155	1.0	0.248-1.716	1.1	0.566-1.674
Tamaulipas	1.1	0.195-1.948	0.7	0.186-1.274	0.9	0.332-1.464
Tlaxcala	1.1	0.361-1.882	0.4	---	0.7	0.295-1.203
Veracruz	1.5	0.366-2.535	0.8	0.179-1.370	1.1	0.444-1.754
Yucatán	0.9	0.187-1.532	0.4	---	0.6	0.207-1.036
Zacatecas	1.1	0.222-1.944	0.8	0.127-1.536	1.0	0.370-1.532
Nacional	1.1	0.636-1.614	0.5	0.372-0.687	0.8	0.566-1.068

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según edad**

Cuadro ICEI13

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	0.7	---	1.0	---	0.3	0.009-0.587
Baja California	1.2	---	1.1	---	0.2	---
Baja California Sur	1.4	0.156-2.561	1.6	---	0.3	---
Campeche	0.7	---	0.9	---	1.1	0.129-2.085
Chiapas	0.6	---	0.2	---	0.2	---
Chihuahua	0.2	---	0.9	0.068-1.760	1.2	---
Ciudad de México	0.9	---	1.3	0.285-2.231	0.3	0.001-0.574
Coahuila	1.5	---	1.1	0.101-2.089	0.6	0.050-1.088
Colima	1.3	0.128-2.396	2.9	0.865-4.871	1.5	0.201-2.729
Durango	2.3	---	0.9	0.082-1.710	1.6	0.221-2.952
Estado de México	0.6	---	0.8	---	0.2	---
Guanajuato	1.3	0.009-2.499	0.2	---	0.4	---
Guerrero	0.6	---	1.0	---	0.3	0.006-0.691
Hidalgo	1.1	---	0.1	---	***	---
Jalisco	3.2	---	0.7	0.010-1.373	4.1	---
Michoacán	0.8	0.023-1.664	1.0	---	0.1	---
Morelos	0.5	---	0.6	---	0.5	---
Nayarit	0.9	0.013-1.693	0.8	---	1.0	---
Nuevo León	1.5	---	0.2	---	0.2	---
Oaxaca	2.8	---	1.9	0.156-3.593	0.2	---
Puebla	0.2	---	0.6	---	0.4	---
Querétaro	0.3	---	0.5	---	0.2	---
Quintana Roo	***	---	1.2	0.227-2.179	0.9	0.237-1.512
San Luis Potosí	0.3	---	1.1	---	0.3	---
Sinaloa	0.4	---	1.3	0.164-2.363	0.5	0.014-1.071
Sonora	1.1	---	0.1	---	0.3	---
Tabasco	1.2	0.189-2.203	0.7	0.178-1.226	1.5	0.325-2.695
Tamaulipas	1.7	0.217-3.212	1.4	0.284-2.542	0.1	---
Tlaxcala	1.2	0.117-2.223	0.9	0.116-1.649	0.4	---
Veracruz	1.5	0.093-2.822	1.1	---	1.0	0.130-1.868
Yucatán	0.6	---	0.8	---	0.4	---
Zacatecas	1.5	0.522-2.457	1.0	0.006-1.962	0.7	0.018-1.357
Nacional	1.1	0.710-1.494	0.8	0.630-1.066	0.7	0.157-1.199

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según edad**

Cuadro ICEI14

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	1.4	---	1.6	---	0.3	---
Baja California	0.8	---	1.4	---	0.3	---
Baja California Sur	0.7	---	2.4	---	0.6	---
Campeche	1.2	---	1.7	---	1.6	---
Chiapas	0.9	---	0.5	---	0.3	---
Chihuahua	0.5	---	1.8	0.106-3.562	0.9	---
Ciudad de México	1.2	---	1.9	0.373-3.443	0.5	---
Coahuila	2.4	---	1.4	---	0.9	---
Colima	2.5	0.230-4.673	3.8	0.668-6.837	1.5	0.097-2.941
Durango	2.0	---	1.4	0.089-2.635	2.7	---
Estado de México	--	---	0.8	---	0.4	---
Guanajuato	2.2	---	--	---	0.6	---
Guerrero	0.8	---	1.9	---	--	---
Hidalgo	2.3	---	0.1	---	--	---
Jalisco	1.3	---	1.1	---	8.6	---
Michoacán	1.7	0.054-3.300	2.1	---	0.3	---
Morelos	1.0	---	1.1	---	0.5	---
Nayarit	1.4	---	1.4	---	0.3	---
Nuevo León	2.1	---	0.4	---	0.1	---
Oaxaca	1.1	---	0.7	---	--	---
Puebla	0.5	---	1.1	---	0.6	---
Querétaro	0.5	---	0.4	---	0.2	---
Quintana Roo	***	---	1.5	---	0.9	---
San Luis Potosí	0.3	---	2.1	---	0.3	---
Sinaloa	0.3	---	2.4	0.195-4.681	0.6	---
Sonora	1.1	---	--	---	0.5	---
Tabasco	1.7	---	0.7	---	1.7	---
Tamaulipas	1.2	---	2.2	0.185-4.166	--	---
Tlaxcala	1.1	---	1.3	---	0.9	---
Veracruz	1.4	---	0.9	---	1.9	0.083-3.735
Yucatán	1.2	---	0.7	---	0.8	---
Zacatecas	1.4	0.254-2.485	1.5	---	0.5	---
Nacional	1.1	0.751-1.400	1.2	0.791-1.525	1.1	0.025-2.204

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma
por estado según edad**

Cuadro ICEI15

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	--	---	0.5	---	0.3	---
Baja California	1.7	---	0.8	---	0.1	---
Baja California Sur	2.0	---	0.8	---	--	---
Campeche	0.3	---	0.2	---	0.7	0.019-1.290
Chiapas	0.3	---	0.1	---	0.2	---
Chihuahua	--	---	--	---	1.4	---
Ciudad de México	0.6	---	0.6	---	0.1	---
Coahuila	0.5	---	0.7	---	0.3	---
Colima	--	---	2.0	---	1.4	---
Durango	2.7	---	0.5	---	0.6	---
Estado de México	1.1	---	0.8	---	--	---
Guanajuato	0.3	---	0.4	---	0.3	---
Guerrero	0.5	---	0.2	---	0.7	0.010-1.297
Hidalgo	--	---	--	---	0.1	---
Jalisco	5.1	---	0.3	---	0.1	---
Michoacán	--	---	--	---	--	---
Morelos	--	---	0.2	---	0.4	---
Nayarit	0.3	---	0.3	---	1.6	---
Nuevo León	0.8	---	--	---	0.2	---
Oaxaca	4.4	---	2.8	---	0.4	---
Puebla	--	---	0.2	---	0.2	---
Querétaro	--	---	0.7	---	0.3	---
Quintana Roo	***	---	0.8	0.007-1.692	0.8	0.003-1.637
San Luis Potosí	0.3	---	0.2	---	0.3	---
Sinaloa	0.5	---	0.1	---	0.5	---
Sonora	1.1	---	0.1	---	0.1	---
Tabasco	0.7	---	0.7	---	1.4	---
Tamaulipas	2.2	---	0.7	---	0.3	---
Tlaxcala	1.2	---	0.5	---	--	---
Veracruz	1.6	---	1.2	0.017-2.290	0.2	---
Yucatán	--	---	0.9	---	0.1	---
Zacatecas	1.6	---	0.5	---	0.8	---
Nacional	1.1	0.402-1.856	0.6	0.312-0.806	0.3	0.194-0.376

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según sexo**

Cuadro ICEI16

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	8.2	5.314-11.034	1.5	0.723-2.270	4.7	3.194-6.193
Baja California	4.4	2.440-6.361	1.0	0.203-1.744	2.7	1.621-3.787
Baja California Sur	3.2	1.589-4.855	2.0	0.914-3.119	2.6	1.663-3.608
Campeche	5.5	3.285-7.626	1.1	0.461-1.686	3.2	2.051-4.374
Chiapas	3.7	1.550-5.803	0.5	0.100-0.911	2.0	0.946-3.105
Chihuahua	4.6	3.112-6.151	1.3	0.549-2.024	2.9	2.060-3.813
Ciudad de México	7.1	4.622-9.656	2.0	0.781-3.261	4.5	3.112-5.821
Coahuila	7.6	5.067-10.036	2.6	1.087-4.113	5.0	3.581-6.514
Colima	7.9	5.438-10.345	2.9	1.425-4.405	5.4	3.969-6.805
Durango	5.9	3.770-8.019	1.1	0.449-1.762	3.4	2.345-4.493
Estado de México	6.6	4.338-8.790	1.5	0.707-2.222	3.9	2.752-5.082
Guanajuato	7.1	5.066-9.181	2.9	1.103-4.629	4.9	3.405-6.354
Guerrero	6.3	3.823-8.853	1.1	0.419-1.754	3.6	2.347-4.845
Hidalgo	7.4	4.543-10.257	1.2	0.484-1.888	4.1	2.743-5.525
Jalisco	10.8	4.045-17.494	2.4	0.648-4.196	6.5	2.920-10.040
Michoacán	8.3	6.055-10.622	2.1	0.986-3.198	5.1	3.865-6.277
Morelos	6.9	4.015-9.697	0.9	0.297-1.490	3.7	2.352-5.105
Nayarit	7.2	4.881-9.600	2.7	1.399-3.949	4.9	3.568-6.284
Nuevo León	8.2	5.372-11.010	2.1	0.924-3.321	5.1	3.494-6.749
Oaxaca	5.8	3.060-8.597	2.4	0.762-4.124	4.0	2.296-5.768
Puebla	4.3	2.435-6.157	1.8	0.801-2.761	3.0	1.886-4.031
Querétaro	7.1	4.681-9.461	1.4	0.480-2.283	4.1	2.845-5.345
Quintana Roo	6.4	3.884-8.845	2.0	1.085-3.009	4.2	2.856-5.627
San Luis Potosí	6.5	3.599-9.352	1.7	0.804-2.526	4.0	2.494-5.452
Sinaloa	4.5	2.447-6.462	0.9	0.253-1.472	2.6	1.601-3.680
Sonora	3.6	1.697-5.428	1.5	0.606-2.443	2.5	1.400-3.683
Tabasco	7.5	3.482-11.568	1.0	0.314-1.618	4.1	2.104-6.164
Tamaulipas	3.9	2.330-5.522	2.1	1.181-3.082	3.0	2.042-3.984
Tlaxcala	5.0	3.347-6.699	0.9	0.307-1.434	2.8	1.954-3.741
Veracruz	5.0	2.776-7.299	1.2	0.427-2.064	3.1	1.821-4.309
Yucatán	4.9	2.844-7.004	0.8	0.310-1.234	2.8	1.736-3.845
Zacatecas	7.1	4.356-9.800	1.9	0.884-3.015	4.4	2.951-5.833
Nacional	6.4	5.704-7.085	1.7	1.431-1.929	4.0	3.588-4.325

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según edad**

Cuadro ICEI17

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	9.1	5.016-13.247	5.8	2.977-8.614	1.7	0.513-2.846
Baja California	4.6	1.582-7.622	3.6	1.587-5.646	1.1	0.351-1.910
Baja California Sur	5.7	2.675-8.707	2.6	0.763-4.422	1.6	0.683-2.525
Campeche	5.8	3.425-8.199	2.8	1.257-4.345	2.6	0.549-4.565
Chiapas	1.7	0.468-3.013	2.3	0.107-4.476	1.9	0.688-3.082
Chihuahua	4.5	2.083-6.976	3.2	1.769-4.620	2.1	1.001-3.223
Ciudad de México	3.8	1.647-5.905	6.4	3.277-9.439	3.2	1.742-4.588
Coahuila	5.8	2.762-8.787	7.6	4.587-10.669	2.4	1.292-3.480
Colima	8.2	4.676-11.704	7.1	4.390-9.852	2.8	1.462-4.080
Durango	4.6	2.562-6.551	3.0	1.501-4.478	3.3	1.718-4.953
Estado de México	6.1	3.594-8.587	4.6	2.200-6.916	2.5	1.272-3.797
Guanajuato	6.4	3.944-8.816	5.8	3.111-8.407	3.3	1.722-4.960
Guerrero	4.9	2.610-7.238	4.5	1.822-7.185	2.1	0.943-3.176
Hidalgo	7.8	3.587-12.106	5.2	2.938-7.410	1.7	0.718-2.696
Jalisco	8.8	3.859-13.677	6.4	3.170-9.553	5.7	---
Michoacán	8.7	5.074-12.318	4.8	2.956-6.628	3.7	2.161-5.333
Morelos	7.3	3.079-11.462	4.4	1.437-7.398	1.8	0.852-2.760
Nayarit	8.8	5.084-12.610	4.4	2.415-6.397	3.9	2.221-5.549
Nuevo León	7.9	4.878-11.006	6.5	2.887-10.069	3.1	1.402-4.699
Oaxaca	8.2	3.599-12.757	4.6	1.590-7.588	1.6	0.591-2.623
Puebla	4.9	2.011-7.790	3.9	1.802-6.009	1.1	0.388-1.894
Querétaro	5.5	3.039-8.042	4.5	2.134-6.767	3.1	1.445-4.838
Quintana Roo	4.7	1.661-7.651	5.6	3.177-8.105	2.4	0.833-4.028
San Luis Potosí	3.3	1.697-4.850	5.2	2.421-8.063	3.1	0.949-5.287
Sinaloa	2.8	1.354-4.241	4.2	2.025-6.293	1.2	0.349-2.106
Sonora	4.5	1.885-7.114	3.4	1.192-5.628	1.1	0.277-1.851
Tabasco	4.3	2.254-6.259	5.0	0.507-9.473	3.2	1.611-4.831
Tamaulipas	7.0	3.785-10.237	3.5	1.804-5.269	1.1	0.237-2.037
Tlaxcala	4.8	2.480-7.072	2.9	1.391-4.331	2.0	0.943-3.087
Veracruz	4.2	1.663-6.773	2.4	0.949-3.788	3.2	1.203-5.219
Yucatán	2.9	1.118-4.643	3.3	1.264-5.302	2.3	1.127-3.459
Zacatecas	7.5	4.264-10.831	3.1	1.261-4.868	4.3	1.819-6.737
Nacional	5.7	5.023-6.367	4.6	4.024-5.198	2.7	2.082-3.272

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según edad**

Cuadro ICEI18

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	14.3	6.761-21.784	10.7	5.281-16.152	2.7	0.440-5.028
Baja California	5.1	0.840-9.436	6.7	2.817-10.677	1.9	0.433-3.301
Baja California Sur	4.1	1.680-6.528	3.3	0.002-6.594	2.8	1.171-4.508
Campeche	8.7	4.629-12.817	4.8	1.736-7.924	4.7	0.762-8.612
Chiapas	2.1	---	4.6	0.073-9.162	3.6	1.229-5.945
Chihuahua	4.5	1.408-7.547	6.0	3.215-8.694	3.5	1.347-5.613
Ciudad de México	3.8	0.586-6.957	10.6	4.809-16.471	5.2	2.814-7.537
Coahuila	7.7	2.675-12.698	11.6	6.353-16.820	3.5	1.437-5.640
Colima	10.5	4.609-16.426	11.4	6.510-16.349	3.5	1.448-5.627
Durango	6.7	3.214-10.087	5.4	2.506-8.347	6.0	2.688-9.314
Estado de México	8.9	4.806-13.064	8.0	3.414-12.522	4.3	1.669-6.942
Guanajuato	8.3	4.476-12.202	7.9	3.825-12.067	5.7	2.741-8.704
Guerrero	7.6	3.498-11.721	9.1	3.585-14.595	3.0	0.833-5.125
Hidalgo	13.3	5.421-21.122	9.6	5.044-14.240	2.9	0.864-4.917
Jalisco	10.9	5.586-16.303	10.5	4.924-16.155	10.9	---
Michoacán	11.7	6.089-17.297	8.3	4.686-11.957	6.8	3.535-10.042
Morelos	12.4	4.627-20.238	8.2	2.180-14.143	3.4	1.451-5.436
Nayarit	10.8	5.114-16.565	8.2	4.366-12.018	4.9	1.924-7.902
Nuevo León	13.3	7.469-19.153	10.8	4.653-16.887	4.2	1.656-6.667
Oaxaca	9.5	2.861-16.143	7.2	1.391-12.995	2.9	0.860-4.916
Puebla	3.8	0.537-7.110	6.8	2.708-10.902	2.0	0.400-3.585
Querétaro	8.4	4.277-12.581	7.8	3.163-12.390	5.8	2.507-9.004
Quintana Roo	6.6	1.087-12.168	8.6	3.952-13.315	3.6	0.729-6.497
San Luis Potosí	3.7	1.420-6.033	9.0	3.540-14.399	5.5	1.041-9.889
Sinaloa	5.1	2.318-7.857	7.6	3.444-11.693	1.4	---
Sonora	5.4	1.334-9.508	5.3	1.096-9.465	1.3	0.118-2.467
Tabasco	6.7	3.022-10.319	9.5	0.615-18.419	5.9	2.704-9.066
Tamaulipas	8.0	3.386-12.673	5.0	1.951-8.107	1.4	0.015-2.821
Tlaxcala	6.0	2.099-9.855	5.4	2.383-8.471	4.2	1.915-6.426
Veracruz	5.9	1.646-10.079	3.5	0.960-6.012	6.0	1.894-10.131
Yucatán	4.5	1.056-7.986	6.6	2.624-10.536	3.5	1.250-5.770
Zacatecas	10.8	5.688-15.840	5.2	1.473-9.014	7.0	2.356-11.702
Nacional	7.6	6.590-8.602	7.8	6.726-8.935	4.5	3.338-5.754

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE EXPOSICIÓN A LA
PREVENCIÓN Y CONDUCTA ANTISOCIAL POR ESTADO**

**Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas
por estado según edad**

Cuadro ICEI19

Estado	Encuesta Nacional 2016					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aguascalientes	4.0	1.062-7.009	1.2	0.197-2.178	0.8	---
Baja California	4.0	---	0.4	---	0.4	---
Baja California Sur	7.3	1.543-13.133	1.8	0.378-3.317	0.3	---
Campeche	2.9	0.523-5.192	0.9	---	0.5	---
Chiapas	1.4	0.039-2.807	0.3	---	0.3	---
Chihuahua	4.6	1.133-8.032	0.4	---	0.8	---
Ciudad de México	3.8	0.805-6.756	2.2	0.126-4.293	1.5	---
Coahuila	3.8	1.128-6.373	3.6	0.414-6.737	1.3	0.431-2.250
Colima	5.7	1.880-9.562	2.8	0.114-5.517	2.0	0.354-3.730
Durango	2.4	0.798-4.060	0.7	---	1.0	0.019-1.900
Estado de México	3.2	0.565-5.822	1.4	---	1.0	0.180-1.753
Guanajuato	4.4	1.333-7.530	3.8	0.596-7.055	1.3	0.066-2.476
Guerrero	2.2	---	0.3	---	1.3	0.195-2.315
Hidalgo	2.3	0.181-4.483	1.3	---	0.7	0.052-1.253
Jalisco	6.5	---	2.3	0.011-4.685	1.0	0.211-1.866
Michoacán	5.7	1.079-10.241	1.7	0.364-2.982	1.0	---
Morelos	2.0	---	1.0	---	0.4	---
Nayarit	6.8	1.496-12.049	0.7	---	2.9	1.208-4.598
Nuevo León	2.4	0.421-4.438	2.1	0.119-4.165	2.0	0.076-3.950
Oaxaca	6.9	0.233-13.467	2.5	---	0.4	---
Puebla	5.9	1.332-10.563	1.4	0.169-2.561	0.4	---
Querétaro	2.7	0.577-4.762	1.4	---	0.8	---
Quintana Roo	2.6	0.394-4.759	2.6	0.971-4.196	1.2	---
San Luis Potosí	2.8	0.494-5.137	1.9	0.267-3.474	1.0	---
Sinaloa	0.5	---	0.8	---	1.0	0.051-2.045
Sonora	3.6	0.113-7.001	1.5	0.012-2.955	0.8	---
Tabasco	1.8	0.047-3.568	0.8	---	0.8	---
Tamaulipas	6.0	2.199-9.767	2.1	0.616-3.544	0.9	---
Tlaxcala	3.5	0.873-6.226	0.6	---	0.1	---
Veracruz	2.5	---	1.3	---	0.7	0.040-1.390
Yucatán	1.2	---	0.2	---	1.2	0.256-2.067
Zacatecas	4.1	1.319-6.939	1.2	0.164-2.230	1.8	0.163-3.451
Nacional	3.8	2.838-4.665	1.6	1.195-2.009	1.0	0.736-1.253

Tres guiones indican que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 11: CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

Listado de Tablas

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo
Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo
Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo
Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN1

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	7 247 914	3 282 883	45.3
18-34	16 437 032	4 531 635	27.6
35-65	17 483 670	5 763 042	33.0
Subtotal	41 168 617	13 577 559	33.0
Mujeres			
12-17	7 087 165	3 709 022	52.3
18-34	17 588 359	6 541 642	37.2
35-65	19 417 917	8 325 771	42.9
Subtotal	44 093 441	18 576 435	42.1
Total	85 262 058	32 153 994	37.7

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN2

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	7 247 914	4 762 858	65.7
18-34	16 437 032	10 802 322	65.7
35-65	17 483 670	11 952 669	68.4
Subtotal	41 168 617	27 517 849	66.8
Mujeres			
12-17	7 087 165	4 895 814	69.1
18-34	17 588 359	12 121 463	68.9
35-65	19 417 917	13 876 284	71.5
Subtotal	44 093 441	30 893 561	70.1
Total	85 262 058	58 411 410	68.5

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN3

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	7 247 914	4 795 548	66.2
18-34	16 437 032	10 907 240	66.4
35-65	17 483 670	12 446 998	71.2
Subtotal	41 168 617	28 149 786	68.4
Mujeres			
12-17	7 087 165	4 941 146	69.7
18-34	17 588 359	12 617 413	71.7
35-65	19 417 917	14 315 221	73.7
Subtotal	44 093 441	31 873 779	72.3
Total	85 262 058	60 023 565	70.4

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN4

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	7 247 914	4 694 160	64.8
18-34	16 437 032	11 034 567	67.1
35-65	17 483 670	12 537 311	71.7
Subtotal	41 168 617	28 266 038	68.7
Mujeres			
12-17	7 087 165	4 853 970	68.5
18-34	17 588 359	12 439 920	70.7
35-65	19 417 917	14 370 087	74.0
Subtotal	44 093 441	31 663 978	71.8
Total	85 262 058	59 930 016	70.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población de 12 a 65 años según sexo y edad**

Cuadro CN5

Sexo/Edad	N por grupo	Encuesta Nacional 2016	
		Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	7 247 914	3 092 245	42.7
18-34	16 437 032	6 535 243	39.8
35-65	17 483 670	7 512 538	43.0
Subtotal	41 168 617	17 140 026	41.6
Mujeres			
12-17	7 087 165	3 435 609	48.5
18-34	17 588 359	8 210 128	46.7
35-65	19 417 917	9 816 123	50.6
Subtotal	44 093 441	21 461 860	48.7
Total	85 262 058	38 601 886	45.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CN6

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	7 079 375	99.2	6 974 765	99.4	14 054 140	99.3
Tu mejor amigo/a	6 268 442	87.8	6 297 652	89.7	12 566 094	88.8

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de drogas
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CN7

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	33 181 508	98.2	36 579 345	99.1	69 760 853	98.6
Tu mejor amigo/a	29 352 856	87.6	34 451 731	94.7	63 804 587	91.3

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de alcohol
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CN8

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería/n mal:						
Tu familia	6 860 427	95.2	6 787 276	96.0	13 647 703	95.6
Tu mejor amigo/a	5 121 988	71.5	5 183 234	73.8	10 305 223	72.6

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL**

**Tolerancia social ante el consumo de alcohol
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CN9

N por subgrupo	Encuesta Nacional 2016					
	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	28 708 617	85.0	33 053 272	89.6	61 761 889	87.4
Tu mejor amigo/a	19 508 828	58.3	27 188 366	75.0	46 697 194	67.0

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 12: CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO



ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

Listado de Tablas

Percepción del riesgo de consumir mariguana en la población de 12 a 65 años según sexo
Percepción del riesgo de consumir mariguana en la población de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir mariguana en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir mariguana en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo
Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir heroína en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir heroína en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo
Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo
Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo
Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población masculina de 12 a 65 años según edad
Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población femenina de 12 a 65 años según edad
Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo
Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo
Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo
Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CNE1

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	30.2	44.7	37.7
Baja California	29.9	35.5	32.7
Baja California Sur	32.4	39.9	36.1
Campeche	38.6	45.2	42.0
Chiapas	45.8	52.2	49.1
Chihuahua	36.3	43.6	40.0
Ciudad de México	21.8	30.3	26.2
Coahuila	35.6	45.3	40.5
Colima	24.8	36.8	30.8
Durango	34.2	44.5	39.5
Estado de México	34.5	38.3	36.5
Guanajuato	37.7	48.6	43.5
Guerrero	36.6	49.8	43.5
Hidalgo	31.5	48.2	40.2
Jalisco	28.3	33.4	30.9
Michoacán	29.7	49.1	39.8
Morelos	37.4	47.3	42.6
Nayarit	26.9	35.9	31.5
Nuevo León	29.3	40.5	35.0
Oaxaca	39.7	47.8	44.0
Puebla	30.1	42.9	36.9
Querétaro	34.1	44.9	39.8
Quintana Roo	36.4	42.2	39.3
San Luis Potosí	32.0	47.3	40.0
Sinaloa	26.4	35.3	30.9
Sonora	28.4	39.4	33.9
Tabasco	38.6	50.2	44.6
Tamaulipas	29.8	41.6	35.8
Tlaxcala	36.8	47.3	42.3
Veracruz	39.4	46.4	43.1
Yucatán	33.7	43.2	38.6
Zacatecas	38.6	49.5	44.3
Nacional	33.0	42.1	37.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE2

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	49.3	27.7	42.7
Baja California	40.9	27.6	34.5
Baja California Sur	47.4	31.5	36.6
Campeche	56.0	33.7	44.3
Chiapas	60.6	49.4	42.6
Chihuahua	53.6	33.0	41.1
Ciudad de México	35.0	18.8	29.8
Coahuila	48.3	33.3	44.2
Colima	45.3	25.2	30.8
Durango	46.0	33.7	42.2
Estado de México	41.6	31.1	39.6
Guanajuato	52.6	38.9	44.0
Guerrero	56.3	37.7	42.5
Hidalgo	48.7	37.3	39.5
Jalisco	45.4	27.3	28.7
Michoacán	45.7	36.6	40.4
Morelos	46.2	41.1	42.6
Nayarit	45.5	27.8	29.4
Nuevo León	47.2	26.1	38.7
Oaxaca	51.3	39.4	44.6
Puebla	50.3	31.2	36.5
Querétaro	52.9	32.9	41.1
Quintana Roo	54.1	34.6	38.9
San Luis Potosí	54.0	34.4	39.0
Sinaloa	50.2	25.8	28.2
Sonora	44.7	30.6	33.0
Tabasco	62.0	39.1	42.9
Tamaulipas	46.9	31.0	36.2
Tlaxcala	53.7	38.5	41.2
Veracruz	57.1	36.8	43.0
Yucatán	51.2	36.0	36.3
Zacatecas	52.0	39.6	45.3
Nacional	48.8	32.5	38.2

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE3

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	48.4	18.5	33.8
Baja California	31.4	24.0	35.0
Baja California Sur	43.0	29.2	31.9
Campeche	57.7	22.8	45.9
Chiapas	60.3	44.8	38.7
Chihuahua	53.5	29.6	35.6
Ciudad de México	27.1	16.4	24.8
Coahuila	43.9	26.4	41.3
Colima	47.4	19.3	21.3
Durango	40.7	28.4	36.9
Estado de México	40.5	30.5	36.1
Guanajuato	42.7	36.6	36.4
Guerrero	50.7	29.3	36.0
Hidalgo	44.3	25.7	31.0
Jalisco	47.3	26.2	22.3
Michoacán	39.6	25.1	29.5
Morelos	43.4	35.7	36.5
Nayarit	48.7	20.1	24.3
Nuevo León	41.3	21.1	32.6
Oaxaca	52.2	29.8	41.8
Puebla	44.0	22.5	31.0
Querétaro	51.8	25.6	35.0
Quintana Roo	48.8	33.8	34.5
San Luis Potosí	48.0	26.4	29.8
Sinaloa	48.0	21.0	22.8
Sonora	42.5	22.5	28.6
Tabasco	62.7	31.7	35.0
Tamaulipas	48.5	27.9	24.8
Tlaxcala	50.0	32.3	35.2
Veracruz	50.8	32.5	40.7
Yucatán	47.5	25.9	35.9
Zacatecas	49.2	30.1	41.4
Nacional	45.3	27.6	33.0

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir marihuana
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE4

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	50.2	36.3	50.4
Baja California	50.7	31.3	34.1
Baja California Sur	51.9	34.0	41.6
Campeche	54.3	43.9	42.9
Chiapas	61.0	53.5	46.2
Chihuahua	53.6	36.4	46.1
Ciudad de México	43.6	21.1	34.0
Coahuila	52.9	40.4	46.8
Colima	43.1	31.1	39.8
Durango	51.4	38.7	46.9
Estado de México	42.7	31.7	42.7
Guanajuato	62.4	40.9	50.5
Guerrero	62.0	45.4	48.2
Hidalgo	53.1	47.3	47.1
Jalisco	43.4	28.3	34.5
Michoacán	51.8	46.8	50.1
Morelos	48.9	46.0	48.0
Nayarit	42.3	35.1	34.3
Nuevo León	53.3	31.2	44.4
Oaxaca	50.5	47.1	47.2
Puebla	56.3	38.8	41.2
Querétaro	54.1	39.6	46.6
Quintana Roo	59.7	35.5	43.4
San Luis Potosí	60.1	41.7	47.2
Sinaloa	52.4	30.5	33.3
Sonora	46.9	38.9	37.3
Tabasco	61.3	45.9	50.2
Tamaulipas	45.2	34.1	47.0
Tlaxcala	57.5	44.1	46.5
Veracruz	63.6	40.6	45.2
Yucatán	54.9	45.5	36.8
Zacatecas	55.1	47.8	48.8
Nacional	52.3	37.2	42.9

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE5

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	66.6	74.1	70.5
Baja California	74.1	78.2	76.1
Baja California Sur	73.3	77.0	75.1
Campeche	66.6	63.7	65.2
Chiapas	62.3	68.9	65.8
Chihuahua	72.1	75.2	73.7
Ciudad de México	67.6	71.2	69.5
Coahuila	65.2	70.2	67.8
Colima	73.1	73.5	73.3
Durango	70.4	74.2	72.3
Estado de México	65.9	66.8	66.4
Guanajuato	77.2	78.5	77.9
Guerrero	65.7	69.6	67.7
Hidalgo	59.7	67.4	63.7
Jalisco	74.6	70.5	72.5
Michoacán	66.2	75.9	71.3
Morelos	69.0	75.1	72.2
Nayarit	77.5	75.1	76.3
Nuevo León	62.5	65.0	63.8
Oaxaca	63.7	66.8	65.3
Puebla	57.7	63.6	60.9
Querétaro	68.3	72.7	70.6
Quintana Roo	67.2	66.4	66.8
San Luis Potosí	57.6	64.9	61.4
Sinaloa	75.5	80.4	78.0
Sonora	69.7	73.8	71.8
Tabasco	64.2	70.5	67.5
Tamaulipas	58.7	64.3	61.6
Tlaxcala	64.2	68.4	66.4
Veracruz	65.3	67.7	66.6
Yucatán	61.7	64.5	63.2
Zacatecas	66.0	74.8	70.6
Nacional	66.8	70.1	68.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE6

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	69.5	64.2	77.2
Baja California	68.1	76.0	79.1
Baja California Sur	66.7	73.6	79.6
Campeche	69.6	63.0	65.4
Chiapas	69.9	68.1	61.0
Chihuahua	74.2	72.7	74.5
Ciudad de México	65.4	66.8	72.7
Coahuila	67.1	63.5	71.9
Colima	67.4	71.0	77.6
Durango	67.0	71.4	75.5
Estado de México	64.2	65.4	68.0
Guanajuato	75.0	77.4	79.7
Guerrero	72.3	65.1	67.9
Hidalgo	61.8	62.4	65.8
Jalisco	69.4	72.1	74.1
Michoacán	70.7	71.0	71.9
Morelos	67.5	70.7	75.2
Nayarit	75.3	77.8	75.3
Nuevo León	65.4	58.9	67.4
Oaxaca	66.5	64.2	65.8
Puebla	62.4	60.5	60.6
Querétaro	72.1	71.1	69.5
Quintana Roo	65.2	66.2	68.1
San Luis Potosí	66.7	59.8	60.6
Sinaloa	75.0	77.3	79.7
Sonora	65.0	71.9	74.1
Tabasco	69.4	66.0	68.1
Tamaulipas	59.3	58.6	65.0
Tlaxcala	69.0	62.5	69.3
Veracruz	65.8	66.2	67.1
Yucatán	60.3	64.1	63.3
Zacatecas	66.3	71.7	71.4
Nacional	67.4	67.4	70.0

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE7

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	73.8	54.5	75.6
Baja California	59.6	73.3	80.2
Baja California Sur	64.4	72.3	77.3
Campeche	71.9	62.5	68.5
Chiapas	65.1	65.8	57.0
Chihuahua	74.6	72.3	71.0
Ciudad de México	55.8	66.8	71.8
Coahuila	62.6	57.0	74.4
Colima	65.6	69.6	79.3
Durango	63.0	68.4	75.7
Estado de México	64.9	66.9	65.4
Guanajuato	75.1	78.7	76.8
Guerrero	70.3	60.0	68.8
Hidalgo	55.5	59.2	62.0
Jalisco	72.5	74.0	76.0
Michoacán	70.0	63.4	67.2
Morelos	63.9	66.7	73.0
Nayarit	77.0	75.8	79.2
Nuevo León	61.4	59.6	65.5
Oaxaca	66.6	59.9	65.6
Puebla	60.7	57.1	56.9
Querétaro	75.5	67.3	66.2
Quintana Roo	64.0	68.6	66.8
San Luis Potosí	66.1	57.7	53.6
Sinaloa	75.3	72.9	77.8
Sonora	63.3	68.8	72.9
Tabasco	70.7	61.9	63.8
Tamaulipas	60.6	57.4	59.2
Tlaxcala	70.5	59.5	66.1
Veracruz	62.0	65.0	67.0
Yucatán	60.3	56.4	67.4
Zacatecas	61.3	63.8	70.3
Nacional	65.7	65.7	68.4

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir heroína
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE8

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	65.1	73.3	78.6
Baja California	77.1	78.7	78.1
Baja California Sur	69.2	74.9	81.9
Campeche	67.4	63.6	62.5
Chiapas	74.8	70.0	64.7
Chihuahua	73.8	73.0	77.7
Ciudad de México	75.8	66.8	73.4
Coahuila	71.9	70.2	69.7
Colima	69.3	72.3	76.0
Durango	71.1	74.2	75.4
Estado de México	63.6	64.1	70.3
Guanajuato	74.9	76.2	82.3
Guerrero	74.3	69.8	67.1
Hidalgo	68.3	65.1	69.1
Jalisco	66.1	70.2	72.3
Michoacán	71.3	77.7	76.1
Morelos	71.1	74.4	77.1
Nayarit	73.6	79.7	71.5
Nuevo León	69.6	58.1	69.3
Oaxaca	66.5	67.7	66.0
Puebla	64.0	63.5	63.6
Querétaro	68.8	74.6	72.5
Quintana Roo	66.4	63.8	69.5
San Luis Potosí	67.4	61.7	66.9
Sinaloa	74.6	81.5	81.5
Sonora	66.8	75.0	75.3
Tabasco	68.2	69.7	72.2
Tamaulipas	57.9	59.8	70.6
Tlaxcala	67.5	65.2	72.0
Veracruz	69.8	67.3	67.3
Yucatán	60.4	71.4	59.6
Zacatecas	71.6	78.6	72.4
Nacional	69.1	68.9	71.5

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE9

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	66.7	78.6	72.9
Baja California	76.0	80.8	78.4
Baja California Sur	76.0	80.2	78.0
Campeche	68.3	67.4	67.9
Chiapas	64.6	69.4	67.1
Chihuahua	73.7	77.1	75.5
Ciudad de México	66.3	74.7	70.7
Coahuila	69.0	71.7	70.4
Colima	74.6	75.4	75.0
Durango	71.1	75.4	73.3
Estado de México	67.4	67.9	67.6
Guanajuato	78.2	81.5	79.9
Guerrero	68.3	71.7	70.1
Hidalgo	61.3	68.7	65.2
Jalisco	73.1	73.8	73.5
Michoacán	68.3	78.4	73.6
Morelos	69.4	75.3	72.5
Nayarit	79.3	77.3	78.3
Nuevo León	65.5	68.1	66.8
Oaxaca	63.9	69.4	66.8
Puebla	60.8	65.2	63.2
Querétaro	68.6	74.9	71.9
Quintana Roo	69.4	68.4	68.9
San Luis Potosí	59.4	67.0	63.4
Sinaloa	78.2	81.8	80.0
Sonora	73.1	77.1	75.1
Tabasco	68.0	74.0	71.1
Tamaulipas	61.6	66.9	64.3
Tlaxcala	65.4	71.6	68.6
Veracruz	68.2	70.2	69.2
Yucatán	64.8	66.4	65.6
Zacatecas	65.0	75.8	70.7
Nacional	68.4	72.3	70.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE10

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	71.1	67.6	78.9
Baja California	71.7	77.2	82.0
Baja California Sur	69.2	78.1	81.1
Campeche	69.4	67.1	68.0
Chiapas	69.1	68.8	64.2
Chihuahua	73.0	74.9	76.9
Ciudad de México	67.5	68.8	73.0
Coahuila	68.0	67.3	74.0
Colima	70.1	72.8	78.9
Durango	66.7	72.1	77.3
Estado de México	60.2	67.3	70.6
Guanajuato	75.4	78.0	83.8
Guerrero	73.3	69.0	69.4
Hidalgo	60.3	65.4	67.0
Jalisco	74.1	71.2	75.4
Michoacán	72.3	72.7	74.9
Morelos	68.8	69.1	76.8
Nayarit	76.5	80.2	77.3
Nuevo León	64.4	62.4	71.4
Oaxaca	70.4	63.1	68.5
Puebla	62.6	62.6	63.9
Querétaro	69.8	74.0	70.8
Quintana Roo	69.6	67.2	70.7
San Luis Potosí	66.9	61.5	63.6
Sinaloa	74.7	79.4	82.5
Sonora	70.3	75.9	76.1
Tabasco	69.2	68.9	74.1
Tamaulipas	60.7	62.8	66.9
Tlaxcala	69.9	64.2	72.6
Veracruz	67.7	67.8	71.0
Yucatán	63.2	65.4	66.7
Zacatecas	64.8	69.9	74.0
Nacional	67.9	69.1	72.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE11

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	70.2	58.4	73.6
Baja California	64.2	75.5	81.0
Baja California Sur	67.0	78.0	77.0
Campeche	69.3	64.5	71.7
Chiapas	67.1	65.1	62.7
Chihuahua	72.5	73.8	74.2
Ciudad de México	60.7	63.9	69.9
Coahuila	66.6	63.3	75.6
Colima	68.2	70.8	80.5
Durango	63.4	66.1	79.3
Estado de México	60.8	68.4	68.9
Guanajuato	76.0	76.9	80.6
Guerrero	73.2	64.8	69.1
Hidalgo	54.0	63.4	62.6
Jalisco	75.2	68.4	77.0
Michoacán	70.5	63.4	71.8
Morelos	64.8	65.0	75.1
Nayarit	75.7	78.6	81.4
Nuevo León	62.0	62.1	69.8
Oaxaca	72.1	54.0	68.1
Puebla	58.7	61.2	61.5
Querétaro	72.0	68.7	67.0
Quintana Roo	67.8	68.3	71.3
San Luis Potosí	62.6	57.4	59.8
Sinaloa	74.4	76.0	81.6
Sonora	69.1	73.6	74.2
Tabasco	69.6	63.4	71.9
Tamaulipas	64.1	58.8	63.3
Tlaxcala	70.0	59.8	68.9
Veracruz	61.3	67.1	72.0
Yucatán	61.6	58.5	72.0
Zacatecas	59.7	60.4	71.8
Nacional	66.2	66.4	71.2

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir cocaína
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE12

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	71.9	76.2	83.6
Baja California	79.6	79.0	83.0
Baja California Sur	71.6	78.2	85.3
Campeche	69.6	69.5	64.5
Chiapas	71.0	71.9	65.6
Chihuahua	73.4	76.1	79.3
Ciudad de México	74.8	73.5	75.6
Coahuila	69.5	71.5	72.6
Colima	72.0	74.7	77.3
Durango	70.0	77.6	75.6
Estado de México	59.5	66.3	72.1
Guanajuato	74.8	79.0	86.6
Guerrero	73.4	73.0	69.6
Hidalgo	66.7	67.2	70.9
Jalisco	72.9	73.8	74.1
Michoacán	74.1	81.0	77.7
Morelos	72.9	72.7	78.3
Nayarit	77.3	81.7	73.3
Nuevo León	66.8	62.7	73.0
Oaxaca	68.8	70.5	68.8
Puebla	66.4	63.9	66.0
Querétaro	67.7	78.7	74.0
Quintana Roo	71.5	66.0	70.0
San Luis Potosí	71.4	65.2	66.9
Sinaloa	75.0	82.7	83.5
Sonora	71.6	78.3	78.0
Tabasco	68.7	73.9	76.1
Tamaulipas	57.3	66.7	70.4
Tlaxcala	69.8	68.3	75.7
Veracruz	74.4	68.5	70.1
Yucatán	64.8	71.9	61.7
Zacatecas	70.2	78.0	75.9
Nacional	69.7	71.7	73.7

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE13

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	70.0	78.4	74.4
Baja California	76.3	80.0	78.1
Baja California Sur	78.3	79.7	79.0
Campeche	70.1	66.8	68.4
Chiapas	65.6	68.9	67.3
Chihuahua	73.4	75.4	74.4
Ciudad de México	68.3	73.5	71.0
Coahuila	67.4	70.5	68.9
Colima	73.6	75.8	74.7
Durango	71.5	76.7	74.2
Estado de México	69.9	68.6	69.2
Guanajuato	78.9	81.6	80.4
Guerrero	68.1	70.4	69.3
Hidalgo	62.0	69.1	65.7
Jalisco	73.6	74.8	74.2
Michoacán	69.8	76.6	73.4
Morelos	72.0	76.9	74.5
Nayarit	77.8	75.4	76.5
Nuevo León	63.7	68.0	65.9
Oaxaca	63.2	66.4	64.9
Puebla	59.4	65.2	62.5
Querétaro	68.9	76.0	72.6
Quintana Roo	67.5	67.4	67.5
San Luis Potosí	58.6	66.1	62.5
Sinaloa	79.9	81.1	80.5
Sonora	70.3	77.9	74.1
Tabasco	67.6	72.7	70.2
Tamaulipas	60.9	64.4	62.7
Tlaxcala	63.0	70.4	66.9
Veracruz	66.3	67.5	66.9
Yucatán	62.0	67.5	64.8
Zacatecas	67.2	77.7	72.7
Nacional	68.7	71.8	70.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE14

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	72.9	70.3	79.1
Baja California	67.1	77.1	83.1
Baja California Sur	66.5	79.7	82.7
Campeche	68.3	68.3	68.5
Chiapas	69.1	68.4	65.2
Chihuahua	68.8	74.3	76.6
Ciudad de México	68.4	67.4	74.5
Coahuila	63.3	66.5	73.4
Colima	68.5	72.2	79.3
Durango	67.6	72.7	78.4
Estado de México	63.2	68.9	71.8
Guanajuato	73.9	79.0	84.6
Guerrero	70.0	68.2	70.0
Hidalgo	60.9	65.0	68.3
Jalisco	71.5	72.7	76.7
Michoacán	71.2	71.7	75.8
Morelos	70.7	72.8	77.5
Nayarit	71.9	79.3	75.9
Nuevo León	65.1	60.4	70.9
Oaxaca	64.2	60.6	69.0
Puebla	58.6	62.9	63.8
Querétaro	66.8	76.4	71.4
Quintana Roo	68.4	65.3	69.7
San Luis Potosí	67.4	60.3	62.5
Sinaloa	75.1	80.8	82.4
Sonora	66.4	74.9	76.2
Tabasco	69.7	68.3	72.4
Tamaulipas	60.5	59.3	66.5
Tlaxcala	63.1	66.0	69.4
Veracruz	61.7	65.7	70.0
Yucatán	65.4	62.6	66.8
Zacatecas	64.8	73.5	75.4
Nacional	66.6	69.0	72.9

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE15

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	76.0	62.8	74.7
Baja California	61.4	74.6	83.5
Baja California Sur	64.0	80.6	81.1
Campeche	67.4	69.3	71.9
Chiapas	63.5	68.1	64.1
Chihuahua	69.9	73.8	74.4
Ciudad de México	59.5	65.7	73.0
Coahuila	57.5	64.0	74.7
Colima	61.7	70.3	81.2
Durango	62.9	68.2	78.7
Estado de México	60.3	73.4	70.3
Guanajuato	72.9	78.2	82.6
Guerrero	72.3	63.2	70.6
Hidalgo	54.4	62.1	65.1
Jalisco	72.0	70.3	77.6
Michoacán	71.0	64.7	74.1
Morelos	68.7	68.6	76.2
Nayarit	74.0	80.1	77.1
Nuevo León	62.8	60.4	66.9
Oaxaca	69.4	52.1	69.4
Puebla	59.3	57.2	61.7
Querétaro	66.1	71.0	68.1
Quintana Roo	67.5	66.9	68.2
San Luis Potosí	65.5	56.2	57.7
Sinaloa	72.6	80.1	82.6
Sonora	61.6	70.9	72.9
Tabasco	68.4	64.3	70.5
Tamaulipas	63.3	58.7	62.1
Tlaxcala	61.2	62.8	64.1
Veracruz	62.1	63.0	70.9
Yucatán	63.6	52.2	70.6
Zacatecas	58.1	66.4	72.3
Nacional	64.8	67.1	71.7

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir inhalables
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE16

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	69.9	77.3	83.0
Baja California	73.2	79.7	82.7
Baja California Sur	69.1	78.8	84.4
Campeche	69.3	67.3	65.3
Chiapas	74.7	68.7	66.1
Chihuahua	67.8	74.8	78.6
Ciudad de México	78.0	69.0	75.7
Coahuila	69.5	69.0	72.2
Colima	75.6	74.1	77.5
Durango	72.4	77.0	78.1
Estado de México	66.1	64.7	73.1
Guanajuato	74.8	79.7	86.4
Guerrero	67.7	72.8	69.5
Hidalgo	67.6	67.5	71.2
Jalisco	71.0	75.0	76.0
Michoacán	71.4	78.0	77.4
Morelos	72.6	76.7	78.6
Nayarit	69.7	78.4	74.7
Nuevo León	67.5	60.4	74.6
Oaxaca	58.9	67.4	68.6
Puebla	58.0	67.9	65.5
Querétaro	67.6	81.2	74.2
Quintana Roo	69.3	63.6	71.1
San Luis Potosí	69.4	63.9	66.8
Sinaloa	77.6	81.4	82.2
Sonora	71.2	78.9	79.3
Tabasco	71.1	71.9	74.2
Tamaulipas	57.7	59.9	70.6
Tlaxcala	65.1	69.0	74.0
Veracruz	61.4	68.1	69.2
Yucatán	67.1	72.3	63.2
Zacatecas	71.9	79.5	78.1
Nacional	68.5	70.7	74.0

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE17

Estado	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	38.1	53.9	46.3
Baja California	42.2	49.1	45.6
Baja California Sur	43.4	50.4	46.8
Campeche	42.7	44.9	43.8
Chiapas	47.0	54.8	51.1
Chihuahua	46.8	52.7	49.8
Ciudad de México	40.5	48.5	44.7
Coahuila	43.3	47.8	45.5
Colima	39.6	47.3	43.5
Durango	44.8	54.0	49.5
Estado de México	41.7	48.8	45.4
Guanajuato	46.9	54.6	51.0
Guerrero	48.4	49.8	49.1
Hidalgo	38.0	50.7	44.6
Jalisco	42.8	42.4	42.6
Michoacán	42.2	56.8	49.8
Morelos	49.7	55.0	52.4
Nayarit	39.1	44.1	41.6
Nuevo León	35.3	40.3	37.8
Oaxaca	46.0	50.7	48.5
Puebla	37.4	45.4	41.6
Querétaro	45.0	54.3	49.9
Quintana Roo	39.2	40.8	40.0
San Luis Potosí	31.4	43.6	37.7
Sinaloa	42.6	48.4	45.5
Sonora	39.2	45.9	42.5
Tabasco	42.4	53.4	48.1
Tamaulipas	35.4	42.0	38.8
Tlaxcala	39.2	48.6	44.1
Veracruz	41.5	49.0	45.4
Yucatán	35.8	41.7	38.9
Zacatecas	41.3	53.5	47.7
Nacional	41.6	48.7	45.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE18

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	45.2	41.1	52.0
Baja California	40.7	43.7	49.2
Baja California Sur	44.7	44.1	50.3
Campeche	41.4	42.5	46.1
Chiapas	54.8	52.3	47.8
Chihuahua	54.9	42.3	54.6
Ciudad de México	44.2	40.7	47.9
Coahuila	43.8	40.6	50.7
Colima	46.8	37.6	47.7
Durango	42.9	47.8	54.0
Estado de México	45.7	44.2	46.4
Guanajuato	49.1	49.8	52.9
Guerrero	50.8	47.4	49.9
Hidalgo	41.7	47.1	43.6
Jalisco	40.9	39.7	46.0
Michoacán	50.2	45.8	53.6
Morelos	48.7	51.3	54.8
Nayarit	41.5	42.2	41.2
Nuevo León	41.5	39.1	35.6
Oaxaca	45.7	49.1	49.2
Puebla	44.2	39.2	42.9
Querétaro	46.6	51.3	49.7
Quintana Roo	41.9	37.6	42.1
San Luis Potosí	41.7	34.7	38.8
Sinaloa	47.0	44.0	46.3
Sonora	44.5	40.0	44.1
Tabasco	48.8	46.8	49.2
Tamaulipas	40.9	36.5	40.0
Tlaxcala	48.4	42.1	44.4
Veracruz	43.5	43.2	48.0
Yucatán	44.3	33.6	41.8
Zacatecas	40.6	49.5	49.1
Nacional	45.5	43.3	47.0

Porcentajes obtenidos según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población masculina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE19

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	42.6	31.5	42.8
Baja California	27.9	40.1	49.5
Baja California Sur	40.9	42.5	45.2
Campeche	39.0	40.2	46.7
Chiapas	51.6	49.8	41.5
Chihuahua	56.8	39.1	50.1
Ciudad de México	36.8	39.2	42.7
Coahuila	45.3	36.7	48.8
Colima	45.7	31.8	44.7
Durango	37.0	40.7	52.3
Estado de México	39.5	40.6	43.7
Guanajuato	50.6	45.2	46.8
Guerrero	51.9	45.2	49.6
Hidalgo	36.1	39.4	37.6
Jalisco	43.3	41.9	43.4
Michoacán	45.5	33.7	48.7
Morelos	45.7	50.2	50.8
Nayarit	41.0	39.1	38.4
Nuevo León	37.0	37.4	32.9
Oaxaca	44.9	45.6	46.8
Puebla	46.4	33.5	36.9
Querétaro	49.2	42.7	45.4
Quintana Roo	45.9	37.2	38.9
San Luis Potosí	39.2	29.0	29.9
Sinaloa	44.9	41.1	43.1
Sonora	38.9	38.2	40.2
Tabasco	43.1	39.6	45.1
Tamaulipas	42.5	37.0	31.3
Tlaxcala	47.9	35.8	38.7
Veracruz	37.2	40.7	43.9
Yucatán	36.6	28.0	43.0
Zacatecas	39.5	40.8	42.7
Nacional	42.7	39.8	43.0

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol
en la población femenina de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNE20

Estado	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Aguascalientes	47.8	50.1	60.0
Baja California	54.1	47.3	49.0
Baja California Sur	48.8	45.8	55.6
Campeche	43.8	44.6	45.5
Chiapas	58.1	54.4	53.7
Chihuahua	53.0	45.5	58.8
Ciudad de México	52.3	42.1	52.3
Coahuila	42.3	44.6	52.5
Colima	48.0	43.5	50.6
Durango	48.8	54.5	55.5
Estado de México	52.0	47.7	48.7
Guanajuato	47.6	53.9	58.3
Guerrero	49.8	49.4	50.2
Hidalgo	47.5	53.8	49.0
Jalisco	38.4	37.5	48.4
Michoacán	54.9	56.5	57.9
Morelos	51.7	52.4	58.3
Nayarit	42.0	45.2	43.9
Nuevo León	46.2	40.8	38.0
Oaxaca	46.5	51.8	51.4
Puebla	42.1	44.1	48.0
Querétaro	44.1	59.2	53.6
Quintana Roo	37.6	37.9	45.5
San Luis Potosí	44.3	39.7	46.8
Sinaloa	49.2	46.9	49.4
Sonora	50.3	41.8	47.9
Tabasco	54.6	53.4	52.9
Tamaulipas	39.4	36.0	48.3
Tlaxcala	48.9	47.7	49.4
Veracruz	50.1	45.4	51.6
Yucatán	51.9	38.9	40.7
Zacatecas	41.8	56.9	54.8
Nacional	48.5	46.7	50.6

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE21

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	99.5	99.0	99.3
Baja California	96.7	99.2	97.9
Baja California Sur	100.0	100.0	100.0
Campeche	100.0	99.4	99.7
Chiapas	98.7	100.0	99.3
Chihuahua	99.8	99.7	99.8
Ciudad de México	100.0	98.6	99.3
Coahuila	99.7	99.5	99.6
Colima	98.7	99.4	99.0
Durango	100.0	99.5	99.7
Estado de México	99.7	99.3	99.5
Guanajuato	99.3	99.3	99.3
Guerrero	100.0	99.6	99.8
Hidalgo	97.0	99.7	98.3
Jalisco	99.4	100.0	99.7
Michoacán	98.4	100.0	99.2
Morelos	99.5	99.3	99.4
Nayarit	99.5	97.3	98.4
Nuevo León	97.6	98.5	98.1
Oaxaca	99.1	100.0	99.5
Puebla	100.0	99.5	99.7
Querétaro	98.7	99.3	99.0
Quintana Roo	97.3	98.1	97.7
San Luis Potosí	99.7	100.0	99.9
Sinaloa	99.4	100.0	99.7
Sonora	99.5	99.0	99.2
Tabasco	99.2	97.7	98.5
Tamaulipas	99.6	99.2	99.4
Tlaxcala	100.0	100.0	100.0
Veracruz	99.3	99.2	99.3
Yucatán	99.1	98.2	98.6
Zacatecas	98.9	99.6	99.3
Nacional	99.2	99.4	99.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE22

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	87.2	89.2	88.2
Baja California	86.3	92.8	89.5
Baja California Sur	90.2	92.7	91.5
Campeche	87.3	88.0	87.6
Chiapas	92.3	95.5	93.9
Chihuahua	92.5	92.6	92.5
Ciudad de México	83.9	87.3	85.6
Coahuila	84.4	84.0	84.2
Colima	90.6	90.0	90.3
Durango	85.8	85.0	85.4
Estado de México	87.1	84.8	86.0
Guanajuato	82.4	88.7	85.5
Guerrero	89.9	95.5	92.7
Hidalgo	88.8	90.7	89.7
Jalisco	88.1	95.2	91.6
Michoacán	83.4	87.6	85.5
Morelos	92.6	92.2	92.4
Nayarit	91.4	90.5	91.0
Nuevo León	87.7	87.4	87.5
Oaxaca	89.7	91.0	90.4
Puebla	92.7	89.9	91.2
Querétaro	86.7	90.9	88.8
Quintana Roo	83.3	93.8	88.4
San Luis Potosí	88.1	91.3	89.6
Sinaloa	91.3	90.9	91.1
Sonora	87.5	91.2	89.3
Tabasco	86.5	90.2	88.3
Tamaulipas	89.2	88.8	89.0
Tlaxcala	86.8	87.6	87.2
Veracruz	88.5	89.5	88.9
Yucatán	88.9	91.2	90.0
Zacatecas	84.7	87.5	86.1
Nacional	87.8	89.7	88.8

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE23

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	98.1	99.6	98.9
Baja California	97.6	98.3	98.0
Baja California Sur	98.3	98.7	98.5
Campeche	98.2	99.4	98.8
Chiapas	99.8	99.8	99.8
Chihuahua	97.2	99.6	98.4
Ciudad de México	97.5	98.5	98.0
Coahuila	97.9	97.2	97.6
Colima	99.0	99.1	99.0
Durango	98.9	99.8	99.4
Estado de México	97.8	99.2	98.5
Guanajuato	99.7	99.7	99.7
Guerrero	99.1	99.7	99.4
Hidalgo	100.0	99.6	99.8
Jalisco	96.1	99.8	98.1
Michoacán	98.4	99.5	99.0
Morelos	98.2	99.6	98.9
Nayarit	99.6	99.9	99.8
Nuevo León	97.4	96.7	97.0
Oaxaca	98.9	99.8	99.4
Puebla	98.6	99.1	98.9
Querétaro	97.7	99.2	98.5
Quintana Roo	96.1	99.2	97.6
San Luis Potosí	98.3	99.4	98.9
Sinaloa	98.6	100.0	99.3
Sonora	98.0	99.3	98.7
Tabasco	98.7	100.0	99.4
Tamaulipas	96.2	97.9	97.1
Tlaxcala	98.8	99.4	99.1
Veracruz	99.4	99.6	99.5
Yucatán	99.1	95.0	96.9
Zacatecas	98.5	100.0	99.3
Nacional	98.2	99.1	98.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE24

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	87.3	95.1	91.4
Baja California	84.3	92.7	88.5
Baja California Sur	88.1	93.7	90.8
Campeche	88.9	96.7	93.0
Chiapas	92.3	95.4	93.9
Chihuahua	84.0	96.2	90.1
Ciudad de México	85.4	94.8	90.4
Coahuila	84.8	92.0	88.4
Colima	90.7	95.5	93.1
Durango	89.0	94.1	91.7
Estado de México	86.2	94.7	90.6
Guanajuato	86.6	94.2	90.6
Guerrero	87.9	97.3	92.9
Hidalgo	87.5	96.8	92.4
Jalisco	90.4	93.4	92.0
Michoacán	88.2	94.8	91.7
Morelos	93.0	96.8	95.0
Nayarit	91.5	96.6	94.0
Nuevo León	89.6	91.8	90.7
Oaxaca	90.2	95.7	93.2
Puebla	86.2	95.8	91.3
Querétaro	87.0	95.4	91.4
Quintana Roo	85.6	93.8	89.6
San Luis Potosí	86.5	96.4	91.7
Sinaloa	91.7	98.1	95.0
Sonora	87.2	91.5	89.4
Tabasco	88.8	95.5	92.3
Tamaulipas	87.1	93.9	90.6
Tlaxcala	87.1	94.8	91.2
Veracruz	87.3	95.4	91.6
Yucatán	89.3	91.4	90.4
Zacatecas	83.6	95.3	89.8
Nacional	87.6	94.7	91.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE25

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	88.7	91.7	90.2
Baja California	93.9	98.3	96.1
Baja California Sur	97.2	93.4	95.4
Campeche	95.6	96.3	95.9
Chiapas	97.4	98.8	98.1
Chihuahua	95.2	94.7	94.9
Ciudad de México	94.4	92.9	93.7
Coahuila	96.2	95.4	95.8
Colima	91.1	95.5	93.2
Durango	98.3	98.8	98.5
Estado de México	95.3	93.4	94.3
Guanajuato	93.2	98.3	95.8
Guerrero	98.9	99.4	99.1
Hidalgo	91.6	98.4	95.0
Jalisco	93.9	93.4	93.7
Michoacán	92.5	97.8	95.1
Morelos	93.9	98.2	96.1
Nayarit	95.7	93.4	94.5
Nuevo León	92.7	97.3	95.0
Oaxaca	95.2	97.9	96.6
Puebla	97.9	96.2	97.0
Querétaro	97.4	96.4	96.9
Quintana Roo	95.1	97.3	96.2
San Luis Potosí	95.5	95.0	95.3
Sinaloa	97.0	97.2	97.1
Sonora	94.6	97.8	96.2
Tabasco	98.2	98.3	98.2
Tamaulipas	98.2	95.5	96.8
Tlaxcala	95.5	93.2	94.4
Veracruz	94.2	97.7	95.9
Yucatán	98.4	89.1	93.8
Zacatecas	97.0	95.1	96.1
Nacional	95.2	96.0	95.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol
en la población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNE26

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	67.0	69.7	68.3
Baja California	62.3	79.3	70.6
Baja California Sur	80.1	81.2	80.7
Campeche	76.3	75.5	75.9
Chiapas	81.6	83.1	82.3
Chihuahua	75.0	82.8	78.9
Ciudad de México	71.2	69.7	70.5
Coahuila	66.9	73.1	70.0
Colima	68.8	70.0	69.4
Durango	70.6	69.5	70.1
Estado de México	73.8	64.4	69.2
Guanajuato	63.3	76.8	70.0
Guerrero	77.2	80.8	79.0
Hidalgo	65.0	77.4	71.1
Jalisco	65.3	70.6	67.9
Michoacán	64.0	74.4	69.2
Morelos	75.4	75.7	75.5
Nayarit	73.2	79.0	76.1
Nuevo León	68.0	71.3	69.6
Oaxaca	77.3	76.0	76.7
Puebla	75.8	72.5	74.1
Querétaro	74.9	74.1	74.5
Quintana Roo	70.3	80.7	75.4
San Luis Potosí	69.8	75.1	72.5
Sinaloa	76.8	83.6	80.2
Sonora	70.8	74.5	72.6
Tabasco	75.4	77.9	76.6
Tamaulipas	74.3	79.0	76.7
Tlaxcala	75.4	75.8	75.6
Veracruz	70.5	71.6	71.0
Yucatán	74.6	75.4	75.0
Zacatecas	63.3	67.6	65.4
Nacional	71.5	73.8	72.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de alcohol
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE27

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	79.7	89.0	84.6
Baja California	82.5	84.8	83.6
Baja California Sur	80.2	90.5	85.2
Campeche	91.9	92.9	92.4
Chiapas	95.0	96.7	95.9
Chihuahua	84.5	89.4	87.0
Ciudad de México	82.9	86.0	84.5
Coahuila	83.5	86.2	84.9
Colima	79.6	84.8	82.2
Durango	91.0	93.1	92.1
Estado de México	85.0	89.3	87.2
Guanajuato	89.3	94.8	92.2
Guerrero	89.5	96.1	93.0
Hidalgo	88.3	91.8	90.2
Jalisco	74.8	79.3	77.2
Michoacán	83.6	94.2	89.2
Morelos	86.2	94.3	90.5
Nayarit	86.8	92.1	89.5
Nuevo León	74.6	79.5	77.1
Oaxaca	93.9	96.1	95.1
Puebla	87.8	88.4	88.1
Querétaro	83.9	91.9	88.1
Quintana Roo	81.6	89.0	85.3
San Luis Potosí	85.5	92.1	89.0
Sinaloa	84.8	91.5	88.2
Sonora	82.7	89.0	85.8
Tabasco	92.0	96.0	94.1
Tamaulipas	79.9	88.0	84.1
Tlaxcala	86.2	91.8	89.2
Veracruz	90.6	93.2	92.0
Yucatán	85.8	84.2	85.0
Zacatecas	89.7	95.1	92.6
Nacional	85.0	89.6	87.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CUADROS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y
TOLERANCIA SOCIAL POR ESTADO**

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de alcohol
en la población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNE28

Estado	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Aguascalientes	49.6	70.7	60.6
Baja California	51.8	67.5	59.6
Baja California Sur	57.2	71.1	63.9
Campeche	59.4	81.2	70.6
Chiapas	73.2	85.4	79.6
Chihuahua	57.5	71.8	64.7
Ciudad de México	56.2	72.8	65.0
Coahuila	52.8	68.6	60.8
Colima	54.5	71.2	62.9
Durango	62.6	75.4	69.3
Estado de México	59.0	77.0	68.4
Guanajuato	57.6	81.2	70.1
Guerrero	66.9	82.5	75.1
Hidalgo	62.4	74.7	68.9
Jalisco	52.8	69.4	61.4
Michoacán	58.3	77.6	68.5
Morelos	66.5	80.6	73.9
Nayarit	57.1	75.9	66.6
Nuevo León	42.9	57.1	50.1
Oaxaca	71.8	80.5	76.5
Puebla	62.0	75.5	69.2
Querétaro	56.2	77.4	67.3
Quintana Roo	57.6	71.5	64.4
San Luis Potosí	54.2	76.8	66.0
Sinaloa	61.3	78.7	70.1
Sonora	57.8	69.6	63.7
Tabasco	65.4	83.0	74.6
Tamaulipas	54.1	72.4	63.5
Tlaxcala	53.7	73.5	64.2
Veracruz	60.6	79.1	70.3
Yucatán	61.6	69.9	65.9
Zacatecas	55.4	78.4	67.6
Nacional	58.3	75.0	67.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz



ANEXO 13: INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO Y TOLERANCIA SOCIAL



**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Listado de Tablas

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad
Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo
Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo
Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo
Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir marihuana en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN1

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	45.3	43.311-47.277
18-34	27.6	25.561-29.578
35-65	33.0	31.315-34.610
Subtotal Hombres	33.0	31.834-34.127
Mujeres		
12-17	52.3	50.184-54.484
18-34	37.2	35.552-38.834
35-65	42.9	41.538-44.215
Subtotal Mujeres	42.1	41.087-43.173
Total 12-17	48.8	47.294-50.256
Total 18-34	32.5	31.271-33.818
Total 35-65	38.2	37.060-39.299
Total	37.7	36.898-38.526

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir heroína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN2

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	65.7	63.861-67.566
18-34	65.7	63.743-67.695
35-65	68.4	66.815-69.915
Subtotal Hombres	66.8	65.710-67.973
Mujeres		
12-17	69.1	67.117-71.043
18-34	68.9	67.250-70.585
35-65	71.5	70.189-72.733
Subtotal Mujeres	70.1	69.063-71.065
Total 12-17	67.4	66.039-68.717
Total 18-34	67.4	66.054-68.691
Total 35-65	70.0	68.955-71.033
Total	68.5	67.703-69.313

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir cocaína en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN3

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	66.2	64.271-68.058
18-34	66.4	64.368-68.348
35-65	71.2	69.694-72.691
Subtotal Hombres	68.4	67.229-69.525
Mujeres		
12-17	69.7	67.798-71.642
18-34	71.7	70.151-73.323
35-65	73.7	72.492-74.952
Subtotal Mujeres	72.3	71.341-73.233
Total 12-17	67.9	66.540-69.305
Total 18-34	69.1	67.838-70.439
Total 35-65	72.5	71.500-73.546
Total	70.4	69.598-71.200

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir inhalables en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN4

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	64.8	62.787-66.745
18-34	67.1	65.124-69.140
35-65	71.7	70.199-73.218
Subtotal Hombres	68.7	67.512-69.806
Mujeres		
12-17	68.5	66.547-70.433
18-34	70.7	68.963-72.493
35-65	74.0	72.805-75.204
Subtotal Mujeres	71.8	70.845-72.777
Total 12-17	66.6	65.152-68.062
Total 18-34	69.0	67.637-70.345
Total 35-65	72.9	71.914-73.919
Total	70.3	69.495-71.083

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Percepción del riesgo de consumir frecuentemente alcohol en la población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN5

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	42.7	40.701-44.627
18-34	39.8	37.759-41.760
35-65	43.0	41.289-44.649
Subtotal Hombres	41.6	40.434-42.834
Mujeres		
12-17	48.5	46.403-50.550
18-34	46.7	44.969-48.390
35-65	50.6	49.188-51.915
Subtotal Mujeres	48.7	47.630-49.717
Total 12-17	45.5	44.078-46.997
Total 18-34	43.3	42.015-44.658
Total 35-65	47.0	45.882-48.036
Total	45.3	44.435-46.113

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro ICCN6

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	99.2	98.980-99.498	87.8	86.502-89.108
Mujeres	99.4	99.081-99.632	89.7	88.377-91.054
Total	99.3	99.109-99.486	88.8	87.816-89.688

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de drogas en la población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro ICCN7

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	98.2	97.741-98.572	87.6	86.629-88.477
Mujeres	99.1	98.849-99.338	94.7	94.224-95.225
Total	98.6	98.410-98.881	91.3	90.773-91.797

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro ICCN8

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	95.2	94.346-96.076	71.5	69.628-73.304
Mujeres	96.0	95.017-96.973	73.8	71.822-75.800
Total	95.6	94.954-96.245	72.6	71.284-73.969

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
INTERVALOS DE CONFIANZA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO
Y TOLERANCIA SOCIAL**

Tolerancia social ante el consumo de alcohol en la población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro ICCN9

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	85.0	83.882-86.147	58.3	56.883-59.774
Mujeres	89.6	88.665-90.449	75.0	74.029-76.014
Total	87.4	86.604-88.169	67.0	66.081-67.939

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
Secretaría de Salud
Comisión Nacional Contra las Adicciones
Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz




ANEXO 6: MAPAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL



Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 -2017


Resultados Nacionales Población Total Alguna Vez

Incidencia Acumulada del Consumo de Cualquier Droga



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Cualquier Droga Ilegal



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Cualquier Droga Médica



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Opiáceos

Total Nacional = 0.1%
IC 95% 0.067-0.180



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Tranquilizantes


Total Nacional = 0.9%
IC 95% 0.759-1.026



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Sedantes

Total Nacional = 0.1%
IC 95% 0.060-0.137



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.


Incidencia Acumulada del Consumo de Anfetaminas

Total Nacional = 0.4%
IC 95% 0.255-0.456




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Marihuana




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Cocaína




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Crack




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Alucinógenos




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Inhalables




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Heroína




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Metanfetaminas



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Incidencia Acumulada del Consumo de Marihuana Sintética



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017

Resultados Nacionales Población Total Último Año

Consumo de Cualquier Droga en el Último Año

Total Nacional = 2.9%

IC 95% 2.670-3.216

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Cualquier Droga Ilegal en el Último Año

Total Nacional = 2.7%

IC 95% 2.417-2.947

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Cualquier Droga Médica en el Último Año

Total Nacional = 0.5%

IC 95% 0.370-0.596

- Estados con % más altos
- Estados con % en el promedio
- Estados con % más bajos

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Opiáceos en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Tranquilizantes en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Sedantes en el Último Año




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Anfetaminas en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Marihuana en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Cocaína en el Último Año




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Crack en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Alucinógenos en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Inhalables en el Último Año




Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Heroína en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

Consumo de Metanfetaminas en el Último Año



Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

**Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017: Reporte de Drogas.** Se terminó de imprimir en
septiembre del 2017 en Editores Buena Onda S.A. de C.V. Suiza
Nº 14 Col. Portales Oriente C.P. 03570, Delegación Benito
Juárez, México D.F. con un tiraje de 2000 ejemplares.